


Confronto Dati Passi-Ulisse

Regione	Cint_Passi	Cint_Ulisse	Casco_Passi	Casco_Ulisse
Piemonte	89,8	71,1	96,8	100
Valle D'Aosta	90,4	78,3	93,96	100
Lombardia	92,8	81,2	99,22	99,8
PA Bolzano	89,2	77,9		
PA Trento	94,0	77,9	94,97	100
Veneto	90,9	78,5	97,84	100
Friuli-Venezia Giulia	91,6	84,2	97,13	100
Liguria	94,4	73,6	99,76	100
Emilia-Romagna	90,6	74,8	99,05	100
Toscana	87,0	68,8	97,52	98
Umbria	78,2	59,6	95,62	99
Marche	85,7	60,5	98,06	99,9
Lazio	80,5	68,1	97,97	93
Abruzzo	74,3	55,8		
Molise	78,0	36,2	85,43	90,9
Campania	75,0	51,5	88,78	73
Puglia	65,7	39,6	82,34	77,5
Basilicata	80,5	37,9	85,87	89,6
Calabria	74,3	38,8	82,38	81,2
Sicilia	73,8	41,2	90,57	81,1
Sardegna	85,3	60,1	100	97,8
Pool di Asl	82,7	63,8	94,67	93

Andamento prevalenza uso cintura anteriore dai dati Passi (2011) e Ulisse (2009-2011) per Regione

Il dato medio relativo al Passi è 83% e la distribuzione presenta una deviazione standard pari a 8. Per quanto riguarda il dato rilevato da Ulisse, il valore medio della prevalenza d'uso della cintura anteriore è 64%, con una variabilità doppia rispetto alla distribuzione del dato Passi (dev. Std = 15). La differenza media della prevalenza è di 19 punti percentuali, ed è maggiore nelle regioni meridionali, soprattutto in Molise, Basilicata e Calabria.



Andamento prevalenza uso casco dai dati Passi (2011) e Ulisse (2009-2011) per Regione

Relativamente all'uso del casco, i dati raccolti dalle due fonti differiscono, nel complesso, di poco più di un punto percentuale e mezzo, e le differenze maggiori si riscontrano, anche in questo caso, nelle regioni meridionali. La distribuzione Ulisse mostra una variabilità leggermente superiore a quella di Passi.

