

Rosolia congenita e in gravidanza

News



Rapporto sulla sorveglianza della Rosolia congenita e in gravidanza

L'**eliminazione della rosolia e della sindrome da rosolia congenita** nella Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità rappresenta uno degli obiettivi del "Piano d'Azione Europeo per le vaccinazioni 2015-2020 (European Vaccine Action Plan 2015– 2020, EVAP)".

In Italia dal 2005 è attivo un sistema nazionale di sorveglianza della rosolia congenita e delle infezioni rubeoliche in gravidanza, strumento indispensabile per monitorare i progressi verso l'eliminazione.

Il presente rapporto presenta i dati nazionali e regionali del sistema di sorveglianza relativi al periodo **gennaio 2005 - febbraio 2018**. I dati possono presentare variazioni rispetto a quanto riportato nei precedenti bollettini poiché alcuni casi possono essere stati riclassificati in seguito all'aggiornamento delle informazioni disponibili.

In Evidenza

- Nel **2017** sono stati segnalati due casi confermati di rosolia congenita (uno importato e uno con origine non nota) e un caso confermato autoctono di rosolia in gravidanza.
- Nei primi due mesi del **2018** è stato segnalato un caso importato confermato di rosolia congenita.
- L'incidenza di rosolia congenita è **inferiore a 1 caso/100.000 nati vivi** dal 2013. Tuttavia, considerando l'**andamento ciclo-epidemico** della rosolia, occorre mantenere alta l'attenzione.
- E' importante **monitorare l'esito delle gravidanze e dello stato di infezione dei nuovi nati** con sospetta infezione congenita e **migliorare la raccolta delle informazioni** in termini di **tempestività e completezza**.

Sommario

Rosolia congenita: dati nazionali	2
Rosolia in gravidanza: dati nazionali	3
Rosolia congenita e in gravidanza: dati regionali	4
Rosolia congenita e in gravidanza: Focus 2017—2018	4
Il sistema di sorveglianza	5
Definizioni di caso	6
Per migliorare la sorveglianza...	7
Consulta inoltre...	7


Rosolia congenita: dati nazionali

Nel periodo **gennaio 2005 - febbraio 2018** sono stati segnalati **88** casi di rosolia congenita, di cui **80** confermati e **8** probabili.

In Figura 1 è riportato il numero di infezioni congenite (confermate e probabili) per anno e classificazione. E' possibile osservare un picco di segnalazioni nel 2008 (30 casi, con un'incidenza pari a 5,2 per 100.000 nati vivi) e uno nel 2012 (21 casi, con un'incidenza pari a 3,9 per 100.000 nati vivi).

Nei primi mesi del **2018** è stato segnalato un caso confermato importato di rosolia congenita.

Figura 1. Infezioni da rosolia congenita per anno e classificazione. Italia gennaio 2005– febbraio 2018



Informazioni cliniche

Informazioni sul quadro clinico sono disponibili per **82** degli 88 casi segnalati.

Di questi, 65 casi hanno riportato almeno una manifestazione clinica. Di seguito i segni/sintomi più frequentemente riportati:

- Cardiopatia congenita (44 bambini)
- Cataratta (13 bambini)
- Microcefalia (11 bambini)
- Sordità/ipoacusia (31 bambini)
- Meningoencefalite (12 bambini)

Ventidue bambini hanno difetti multipli a carico dell'apparato cardiaco, visivo o uditivo.

Diciassette bambini risultano asintomatici: si tratta di casi con conferma di laboratorio e correlazione epidemiologica.

Rosolia in gravidanza: dati nazionali


Nel periodo **gennaio 2005 - febbraio 2018** sono stati notificati **173** casi di rosolia in gravidanza, di cui **160 confermati**, **9 probabili** e **4 possibili**.

Nello stesso periodo, tra le donne infette, è stato segnalato **un nato morto, un aborto spontaneo e 32 interruzioni volontarie di gravidanza**.

La Figura 2 riporta il numero di infezioni in gravidanza (confermate, probabili e possibili) per anno e classificazione. Si osserva un picco di segnalazioni nel 2008 (78 casi) e uno nel 2012 (51 casi). Questo andamento temporale è coerente con quello delle notifiche di rosolia congenita, riportato in Figura 1.

Nei primi mesi del **2018** non è pervenuta alcuna segnalazione di rosolia in gravidanza.

Figura 2. Infezioni rubeoliche in gravidanza per anno e classificazione. Italia, gennaio 2005 - dicembre 2017



Descrizione delle donne con infezione rubeolica in gravidanza

(casi confermati, probabili e possibili)

- L'età mediana è pari a 27 anni
- Il 17% (28/167) delle donne non è italiano
- Il 41% (48/117) ha contratto l'infezione nel primo trimestre
- Solo il 29% (38/133) ha effettuato il rubeotest prima della gravidanza
- Il 45% (72/160) ha avuto precedenti gravidanze (Figura 3)
- Tre donne hanno riferito di essere vaccinate contro la rosolia (ma lo stato vaccinale non è documentato)
- Per 40 donne (23%) non è noto se l'infezione sia stata trasmessa al nascituro, o perché non si conosce l'esito della gravidanza o perché informazioni relative allo stato d'infezione del nuovo nato non sono disponibili.




Figura 3. N. precedenti gravidanze nelle donne infette

Rosolia congenita e in gravidanza: dati regionali




Figura 4. Casi confermati e probabili di rosolia congenita per Regione/P.A., gennaio 2005 - febbraio 2018

Figura 5. N. Casi confermati, probabili e possibili di rosolia in gravidanza per Regione/P.A., gennaio 2005 - febbraio 2018

Rosolia congenita e in gravidanza: Focus 2017-2018

In Italia nel **2017** sono stati segnalati due casi confermati di rosolia congenita, e un caso confermato di rosolia in gravidanza. Nello specifico si tratta di:

- un caso confermato di sindrome da rosolia congenita, in un bambino nato da una profuga nigeriana, residente in un centro di accoglienza. La bambina alla nascita presentava pervietà del dotto arterioso, difetto del setto interventricolare, splenomegalia, porpora, meningoencefalite e cisti cerebrali. Dalle informazioni raccolte non è stato possibile definire con certezza se la donna ha contratto la rosolia prima di arrivare in Italia o dopo l'arrivo.
- Un caso importato confermato asintomatico di rosolia congenita, in un bambino nato da una profuga nigeriana, residente in un centro di accoglienza.
- un'infezione di rosolia in gravidanza in una donna di nazionalità filippina nullipara non vaccinata, diagnosticata alla sesta settimana di gestazione; l'esito della gravidanza non è noto.

Nello stesso anno sono pervenute due segnalazioni di sospetta infezione rubeolica in bambine nate da profughe nigeriane con rosolia confermata: in un caso l'infezione congenita è stata esclusa; non è invece stato possibile classificare il secondo caso con le informazioni disponibili: gli accertamenti diagnostici eseguiti in epoca prenatale non avevano evidenziato segni di infezione del feto e la bambina alla nascita non mostrava segni/sintomi compatibili con rosolia congenita.

Nei primi mesi del **2018** è stato notificato un caso confermato importato di rosolia congenita, nato da una profuga nigeriana residente in un centro di accoglienza (in corso di monitoraggio).


Dal 2016 la maggior parte delle segnalazioni di rosolia congenita ha interessato donne in centri di accoglienza; si raccomanda pertanto di promuovere la vaccinazione dei gruppi difficili da raggiungere, inclusa la popolazione migrante.

Il Sistema di Sorveglianza della rosolia congenita e in gravidanza

In Italia la sindrome/infezione da rosolia congenita e la rosolia in gravidanza sono incluse tra le malattie infettive soggette a notifica obbligatoria di classe III dal 1° gennaio 2005.

Nel mese di luglio 2013 è stata emanata una nuova circolare che, in accordo con le raccomandazioni del PNEMoRc 2010-2015, riporta le definizioni di caso 2012 della Commissione Europea e aggiorna le procedure di ricerca, notifica, monitoraggio e isolamento dei casi di infezione da rosolia congenita e in gravidanza.

Di seguito è riportato il flusso di segnalazione dal livello locale al livello centrale.



La scheda di notifica di rosolia congenita va compilata per:

tutti i casi confermati o probabili di rosolia congenita, inclusi i nati morti e i feti abortiti a seguito di diagnosi prenatali di rosolia congenita; tutti i bambini nati da madre con infezione da rosolia in gravidanza (possibile, probabile o confermata), anche se asintomatici alla nascita e con esami di laboratorio negativi (casi sospetti).

La scheda di notifica di rosolia in gravidanza va compilata per:

qualsiasi donna gravida con rosolia possibile, probabile o confermata sulla base di segni/sintomi, di esami di laboratorio o di un collegamento epidemiologico.

La scheda NON va compilata per le gestanti che hanno presentato solamente una positività delle IgM rosolia-specifiche in gravidanza, ma non hanno manifestato una sintomatologia compatibile o avuto un collegamento epidemiologico con un caso confermato di rosolia. Ovviamente tali casi vanno seguiti dal punto di vista clinico, ma non rientrano nel sistema di notifica.

Definizioni di caso

Criteri clinici

Infezione da rosolia congenita (IRC):

Per l'IRC non possono essere definiti criteri clinici.

Sindrome da rosolia congenita (SRC):

Qualsiasi bambino di età inferiore a un anno o nato morto che presenti:

- almeno due delle condizioni di categoria A)
-
- una condizione della categoria A) e una condizione della categoria B)

Condizioni di categoria A)

- Cataratta,
- glaucoma congenito,
- cardiopatia congenita,
- perdita dell'udito,
- retinopatia pigmentaria.

Condizioni di categoria B)

- Porpora,
- splenomegalia,
- microcefalia,
- ritardo di sviluppo,
- meningoencefalite,
- radiotrasparenza delle ossa,
- ittero che comincia a manifestarsi entro 24 ore dalla nascita.

Criteri di laboratorio

Almeno uno dei seguenti quattro criteri:

- isolamento del virus della rosolia in un campione biologico
- identificazione dell'acido nucleico del virus della rosolia
- risposta anticorpale specifica al virus della rosolia (IgM)
- persistenza di IgG della rosolia tra i 6 e i 12 mesi di età (almeno due campioni con una concentrazione simile di IgG della rosolia).

I risultati di laboratorio vanno interpretati in funzione della presenza o meno di vaccinazione.

Criteri epidemiologici

Qualsiasi bambino di età inferiore a un anno o feto nato morto da madre a cui è stata confermata in laboratorio durante la gravidanza un'infezione da rosolia per trasmissione interumana (trasmissione verticale).

Classificazione dei casi di rosolia congenita

Caso possibile N.A.

Caso probabile

Qualsiasi bambino di età inferiore a un anno o feto nato morto che non sia stato sottoposto a test di laboratorio

-
- i cui risultati di laboratorio siano negativi
- E

che soddisfi almeno uno dei seguenti due criteri:

- una correlazione epidemiologica e almeno una delle condizioni della categoria A),
- criteri clinici della SRC soddisfatti.

Caso confermato

Qualsiasi feto nato morto che soddisfi i criteri di laboratorio

-
- qualsiasi bambino che soddisfi i criteri di laboratorio e almeno uno dei seguenti due criteri:
- una correlazione epidemiologica,
- almeno una delle condizioni della categoria A).

Rosolia congenita

Criteri clinici

Qualsiasi donna in gravidanza che presenti una manifestazione acuta di esantema maculopapulare generalizzato

E
almeno una delle seguenti cinque manifestazioni:

- adenopatia cervicale,
- adenopatia suboccipitale,
- adenopatia retroauricolare,
- artralgia,
- artrite.

Criteri di laboratorio

Criteri di laboratorio per la conferma del caso

- Almeno uno dei seguenti criteri:
- isolamento del virus della rosolia a partire da un campione clinico,
 - identificazione dell'acido nucleico del virus della rosolia in un campione clinico,
 - sierconversione o aumento di almeno 4 volte del titolo anticorpale di IgG rosolia-specifiche nel siero o nella saliva,
 - presenza di IgM specifiche associate a IgG virus-specifiche a bassa avidità.

Criteri di laboratorio per un caso probabile:

- presenza di anticorpi IgM rosolia-specifici.

Criteri epidemiologici

Correlazione epidemiologica con un caso confermato.

Classificazione dei casi di rosolia

Caso possibile

Qualsiasi donna che soddisfi i criteri clinici.

Caso probabile

Qualsiasi donna che soddisfi i criteri clinici e almeno uno dei seguenti due criteri:

- una correlazione epidemiologica,
- i criteri di laboratorio per un caso probabile.

Caso confermato

Qualsiasi donna che soddisfi i criteri di laboratorio per la conferma del caso e che non sia stata vaccinata di recente (da 6 giorni a 6 settimane prima della comparsa dell'esantema).

In caso di vaccinazione recente, qualsiasi persona in cui venga individuato il ceppo selvaggio del virus della rosolia.

Rosolia in gravidanza



Rosolia congenita e in gravidanza News

Per migliorare la sorveglianza...

- Migliorare la sensibilità e specificità del sistema di sorveglianza è importante per monitorare il quadro epidemiologico dell'infezione e i progressi verso l'eliminazione.
- È importante promuovere la pratica della notifica di malattie infettive tra gli operatori sanitari.
- Rafforzare la sorveglianza delle donne in gravidanza è fondamentale per rilevare i casi di rosolia congenita. Inoltre una diagnosi precoce di rosolia congenita permette di effettuare tempestivamente azioni per prevenire la diffusione del virus della rosolia da parte dei neonati infetti.
- È importante che le gestanti con sospetta infezione siano monitorate anche per non perdere traccia di eventuali interruzioni di gravidanza non altrimenti segnalate.
- È fondamentale che tutti i bambini nati da madre con rosolia possibile, probabile o confermata in gravidanza siano seguiti nel tempo con indagini di laboratorio ed esami clinico-strumentali, in modo da confermare/escludere l'infezione congenita e dirimere tra forma sindromica e infezione. Alcune manifestazioni cliniche possono infatti essere riconosciute dopo la nascita.
- La circolare di luglio 2013 propone una modulistica per agevolare il follow up dei neonati e dell'esito delle gravidanze.
- È necessario migliorare la tempestività della raccolta delle informazioni anamnestiche e di laboratorio e la loro completezza, per ridurre la quota di casi segnalati non classificati.
- È importante inviare mensilmente il riepilogo dei casi di rosolia congenita e in gravidanza, anche in assenza di notifiche (zero-reporting), come previsto dalla circolare. Sarebbe opportuno un sistema di zero-reporting attivo, attraverso il contatto dei punti nascita dell'area di competenza.

Consulta inoltre ...

- Circolare ministeriale "Sorveglianza della rosolia congenita e dell'infezione da virus della rosolia in gravidanza alla luce del nuovo Piano Nazionale di Eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2010-2015" del 17 Luglio 2013: <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=46583&parte=1%20&serie=>
- Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia (PNEMoRc) 2010-2015: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1519_allegato.pdf
- Definizioni di caso di rosolia e rosolia congenita della Commissione Europea del 2012: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:262:0001:0057:EN:PDF>
- Morbillo & Rosolia News: il bollettino della sorveglianza integrata morbillo-rosolia: <http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/bollettino.asp>
- Pubblicazione scientifica: "Congenital rubella still a public health problem in Italy: analysis of national surveillance data from 2005 to 2013" Euro Surveill. 2015;20(16):pii=21103: <http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=21103>
- Pubblicazione scientifica: "Underreporting of congenital rubella in Italy, 2010-2014." EJP 2017; 176(7):955-962
- Pubblicazione scientifica: "Comparison of rubella immunization rates in immigrant and Italian women of childbearing age: Results from the Italian behavioral surveillance system PASSI (2011-2015)." PLoS One. 2017 Oct 2;12(10):e0178122

L'elaborazione dei dati e la realizzazione del presente rapporto sono a cura di: Cristina Giambi, Martina Del Manso, Antonino Bella, Antonietta Filia, Maria Cristina Rota e grazie al prezioso contributo del Ministero della Salute e dei referenti presso le Asl, le Regioni/PA e i laboratori di diagnosi.

Referenti Regionali per la rosolia congenita e in gravidanza: Di Giacomo M (Abruzzo); Cauzillo G (Basilicata); Natter B (PA Bolzano); Mignuoli A (Calabria); De Gaetano A (Campania); Pascucci MG, Moschella L, Frasca G (Emilia-Romagna); Gallo T, Braidà C (Friuli Venezia Giulia); Scognamiglio P (Lazio); Carloni R (Liguria); Gramegna M, Rosa AM (Lombardia); Fiacchini D, Damiani N (Marche); Ponzio GV, Bagnoli C (Molise); Ferrara L, Giovanetti F (Piemonte); Prato R, Cappelli MG (Puglia); Palmas MA, Macis F, Cadau P (Sardegna); Palermo M (Sicilia); Balocchini E, Gallicchio S, Pecori L (Toscana); Carraro V, Zuccali MG (PA Trento); Ruffier M (Valle d'Aosta); Napoletano A, Zanella R (Veneto); Tosti A (Umbria).

La Sorveglianza della Rosolia Congenita e in Gravidanza è realizzata con il supporto del Ministero della Salute.

Citare questo documento come segue: Giambi C, Del Manso M, Bella A, Filia A, Rota MC. Rosolia congenita e in gravidanza News, Marzo 2018.