

Tabella 2. Raccomandazioni sui periodi di esclusione dalla frequenza scolastica in corso di malattie infettive

<b>Malattia</b>	<b>Raccomandazione basata sull'evidenza<sup>1</sup> (grado di raccomandazione)</b>	<b>Raccomandazione CDC<sup>2</sup></b>	<b>Raccomandazione Ministero della Sanità<sup>3</sup></b>
<b>Varicella</b>	5 giorni dall'esordio dell'esantema (A)	5 giorni dall'esordio dell'esantema	5 giorni dall'esordio dell'esantema
<b>Morbillo</b>	5 giorni dall'esordio dell'esantema (B)	5 giorni dall'esordio dell'esantema	5 giorni dall'esordio dell'esantema
<b>Rosolia</b>	5 giorni dall'esordio dell'esantema (B)	6 giorni dall'esordio dell'esantema	7 giorni dall'esordio dell'esantema
<b>Parotite</b>	5 giorni dall'esordio (B)	9 giorni dall'esordio	9 giorni dall'esordio
<b>Pertosse</b>	5 giorni dall'inizio del trattamento antibiotico 3 settimane in assenza di trattamento (B)	5 giorni dall'inizio del trattamento antibiotico 3 settimane in assenza di trattamento	5 giorni dall'inizio del trattamento antibiotico
<b>Epatite A</b>	Bambini < 5 anni: 5 giorni Bambini > 5 anni: nessuna restrizione (B)	Una settimana dall'esordio	Nessuna restrizione, precauzioni enteriche per 15 giorni dall'esordio dell'ittero
<b>Mononucleosi infettiva</b>	Nessuna restrizione (B)	Nessuna restrizione	Non riportato
<b>Faringite streptococcica</b>	Nessuna restrizione (B)	24 ore dall'inizio del trattamento antibiotico	Non riportato
<b>Scarlattina</b>	5 giorni dall'inizio del trattamento antibiotico (B)	Non riportato	48 ore dall'inizio del trattamento antibiotico
<b>Pediculosi del capo</b>	Nessuna restrizione (C)	24 ore dall'inizio del trattamento	Fino all'avvio del trattamento certificato dal medico curante
<b>Salmonellosi</b>	< 5 anni: almeno un campione fecale negativo ≥ 5 anni: almeno 24 ore dall'ultimo episodio di diarrea (C)	Nessuna restrizione	Nessuna restrizione

<sup>1</sup>cfr. ref 3

<sup>2</sup>cfr. ref 2

<sup>3</sup>cfr Circolare Ministero della Sanità n. 4 del 13 marzo 1998