

Tabella 2 - Benchmark indicatori quantitativi e qualitativi di consumo di antibiotici

| Indicatore  | Stima ULSS 4Emilia-Romagna | ARNO      | Friuli-Venezia Giulia |           |           |
|---|----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
|   | Danimarca<br>(IC 95%)      | (1)       | CINECA (2)            | (3)       | (4)       |
| % Trattati<br>con antibiotici sistemici           | 40,8<br>(40,2-41,4)        | 49,3<br>- | 55,2<br>-             | 46,4<br>- | 29,0<br>- |
| Tasso di prescrizioni<br>per 1 000 bambini-anno   | 763<br>(758-769)           | -<br>-    | -<br>-                | 884<br>-  | 649<br>-  |
| Trattamenti<br>per 100 bambini-anno               | 68,3<br>(67,8-68,9)        | 93,9<br>- | -<br>-                | -<br>-    | -<br>-    |
| Trattamenti<br>per bambino trattato               | 1,67<br>(1,68-1,71)        | 1,87<br>- | -<br>-                | -<br>-    | -<br>-    |
| % Trattamenti<br>con amoxicillina                 | 24,6<br>(24,0-25,2)        | 21,3<br>- | -<br>-                | 24,0<br>- | -<br>-    |
| % Trattamenti<br>con amoxicillina-clavulanato     | 26,4<br>(24,0-25,2)        | -<br>19,9 | -<br>-                | -<br>15,5 | -<br>-    |
| % Prescrizioni<br>con amoxicillina o amoxi.-clav. | 49,1<br>(48,4-49,7)        | -<br>-    | 39,4<br>-             | 88,0<br>- | -<br>-    |