

Tabella 1 - Distribuzione dei ricoveri per morbillo e tasso di ricovero per fascia di età

Fascia di età (anni)	n. ricoveri	Percentuale (%)	Tasso di ricovero (n. ricoveri/100 000 abitanti)
< 1	241	7,8	46,2
1-4	834	27,1	39,8
5-9	781	25,4	29,2
10-14	430	14,0	15,3
15-19	258	8,4	8,8
> 20	528	17,2	1,1
Totale	3 072	100	5,4

Tabella 2 - Distribuzione per fascia di età dei ricoveri con diagnosi di morbillo senza menzione di complicanze, polmonite ed encefalite

Ricoveri	Fascia di età (in anni)						Totale
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	≥ 20	
n. totale ricoveri	241	834	781	430	258	528	3 072
n. ricoveri con unica diagnosi di “morbillo senza menzione di complicanze” (%)	101 (41,9)	319 (38,2)	284 (36,4)	192 (44,6)	137 (53,1)	295 (55,9)	1 328 (43,2)
n. ricoveri con diagnosi di polmonite (%)	43 (17,8)	139 (16,6)	129 (16,5)	32 (7,4)	18 (4,6)	30 (5,7)	391 (12,7)
n. ricoveri con diagnosi di encefalite (%)	7 (2,9)	9 (1,0)	21 (3,4)	16 (3,7)	10 (3,9)	18 (3,4)	81 (2,6)