

**Tabella** - Stima della prevalenza percentuale degli uomini e delle donne appartenenti alla popolazione dell'OEC trattate per ipercolesterolemia secondo differenti condizioni di rischio CVD, per decenni d'età

<b>Fasce d'età</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
		<b>n.</b>	<b>%</b>	<b>n.</b>	<b>%</b>	<b>n.</b>	<b>%</b>
<b>Uomini</b>							
≤ 39	552	0	-	29	6,9	-	-
40-49	1 173	5	20,0	80	6,3	0	0,0
50-59	1 287	18	27,8	89	6,7	10	30,0
60-69	1 315	22	54,5	42	19,0	193	17,6
≥ 70	581	43	7,0	15	6,7	-	-
<b>Totale</b>	<b>4 908</b>	<b>88</b>	<b>23,9</b>	<b>255</b>	<b>8,6</b>	<b>203</b>	<b>18,2</b>
<b>Donne</b>							
≤ 39	545	0	-	15	6,7	-	-
40-49	1 215	2	0,0	60	8,3	0	0,0
50-59	1 227	2	0,0	123	12,2	11	100,0
60-69	1 254	10	40,0	104	17,3	59	89,8
≥ 70	559	7	0,0	38	15,8	-	-
<b>Totale</b>	<b>4 800</b>	<b>21</b>	<b>19,0</b>	<b>340</b>	<b>13,2</b>	<b>70</b>	<b>91,4</b>

A = Soggetti esaminati; B = Soggetti con precedente infarto; C = % di B sotto trattamento ipocolesterolemizzante; D = Soggetti con familiarità di ipercolesterolemia e LDL ≥ 160 mg/dl; E = % di D sotto trattamento ipocolesterolemizzante; F = Soggetti con rischio CVD ≥ 20% ed eleggibili di trattamento ipocolesterolemizzante; G = % di F sotto trattamento ipocolesterolemizzante