

Dizionario della SARS (definizioni aggiornate in data 1° maggio)

<i>Caso Sospetto</i>	<p>1. una persona che, dopo il 1° novembre 2002, presenti una storia di:</p> <ul style="list-style-type: none">—febbre alta > 38°C e contemporaneamente—tosse o difficoltà di respiro e contemporaneamente una o più delle seguenti condizioni nei 0 giorni precedenti l'inizio dei sintomi:—contatto ravvicinato con un caso sospetto o probabile di SARS—storia di viaggio in un'area con recente trasmissione locale di SARS.—Residenza in un'area con recente trasmissione di SARS
<i>Caso Probabile</i>	<ol style="list-style-type: none">1. un caso sospetto con radiografia del torace indicativa di polmonite o di Sindrome da Distress Respiratorio (RDS)2. un caso sospetto con riscontro positivo per Coronavirus associato alla SARS con uno o più test di laboratorio3. un caso sospetto con riscontro autoptico compatibile con Sindrome da Distress Respiratorio, senza altre cause identificabili
<i>Caso Importato</i>	Una persona, che ha contratto l'infezione in un paese in cui c'è diffusione locale della SARS, cui viene diagnosticata la SARS in Italia
<i>Contatto</i>	ogni persona esposta a un caso sospetto o probabile di SARS
<i>Contatto stretto/ravvicinato:</i>	<ol style="list-style-type: none">1) aver vissuto con una persona con sospetta o probabile SARS2) aver curato o essere stato a stretto contatto faccia a faccia (meno di 2 metri) con una persona con sospetta o probabile SARS3) aver avuto contatto diretto con secrezioni e/o liquidi organici di una persona con sospetta o probabile SARS
<i>Area affetta</i>	<p>Area in cui le Autorità nazionali riferiscono catene locali di trasmissione dell'infezione.</p> <p>Non rientrano tra le aree affette i Paesi in cui sono stati segnalati casi sospetti o probabili di SARS, senza che questi abbiano causato casi secondari di infezione.</p>
<i>Focolaio:</i>	Due o più casi di SARS in un gruppo di persone appartenenti alla stessa comunità (famiglia scuola ospedale ecc..) o comunque esposte ad una comune fonte di infezione
<i>Casi secondari:</i>	In un focolaio epidemico, i Casi che hanno contratto l'infezione, a partire da un primo caso (detto caso indice)
<i>Isolamento respiratorio:</i>	<p>per prevenire la trasmissione i casi sospetti o probabili di SARS dovrebbero essere posti in isolamento e sistemati in ordine decrescente di preferenza in</p> <ol style="list-style-type: none">1. stanze con pressione negativa e porte chiuse2. in stanze singole con bagno separato3. con paziente con la stessa patologia, in stanze a più letti o in corsia con sistema di aerazione indipendente.
<i>Quarantena</i>	Restrizione delle attività di persone sane che sono state esposte a casi affetti da SARS. La durata è uguale al massimo del periodo di incubazione, cioè 10 giorni.
<i>Sorveglianza Sanitaria (delle persone)</i>	Controllo sanitario delle persone esposte soggette a misure quarantenarie.
<i>Sorveglianza Epidemiologica (della malattia)</i>	Valutazione continua della diffusione dell'infezione nella popolazione, in termini di andamento nel tempo, di distribuzione geografica e di caratteristiche delle persone infette.