



CONVEGNO

La salute degli adolescenti: i dati della sorveglianza
Health Behaviour in School-aged Children

Aula Pocchiari - Istituto Superiore di Sanità - 1 ottobre 2019

Fumo, Alcol, Gioco d'azzardo

Natale Canale

Università di Padova

Lorena Charrier

Università di Torino



Comportamenti a rischio in adolescenza

❖ (Pre)Adolescenza: cambiamenti sociali



Comportamenti a rischio in adolescenza


- ❖ **Co-occorrenza di comportamenti potenzialmente additivi** (per es., Molinaro et al., 2018; Rømer Thomsen et al., 2019; Charrier et al., 2019)



Fumo



- ❖ **Il consumo di tabacco rimane la principale causa di morte prevenibile (WHO, 2017)**
- ❖ **Giovani: Sottostima dei rischi legati al fumo**
- ❖ **Funzione “regolatoria” del corpo, ma anche di tipo relazionale (Audrain-McGovern, 2012; Lambert, 2002)**




Maggiore nei ragazzi vs ragazze




Maggiore nelle ragazze vs ragazzi (+10%)

Maschi Femmine



Fumo



88,9% NON FUMA




... in linea con i dati 2014...

Attualmente quanto spesso fumi?


	11 anni % (N)	13 anni % (N)	15 anni % (N)	Totale % (N)
Ogni giorno	0.3 (57)	1.9 (331)	13.6 (1794)	4.6 (2182)
Almeno una volta a settimana	0.4 (80)	3.0 (483)	7.7 (1015)	3.4 (1578)
Meno di una volta a settimana	0.5 (126)	4.3 (642)	7.4 (1016)	3.8 (1784)
Non fumo	98.8 (17513)	90.8 (14892)	71.4 (9734)	88.2 (42139)
Totale	100.0 (17776)	100.0 (16348)	100.0 (13559)	100.0 (47683)



Cannabis



... lieve aumento rispetto ai dati 2014...




Alcol



- ❖ **L'OMS raccomanda la totale astensione dal consumo di alcol fino ai 15 anni e in Italia vige il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni**
- ❖ **Trend secolare di riduzione del consumo di alcolici (de Looze et al., 2015) ed un aumento del numero di astinenti tra i quindicenni (Vieno et al., 2018)**
- ❖ **Legame tra l'iniziazione in giovane età e l'abuso in età adulta (De Wit, 2000; Poikolainen, 2001).**



Alcol



Quanti giorni hai bevuto alcol (se mai lo hai fatto)?

Fai una crocetta per ogni riga



Nella tua vita


Negli ultimi 30 giorni

Mai	1-2 giorni	3-5 giorni	6-9 giorni	10-19 giorni	20-29 giorni	30 giorni o più
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						






Alcol



... consumi stabili rispetto ai dati 2014...



Alcol- Binge drinking




21 ● Considera gli ultimi 12 mesi: ti è mai capitato di consumare 5 bicchieri o più di bevande alcoliche, anche diverse, in un'unica occasione (una serata, una festa, da solo, ecc.)?

- No
- Sì, una volta
- Sì, più di una volta




Alcol- Binge drinking

Maschi Femmine




Alcol- Binge drinking

Maschi Femmine



Alcol- Binge drinking

Maschi Femmine



Alcol- Binge drinking



	11 anni		13 anni		15 anni	
	M	F	M	F	M	F
2018	11%	5%	19%	14%	43%	37%
2014	12%	6%	17%	12%	38 %	30%
					+ 5%	+ 7%


... rispetto ai dati 2014: il fenomeno si estremizza nei 15 enni...

Ubriachezza



almeno 2 volte nella vita

Italia	11 anni		13 anni		15 anni	
	M	F	M	F	M	F
2018	1	0	3	2	19	16
2014	1	0	4	2	19	14



**Ubriachezza:
almeno 2 volte
nella vita**

Italia	11 anni		13 anni		15 anni	
	M	F	M	F	M	F
2018	1	0	3	2	19	16
2014	1	0	4	2	19	14

31°

34°

**Italia vs resto
dello studio
nel 2014**

Gioco d'azzardo



- ❖ **Scommessa sul risultato di una gara o di un gioco di abilità o di fortuna in cui si può vincere o perdere denaro**
- ❖ **In Italia il legislatore è intervenuto più volte a ribadire la necessità di tutelare i minori, vietando loro l'accesso a tutti i giochi pubblici con vincita in denaro (per es., con la L. 15 luglio 2011)**


Gioco d'azzardo a rischio e problematico



- ❖ **Avere almeno due sintomi del disturbo da gioco d'azzardo (APA, 2013): per esempio, aver rubato soldi per scommettere, mentire, compromissione delle relazioni sociali**



Gioco d'azzardo a rischio e problematico



2014: totale 6%;
3 Regioni (>10%)
(Canale et al., 2017)





Gioco d'azzardo a rischio e problematico

2014: totale 6%;
3 Regioni (>10%)
(Canale et al., 2017)

2018: totale 16%;
14 Regioni (>10%)
2 Regioni (>20%)

2018	15-enni		Totale
	maschi	femmine	
Piemonte	19%	5%	15%
Valle d'Aosta	10%	0%	7%
Lombardia	14%	5%	11%
PA Trento	8%	7%	8%
PA Bolzano	12%	3%	8%
Friuli	10%	5%	8%
Liguria	13%	2%	11%
Emilia Romagna	14%	7%	11%
Toscana	16%	7%	13%
Umbria	20%	3%	14%
Marche	17%	8%	13%
Lazio	23%	10%	19%
Abruzzo	22%	6%	16%
Molise	17%	8%	14%
Campania	25%	12%	21%
Puglia	21%	14%	19%
Basilicata	25%	5%	19%
Calabria	26%	7%	20%
Sicilia	20%	9%	17%
Sardegna	15%	5%	11%
Veneto	11%	5%	9%
ITALIA	20%	9%	16%





Gioco d'azzardo a rischio e problematico



❖ **Prettamente maschile**





Gioco d'azzardo a rischio e problematico



Take home messages

- ❖ La quota totale (11-15anni) dei non fumatori negli ultimi 30 giorni si mantiene stabile



Take home messages

- ❖ La quota totale (11-15anni) dei non fumatori negli ultimi 30 giorni si mantiene stabile. Non bisogna comunque «abbassare la guardia»!



- ❖ Le 15enni italiane fumano di più rispetto ai coetanei maschi (32%vs25%)
- ❖ Aumentano i fenomeni estremi (binge drinking) legati al consumo di alcolici tra i 15enni
- ❖ Gioco d'azzardo a rischio/problematico al 16%, con un +10% rispetto al 2014.



hbsc

HEALTH BEHAVIOUR IN
SCHOOL-AGED CHILDREN

WORLD HEALTH ORGANIZATION
COLLABORATIVE CROSS-NATIONAL STUDY



Grazie per l'attenzione!

natale.canale@unipd.it

lorena.charrier@unito.it