



Salute e Invecchiamento Attivo in VENETO

Risultati della sorveglianza della popolazione
con 65 anni e più “PASSI d’Argento”

Indagine ottobre 2012- febbraio 2013



Salute e Invecchiamento Attivo in VENETO

Risultati della sorveglianza della popolazione
con 65 anni e più “PASSI d’Argento”

Indagine ottobre 2012- febbraio 2013

Per maggiori informazioni sulla sorveglianza PASSI d'Argento consultare:

<http://www.epicentro.iss.it/passi-argento/>

<http://www.regione.veneto.it/web/sanita/passi-dargento>

Questa pubblicazione è disponibile online all'indirizzo:

<http://www.epicentro.iss.it/passi-argento/>

<http://www.regione.veneto.it/web/sanita/passi-dargento>

Per informazioni sull'indagine PASSI d'Argento nel Veneto scrivere a:

sanitapubblica@regione.veneto.it

Rapporto a cura di:

Laura Tagliapietra, Regione del Veneto – Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria – Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica

Chiara Palutan, Osservatorio Regionale Politiche Sociali

Armando Olivieri, Azienda ULSS 15 – Alta Padovana – Dipartimento di Prevenzione

Hanno contribuito alla realizzazione dell'indagine

- a livello nazionale:

Alberto Perra, Benedetta Contoli, Maria Chiara Antoniotti, Amedeo Baldi, Elvira Bianco, Lilia Biscaglia, Giuliano Carrozzi, Luciana Chiti, Marco Cristofori, Amalia De Luca, Teresa Di Fiandra, Arianna Dittami, Rita Ferrelli, Luana Penna, Stefania Salmaso (Gruppo Tecnico Operativo)

- a livello regionale:

Gruppo di Coordinamento Regionale:

Francesca Russo, Annalisa Basso, Federica Michieletto, Laura Tagliapietra, Elisabetta Temporin, Armando Olivieri, Chiara Palutan, Antonella Pinzauti, Luciano Milani, Silvia Ceschel

Coordinatori delle Aziende ULSS:

Antonio Lalli (ULSS 1), Luigi Cazzola (ULSS 2), Mario Marin (ULSS 3), Mario Righele (ULSS 4), Ermanno Dian (ULSS 5), Emma Nardin (ULSS 6), Paola Colussi (ULSS 6), Tiziana Menegon (ULSS 7), Luciano Milani (ULSS 8), Gloria Angela Baracco (ULSS 8), Mauro Ramigni (ULSS 9), Luigi Nicolardi (ULSS 10), Stefano Errico (ULSS 12), Giovanna Busso (ULSS 12), Carla Vianello (ULSS 14), Massimo Palmosi (ULSS 15), Chiara Schiavinato (ULSS 17), Monica Venturini (ULSS 18), Annamaria Del Sole (ULSS 19), Luigi Bertinato (ULSS 20), Luisa Andreetta (ULSS 21), Paolo Giavoni (ULSS 22)

Si ringraziano:

- tutti gli Intervistatori delle Aziende ULSS, dei Comuni e delle Associazioni di volontariato, che hanno realizzato l'indagine;
- tutte le persone che hanno fornito aiuto e supporto durante le interviste e i Medici di Medicina Generale per la preziosa collaborazione fornita;
- tutte le persone con 65 anni e più che hanno partecipato all'indagine. Grazie a loro è stato possibile conoscere da vicino le esigenze di questa fascia di popolazione all'interno della nostra Regione.

Indice

	Pag.
Prefazione	i
Premessa	iii
Destinatari, obiettivi e struttura del rapporto	v
La sorveglianza di popolazione PASSI d'Argento	vi
L'indagine PASSI d'Argento ottobre 2012- febbraio 2013 in Veneto	viii
1 – BENESSERE E INDIPENDENZA	1
1.1 Caratteristiche socio-demografiche	2
1.1.1 Come è distribuito il campione per genere e classe d'età? Quanto è rappresentativo della popolazione con 65 anni e più?	2
1.1.2 Qual è lo stato civile?	3
1.1.3 Quale è il livello di istruzione?	3
1.1.4 Con chi vivono?	4
1.1.5 Come arrivano a fine mese?	4
1.1.6 Come si distribuiscono le difficoltà economiche?	4
1.1.7 Quanti percepiscono una pensione?	5
1.2 I sottogruppi della popolazione con 65 anni e più	6
1.2.1 Perché la popolazione con 65 anni e più è stata suddivisa in sottogruppi?	6
1.2.2 Come sono stati individuati i sottogruppi di popolazione?	7
1.2.3 Cosa sono le ADL/IADL?	8
1.2.4 In Veneto come è distribuita la popolazione con 65 anni e più rispetto ai sottogruppi?	9
1.2.5 Qual è la distribuzione dei sottogruppi in ciascuna classe di età?	9
1.2.6 Qual è la distribuzione dei sottogruppi nei due generi?	10
1.3 Autonomia nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, di base e strumentali	11
1.3.1 Quanti non sono autonomi nelle attività della vita quotidiana (IADL o ADL)?	11
1.3.2 Attività di base della vita quotidiana ADL	11
1.3.2.1 Come si distribuiscono le dipendenze nelle ADL?	11
1.3.2.2 Quale è la distribuzione per età e sesso delle persone con disabilità?	12
1.3.2.3 Quali sono le ADL più frequentemente compromesse?	12
1.3.3 Attività strumentali della vita quotidiana IADL	13
1.3.3.1 Come si distribuiscono le dipendenze nelle IADL?	13

1.3.3.2 Quale è la distribuzione per età e sesso delle persone con almeno 1 IADL non autonoma?	13
1.3.3.3 Quali sono le IADL più frequentemente compromesse?	14
1.4 Percezione dello stato di salute	15
1.4.1 Come percepiscono il proprio stato di salute le persone con 65 anni e più?	15
1.4.2 Come si sentono rispetto all'anno precedente?	16
1.4.3 In media quanti sono i giorni di cattiva salute percepita in un mese e in che misura limitano le attività di tutti i giorni?	17
1.4.4 Quante persone si sentono in cattiva salute o hanno limitazioni nelle attività abituali per più di 14 giorni negli ultimi 30 giorni ?	18
1.4.5 Quante persone hanno più di 20 “unhealthy days” per motivi fisici o psicologici?	19
1.5 Soddisfazione per la propria vita	20
1.5.1 Le persone con 65 anni e più sono soddisfatte della vita che conducono?	20
1.6 Indicatori che descrivono il benessere e l'indipendenza: un confronto tra il Veneto e i dati nazionali	21
2 – FATTORI DI RISCHIO, CONDIZIONI DI SALUTE E CURE	22
2.1 Stili di vita : attività fisica, abitudini alimentari, alcol e fumo	22
2.1.1 Attività fisica	22
2.1.1.1 Quante sono le persone con 65 anni e più attive fisicamente?	23
2.1.2 Stato nutrizionale e abitudini alimentari	26
2.1.2.1 Qual è lo stato nutrizionale delle persone con 65 anni e più?	26
2.1.2.2 Quante porzioni di frutta e verdura al giorno consumano le persone con 65 anni e più?	27
2.1.2.3 Quali sono le caratteristiche delle persone che consumano almeno tre porzioni di frutta e verdura al giorno?	27
2.1.3 Consumo di alcol	28
2.1.3.1 Distribuzione del consumo di alcol per età e sesso	28
2.1.3.2 Quante persone con 65 anni e più sono bevitori a rischio, ovvero consumano più di una unità alcolica al giorno ? E quali sono le loro caratteristiche?	29
2.1.3.3 Quante persone hanno ricevuto il consiglio di ridurre il consumo di alcol da parte di un operatore sanitario?	29
2.1.4 Abitudine al fumo	30
2.1.4.1 Come è distribuita l'abitudine al fumo?	30
2.1.4.2 Quante persone con 65 anni e più sono fumatori? E quali sono le loro	31

caratteristiche?	
2.1.4.3 Quanti fumatori hanno ricevuto il consiglio di smettere di fumare da parte di un operatore sanitario?	31
2.2 Ipertensione arteriosa	32
2.2.1 Quali sono le caratteristiche delle persone che soffrono di ipertensione?	32
2.3 Prevalenza delle malattie croniche non trasmissibili	33
2.3.1 Qual è la prevalenza di patologie croniche nella popolazione con 65 anni e più?	33
2.3.2 Quali sono le caratteristiche delle persone che riferiscono 3 o più patologie croniche?	33
2.4 Problemi di vista, udito e masticazione	34
2.4.1 Problemi di vista	34
2.4.1.1 Quali sono le caratteristiche delle persone che hanno problemi di vista?	34
2.4.2 Problemi di udito	35
2.4.2.1 Quali sono le caratteristiche delle persone che hanno problemi di udito?	35
2.4.3 Problemi di masticazione	36
2.4.3.1 Quali sono le caratteristiche delle persone che hanno problemi di masticazione?	36
2.4.3.2 Quante persone con 65 anni e più sono state dal dentista almeno una volta nell'ultimo anno?	37
2.4.3.3 Perché le persone non si recano dal dentista?	37
2.5 Cadute	38
2.5.1 Quante persone con 65 anni e più sono cadute negli ultimi 30 giorni e quali sono le loro caratteristiche?	38
2.5.2 Quante persone con 65 anni e più sono cadute e nella loro abitazione non usano precauzioni anticaduta?	39
2.6 Sintomi di depressione	40
2.6.1 Quante sono le persone con sintomi di depressione e quali sono le loro caratteristiche?	40
2.6.2 Quante sono le persone con 65 anni e più che presentano sintomi di depressione che non fanno ricorso ad alcuno?	41
2.6.3 A chi ricorrono coloro che presentano sintomi di depressione?	41
2.7 Rischio di isolamento	42
2.7.1 Quante sono le persone a rischio di isolamento sociale e quali sono le loro caratteristiche?	42
2.8 Sicurezza nell'uso dei farmaci	43
2.8.1 Quante persone con 65 anni e più hanno fatto uso di farmaci negli ultimi 7 giorni?	43
2.8.2 Quanti tipi differenti di medicine prendono?	44
2.8.3 Quanti hanno rivisto la terapia farmacologica con il MMG negli ultimi 30 giorni?	44
2.9 Aiuto nelle attività della vita quotidiana	45
2.9.1 Quante persone ricevono aiuto tra quelle che hanno limitazioni nelle attività della vita	45

quotidiana? Da chi lo ricevono?	
2.9.2 Come viene giudicato l'aiuto ricevuto?	45
2.10 Vaccinazione antiinfluenzale	46
2.10.1 Quante persone con 65 anni e più NON hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale? E quali sono le loro caratteristiche?	46
2.10.2 Quanti hanno ricevuto il consiglio di fare la vaccinazione antinfluenzale?	47
2.11 Protezione dalle ondate di calore	48
2.11.1 Quante persone con 65 anni e più hanno ricevuto consigli per proteggersi dal caldo? E quali sono le loro caratteristiche?	48
2.11.2 Da chi sono state ricevute informazioni o consigli per proteggersi dal caldo?	49
2.12 Indicatori che descrivono fattori di rischio e condizioni di salute: un confronto tra il Veneto e i dati nazionali	50
 3 - PARTECIPAZIONE	 51
3.1 Formazione e apprendimento	53
3.2 Lavoro	54
3.2.1 Quante persone con 65 anni e più svolgono un lavoro retribuito?	54
3.3 Attività sociali e comunitarie	55
3.3.1 Quante persone con 65 anni e più partecipano ad attività sociali?	55
3.3.2 Quante persone con 65 anni e più partecipano a gite o soggiorni organizzati?	55
3.4 Essere una risorsa per famiglia, conoscenti e collettività	56
3.4.1 Quanti sono complessivamente gli anziani che rappresentano una risorsa per la società?	56
3.4.2 Per CHI i nostri anziani rappresentano una risorsa?	56
3.4.3 Quali sono le caratteristiche degli anziani che aiutano familiari e amici con cui condividono l'abitazione?	57
3.4.4 Quali sono le caratteristiche degli anziani che sono di supporto a persone che non convivono con loro?	57
3.4.5 Quali sono le caratteristiche degli anziani che sono di aiuto alla collettività?	58
3.4.6 Cosa possiamo fare perchè la persona con 65 anni e più possa rimanere una risorsa all'interno dei diversi ambiti di vita?	59
3.5 Indicatori che descrivono la partecipazione e l'essere risorsa: un confronto tra il Veneto e i dati nazionali	60
 4 – AMBIENTE DI VITA	 61
4.1 Accessibilità ai servizi	62

4.1.1 Quanti hanno difficoltà a raggiungere i servizi?	62
4.1.2 Chi ha maggiori difficoltà a raggiungere i servizi sociosanitari?	63
4.1.3 Chi ha maggiori difficoltà a raggiungere negozi di generi alimentari e/o supermercati?	64
4.2 Abitazione	65
4.2.1 Quanti vivono in un'abitazione propria e quanti in affitto?	65
4.2.2 Quali problemi hanno le abitazioni in cui vivono le persone con 65 anni e più?	66
4.2.3 Chi segnala maggiormente problemi dell'abitazione in cui vive?	66
4.2.4 La segnalazione di problemi dell'abitazione cambia in relazione alla sua proprietà?	67
4.3 Sicurezza dell'area di residenza	68
4.3.1 Quante persone si sentono sicure nell'area in cui vivono?	68
4.3.2 Quali persone si sentono maggiormente insicure nell'area in cui vivono?	68
4.4 Indicatori che descrivono l'ambiente di vita e l'accessibilità ai servizi: un confronto tra il Veneto e i dati nazionali	69
 BIBLIOGRAFIA	 71
SITOGRAFIA	74

Prefazione

In Veneto una persona su cinque è sopra i 64 anni, proporzione destinata a crescere negli anni futuri.

L'invecchiamento della popolazione, con il conseguente incremento delle patologie cronico-degenerative e lo sviluppo tecnologico, farmaceutico e sociale, ha portato ad un'evoluzione dei servizi socio-sanitari sempre più complessa implicando un aggravio maggiore in termini di costi socio-economici sia per il sistema socio-sanitario pubblico che per le famiglie stesse.

In tale contesto si comprende, quindi, l'esigenza di disporre di informazioni sistematiche e periodiche sui bisogni della popolazione anziana e sulla qualità dell'assistenza socio-sanitaria da essa ricevuta.

In questa ottica la Regione del Veneto ha partecipato nel biennio 2008-2010 alla sperimentazione nazionale del sistema di sorveglianza PASSI d'Argento con l'Azienda ULSS 15 Alta Padovana. Nel 2012 la sorveglianza è stata estesa alle altre Aziende ULSS del Veneto, vedendo la partecipazione congiunta dell'area sociale e sanitaria di 19 Aziende ULSS. Sono state raccolte circa mille interviste.

La sorveglianza PASSI d'Argento risulta particolarmente strategica in quanto completa il quadro fornito dai sistemi di sorveglianza attivi in Veneto su diverse fasce di età (dall'infanzia Okkio alla Salute, passando per l'adolescenza HBSC – HealthBehavior School Children, la popolazione adulta PASSI), permettendo di valutare lo stato e la percezione della salute, le condizioni di rischio nell'intero arco temporale della vita dell'individuo.

Invecchiare in buona salute è una sfida per tutte le società moderne, e i servizi socio-sanitari sono chiamati ad indirizzare i loro interventi nell'obiettivo comune di migliorare la qualità della vita della popolazione. L'insieme degli indicatori qui presentati vuole essere un valido aiuto per supportare i servizi nelle scelte strategiche di intervento.

Nel presente rapporto i dati vengono illustrati in 4 sezioni secondo la chiave di lettura del modello dell'OMS dell'healthy and activeageing: “Benessere e indipendenza”, “Fattori di rischio, condizione di salute e cure”, “Partecipazione” e “Ambiente di vita”.

Un sentito ringraziamento a quanti, a vario titolo, hanno contribuito con il proprio lavoro, motivazione e passione, alla buona riuscita dell'indagine ed ai cittadini intervistati che dedicando il loro tempo hanno contribuito a fornire utili informazioni per la salute della comunità.

Si invita, pertanto, alla lettura del presente rapporto tutti coloro che sono coinvolti nelle attività sociali e di sanità pubblica, sia come promotori che destinatari.

Direttore Generale Area Sanità e Sociale

Dott. Domenico Mantoan

Premessa

L'invecchiamento di popolazione è un fenomeno globale, che riguarda da vicino il nostro Paese. Innovare ed agire è la duplice risposta del sistema di sorveglianza PASSI d'Argento alle sfide poste dall'invecchiamento di popolazione. Innovare perché l'attuale transizione demografica – caratterizzata dall'allungamento della speranza di vita e dal calo delle nascite – richiede una nuova visione della società e dei rapporti tra cittadini. Non a caso, il 2012 è stato proclamato “Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni”. PASSI d'Argento - che dal 2009 fornisce informazioni tempestive e confrontabili tra le Regioni italiane sullo stato di salute e l'invecchiamento attivo delle persone con 65 anni e più - promuove uno sguardo nuovo al fenomeno, a partire dalla definizione di invecchiamento attivo voluta dall'OMS. Per la prima volta, PASSI d'Argento “misura” il contributo che le persone con 65 anni e più offrono alla società, fornendo sostegno all'interno del proprio contesto familiare e della comunità. Sono centrali aspetti come la partecipazione e il benessere psicologico e sociale della persona con 65 anni e più.

PASSI d'Argento permette anche di “misurare per agire”, sostenendo azioni concrete di promozione della salute e dell'invecchiamento attivo. Il sistema PASSI d'Argento fornisce informazioni dettagliate su abitudini e stili di vita della popolazione con 65 anni e più, e completa il quadro offerto dalla sorveglianza PASSI sulla popolazione con 18 - 69 anni. L'invecchiamento attivo è infatti, un processo che si costruisce ben prima dei 65 anni. In particolare, la sorveglianza di popolazione è un eccezionale strumento di *governance* per far fronte all'elevata e crescente diffusione delle malattie croniche. I piani d'azione della Regione Europa per le malattie croniche non trasmissibili 2008-2013 e 2012-2016, assegnano un ruolo fondamentale alla sorveglianza (Risoluzione OMS, settembre 2011, punto 2a) come strumento capace di seguire nel tempo e fornire dati affidabili e tempestivi sui problemi di salute, i loro determinanti, la percezione dei cittadini, la diffusione delle misure di prevenzione e di promozione della salute, in particolare con informazioni “disaggregate sui determinanti sociali”. Inoltre, PASSI d'Argento è uno strumento interno al sistema dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. Le informazioni prodotte dalla sorveglianza PASSI d'Argento permettono di indirizzare in maniera più razionale ed efficace politiche e strategie di intervento a livello nazionale e delle singole Regioni. L'utilizzazione dei dati di sorveglianza diventa essenziale per i livelli operativi – ad esempio le ASL, i distretti o i grandi comuni – laddove si programmano e si realizzano gli interventi a favore della popolazione con 65 anni e più. Il sistema centrato sulle Regioni fin dalle fasi iniziali di sperimentazioni, ha contribuito al monitoraggio Piano Nazionale della Prevenzione 2010–2013 offrendo elementi importanti per la valutazione delle attività di prevenzione. Il sostegno fornito in questi anni dalle Regioni italiane e l'eccezionale partecipazione all'indagine 2012-2013 – che ha coinvolto 19 tra regioni e Province Autonome – testimoniano la rilevanza dei temi trattati e l'interesse per l'approccio innovativo proposto dalla sorveglianza PASSI d'Argento. L'auspicio per gli anni a venire è che la sorveglianza diventi, a tutti i livelli, parte integrante del Sistema. Solo in questo modo sarà possibile affrontare al meglio le opportunità offerte da una società che “progredisce in età”, prestando attenzione fin da ora al futuro delle generazioni più giovani.

Stefania Salmaso

Direttore del CNESPS

Responsabile scientifico del progetto di messa a regime della sorveglianza PASSI d'Argento

Destinatari, obiettivi e struttura del rapporto

Il rapporto regionale “PASSI d’Argento” 2012-2013 presenta i risultati dell’indagine svolta in Veneto tra ottobre 2012 e febbraio 2013. I destinatari principali del rapporto sono gli operatori che, a vario livello, sono coinvolti nella messa a regime del sistema di sorveglianza.

Il rapporto ha l’obiettivo di:

- fornire una panoramica completa della sorveglianza di popolazione PASSI d’Argento, in modo da favorire la comprensione di obiettivi, metodi e principali aspetti innovativi del sistema;
- mettere a disposizione di tecnici e addetti ai lavori un documento di consultazione dei risultati dell’indagine PASSI d’Argento ottobre 2012 – febbraio 2013 condotta a livello regionale.

Nelle pagine seguenti, i risultati della sorveglianza PASSI d’Argento sono presentati all’interno di 4 capitoli:

1. Benessere e indipendenza
2. Fattori di rischio, condizioni di salute e cure
3. Partecipazione
4. Ambiente di vita.

La scelta di dare rilievo agli aspetti che riguardano la partecipazione e l’ambiente di vita è in linea con un approccio intersettoriale al fenomeno dell’invecchiamento. Il sistema PASSI d’Argento fa esplicito riferimento al modello dell’OMS (dal 2002 in poi) dell’ healthy and active ageing, che sollecita lo sviluppo di politiche e interventi nell’ambito dei tre pilastri dell’invecchiamento attivo: salute, partecipazione e sicurezza. Il riferimento al modello dell’OMS come chiave di lettura dei risultati PASSI d’Argento, risponde a un obiettivo specifico: sostenere la visione di invecchiamento attivo e fornire dati tempestivi e validi sui problemi oggetto di prevenzione e su alcuni indicatori che misurano la diffusione delle attività di prevenzione. Tuttavia, i fenomeni descritti in PASSI D’Argento non intendono essere esaustivi rispetto alle dimensioni definite dall’OMS.

I risultati delle precedenti indagini PASSI d’Argento e i risultati dell’indagine 2012-2013 saranno disponibili online all’indirizzo: <http://www.epicentro.iss.it/passi-argento> e <http://www.regione.veneto.it/web/sanita/passi-dargento>.

La sorveglianza di popolazione PASSI d'Argento

Perché una sorveglianza sulla popolazione con 65 anni e più?

L'invecchiamento è un processo che interessa tutti gli individui. Il modo in cui ciascuno di noi invecchia dipende da caratteristiche individuali e fattori genetici, ma è fortemente influenzato anche da fattori sociali, dagli stili di vita e più in generale dalle opportunità di salute offerte dal proprio contesto di vita. Le persone con 65 anni e più costituiscono quindi, un gruppo eterogeneo, ad esempio, per motivi di genere, origine etnica, disabilità, come anche per il modo in cui gli stessi interessati giudicano la propria età. Nei prossimi anni, aumenterà il numero di persone che necessitano di assistenza per rimanere autonome in età avanzata, ma anche di quelle in buona salute che svolgono attività lavorativa e partecipano ad attività nel contesto della loro famiglia e della comunità in cui vivono.

La sorveglianza epidemiologica di popolazione PASSI d'Argento si propone quale strumento per registrare i bisogni diversi di questa fascia di popolazione e tempestivamente indicarli a decisori e altri gruppi di interesse. Grazie all'uso di una metodologia standardizzata, è possibile, per la prima volta, confrontare lo stato di salute e l'invecchiamento attivo nelle diverse Regioni italiane con dati di qualità raccolti sulla popolazione generale e non sugli utenti di singoli servizi, con il supporto tecnico e scientifico di un gruppo di lavoro composto da coordinatori regionali e ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Cosa è stato fatto ad oggi?

Nel biennio 2008-2010, il Progetto "PASSI d'Argento", affidato dal Ministero della Salute/CCM alla Regione Umbria e al Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) dell'ISS, ha promosso la raccolta e l'utilizzazione di indicatori utili per stimare lo stato di salute della popolazione italiana con 65 anni e più e contribuire a valutare le politiche di invecchiamento attivo. Il progetto PASSI d'Argento si è articolato in due indagini sperimentali che hanno coinvolto complessivamente 16 regioni italiane. Sono state raccolte informazioni su un campione di oltre 8.000 persone. Nel 2011, il Ministero della Salute ha affidato al CNESPS il progetto di messa a regime del sistema di sorveglianza sulla popolazione anziana.

In seguito, tra marzo 2012 e gennaio 2013 sono state effettuate oltre 24.000 interviste in tutte le regioni italiane ad eccezione di Basilicata e della Provincia Autonoma di Bolzano che non hanno partecipato alla sorveglianza. La raccolta dati ha coinvolto circa 1.000 operatori opportunamente formati. La formazione, elemento centrale del sistema di sorveglianza, risponde all'esigenza primaria di standardizzare le procedure nei diversi contesti regionali e locali in modo da favorire:

- l'omogeneità e confrontabilità dei dati raccolti;
- l'interpretazione condivisa dei risultati;
- l'efficace diffusione ed utilizzazione delle informazioni di sorveglianza;
- la valutazione dei processi e degli esiti delle attività di sorveglianza.

Il percorso formativo si è articolato in incontri di formazione residenziale (a Roma, presso le sedi dell'ISS) e un percorso di formazione sul campo, all'interno del contesto professionale dei partecipanti. I coordinatori regionali, locali e gli intervistatori, inoltre hanno costituito una comunità di pratica grazie all'utilizzo di una piattaforma web (moodle) (www.passidargento.it/moodle) alla quale hanno un accesso protetto e che consente loro di coordinarsi e collaborare nell'elaborazione cooperativa di contenuti e nello svolgimento dell'indagine.

vi

Come funziona il sistema PASSI d'Argento?

L'approccio adottato è quello della sorveglianza epidemiologica di popolazione basata su indagini ripetute su campioni rappresentativi della popolazione in studio. La sorveglianza è orientata alla raccolta di informazioni essenziali, che rispondono ad una duplice finalità:

- descrivere i problemi e gli aspetti di salute della popolazione con 65 anni e più;
- monitorare gli interventi messi in atto e promuovere azioni e strategie d'intervento efficaci.

Gli strumenti e le procedure adottate sono semplici e utilizzabili da operatori sanitari e sociali e dai cittadini, sono sostenibili con le risorse dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. Per la realizzazione dell'indagine PASSI d'Argento in diversi contesti si è rivelata essenziale la collaborazione tra enti e istituzioni del settore sanitario e sociale a tutti i livelli (nazionale, regionale e locale).

La popolazione in studio è costituita dalle persone con 65 anni e più che possiedono un telefono e che non hanno gravi problematiche psico-fisiche. Sono definite non eleggibili le persone che al momento della rilevazione erano domiciliate fuori del comune di residenza, ospitate in Strutture Sanitarie Assistite, ricoverate in ospedale o residenti in carcere.

In ogni regione partecipante è stato estratto un campione rappresentativo mediante campionamento casuale semplice, stratificato per classi di età e genere o mediante campionamento a cluster. Il campionamento viene effettuato sulle liste delle anagrafi sanitarie delle ASL aderenti. Si formano 6 strati: per ciascuno dei due sessi vengono considerate le classi di età 65-74 anni, 75-84 e 85 e più anni.

La possibilità di effettuare il campionamento a cluster è stata introdotta in questa indagine e prevede che i comuni, e non le persone individualmente, vengano inizialmente selezionate. Una volta individuati i comuni poi si estraggono le persone da intervistare. La selezione dei comuni viene effettuata in modo che i comuni con numerosità maggiore di abitanti abbiano maggiore possibilità di veder estratti i loro abitanti rispetto a quelli con numerosità inferiore (metodo della probabilità proportional to size). Questo tipo di campionamento presenta diversi vantaggi, quali la possibilità di concentrare il lavoro degli operatori su un numero limitato di comuni rispetto al metodo del campionamento casuale semplice che richiede di effettuare le interviste in un numero maggiore di ASL nella regione. In questo modo si rende più agevole anche lo spostamento necessario per effettuare le interviste faccia a faccia. Il principale svantaggio del campionamento a cluster è legato alla variabilità stimata del campione in quanto le persone appartenenti allo stesso cluster hanno la tendenza ad essere simili per alcune caratteristiche socio-demografiche. Questo inconveniente comunque è facilmente compensato aumentando il numero dei soggetti campionati, in ordine al raggiungimento dei livelli di precisione desiderati pari al $\pm 3\%$ per le stime ottenibili a livello regionale e al $\pm 5\%$ per le singole ASL.

La rappresentatività è sempre garantita a livello regionale, in alcuni casi anche a livello aziendale.

Per la raccolta dei dati è stato utilizzato un questionario standardizzato, diviso in 6 sezioni dove sono presenti circa 80 domande a risposta multipla.

La somministrazione del questionario poteva avvenire attraverso una duplice modalità: per intervista telefonica o faccia a faccia. In alcuni casi, come previsto dal protocollo dell'indagine, le interviste sono state realizzate grazie ad un familiare o persona di fiducia che ha sostenuto e aiutato la persona durante l'intervista. È stata chiesta una valutazione sull'indagine PASSI d'Argento al Comitato Etico dell'Istituto Superiore di Sanità che ha formulato un parere favorevole sotto il profilo etico. Le operazioni previste dall'indagine PASSI d'Argento in cui sono trattati dati personali sono effettuate nel rispetto della normativa sulla privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali). Le persone selezionate per l'intervista sono state informate per lettera sugli

obiettivi e le modalità di realizzazione dell'indagine e sulle modalità adottate dallo studio per garantire privacy e confidenzialità degli intervistati. Gli intervistatori hanno contattato direttamente per telefono le persone selezionate per chiedere il consenso all'intervista e presentare gli obiettivi e i metodi dello studio. Prima dell'intervista, sia faccia a faccia sia telefonica, l'intervistatore ha indicato nuovamente gli obiettivi dello studio e le misure adottate per garantire la privacy. Dopo l'intervista i dati nominativi delle persone selezionate sono stati conservati per alcuni giorni in un luogo sicuro sotto la responsabilità del coordinatore regionale/aziendale dell'indagine e quindi distrutti dopo la validazione del questionario. Nessun dato nominativo è rintracciabile nel supporto informatico della base di dati e quindi non è possibile in alcun modo risalire all'intervistato.

L'intervistatore effettua l'intervista attraverso CATI (computer assisted telephone interview) o questionari cartacei con successiva immissione dei dati su un personal computer.

Tutti i record vengono trasmessi criptati ad un database centralizzato in cui vengono eseguiti i controlli di base di qualità dei dati disponibili presso il sito (www.passidargento.it/dati).

L'indagine PASSI d'Argento ottobre 2012 – febbraio 2013 in Veneto

Il Veneto ha aderito alla messa a regime del sistema partecipando alla realizzazione dell'indagine 2012-2013. Per la realizzazione dell'indagine sono stati formati con formazione regionale 64 operatori. Di questi 54 (84%) lavoravano presso servizi socio-sanitari delle ULSS. Il restante 16% era costituito da volontari e studenti di corsi di laurea. Questi operatori a loro volta hanno formato nelle proprie Aziende altri operatori, raggiungendo così un totale di circa 90 operatori formati.

Quante persone sono state intervistate per l'indagine?

In Veneto, nel corso dell'indagine sono state intervistate 1.060 persone con 65 anni e più individuate con campionamento a cluster e rappresentativa a livello regionale.

Le interviste sono state effettuate nel periodo compreso tra ottobre 2012 e febbraio 2013.

L'8% delle persone sono state escluse dal campione in quanto "non eleggibili", ovvero non rispondenti ai criteri di selezione per l'indagine perché:

- domiciliate fuori del comune di residenza (23 casi, 2%);
- decedute (15 casi, 1%);
- ricoverate in ospedale od ospitate in RSA al momento dell'indagine (36 casi, 2,5%);
- altro (38 casi, 3%).

Il tasso di risposta è stato pari all' 81%. Le persone con 65 anni e più selezionate sostituite sono state pari al 19% del campione. L'88,5% delle sostituzioni era dovuto al rifiuto a sostenere l'intervista, un ulteriore 11,5% riguardava persone con le quali non è stato possibile mettersi in contatto perché non reperibili o perché senza telefono o telefono non rintracciabile.

Le interviste sono state effettuate mediante questionario cartaceo nel 70% dei casi e CATI nel restante 30%.

Quanti sono stati intervistati con l'aiuto di familiari o persone di fiducia?

Nella prima sezione del questionario è previsto un test della memoria che permette di valutare l'orientamento spazio-temporale dell'anziano/a. Il test è costituito da 6 domande estratte dal Mini-Mental Test. Nel caso in cui l'anziano/a non supera il test della memoria o è impossibilitato fin dall'inizio a sostenere l'intervista per motivi psico-fisici la persona può essere intervistata con l'aiuto del "proxy", un familiare o una persona di fiducia dell'anziano che conosce le sue caratteristiche e abitudini. Ciò ha consentito di raccogliere informazioni su persone che altrimenti non avrebbero potuto sostenere l'intervista a causa delle condizioni di salute.

In Veneto, l'intervento del proxy si è verificato nel 21% dei casi (n=220), di cui nel 18% (n=191) fin dall'inizio dell'intervista e nel 3% (n=29) dopo il test della memoria e dell'orientamento previsto.

Quale era la modalità di intervista?

Le persone rintracciate sono state intervistate telefonicamente o faccia a faccia dagli operatori specificamente formati. La modalità di intervista è scelta sulla base delle necessità o eventuali problematiche di comunicazione dell'intervistato. Le interviste telefoniche sono state l'89% (n=941) mentre l'11% (119 casi) sono state realizzate con modalità faccia a faccia.

La durata dell'intervista è stata in media di 26 minuti se telefonica, 32 minuti se faccia a faccia.

Nel caso di intervista faccia a faccia, l'operatore ha svolto in media 6 km per raggiungere l'anziano.

1. Benessere e indipendenza

È ormai assodata l'utilità delle misure soggettive del benessere e della salute. Le percezioni e le valutazioni soggettive influenzano il modo in cui le persone affrontano la vita, e possiedono un elevato valore informativo. Al contrario, i parametri quantitativi tradizionalmente utilizzati come misura di outcome non sono sempre correlati con lo stato funzionale ed il benessere generale della persona.

In particolare, il concetto di “qualità della vita” è in linea con le indicazioni dell'OMS, che definisce la salute come “uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e non solo assenza di malattia”. La “qualità della vita collegata allo stato di salute” (Health Related Quality Of Life – HRQOL) è una valutazione soggettiva globale dello stato di salute che include il benessere fisico e mentale, e diversi fattori ad esso correlati tra cui: lo stato funzionale, lo stato socio-economico e il grado di integrazione sociale. La qualità della vita dipende anche da aspetti difficili da rilevare oggettivamente, come per esempio le risorse psicologiche e fisiologiche di una persona o la sua capacità di reagire all'eventuale presenza di malattie. In Italia si assiste ad un costante aumento dell'attesa di vita degli uomini e delle donne con una quota importante tuttavia gravata da disabilità: in tal senso l'HRQOL può rivelarsi uno strumento di particolare importanza per contribuire alla misura “percepita” di questo scostamento.

A differenza di quanto avviene per le affezioni acute - dove indici come la mortalità, la letalità o il tasso di guarigione sono molto significativi - la misura della qualità della vita collegata allo stato di salute diventa fondamentale nel quadro delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT) che interessano in maniera preponderante le persone con 65 anni e più.

A livello della comunità, le misure della qualità della vita forniscono inoltre indicazioni relative alle disuguaglianze nella salute perché tali misure non dipendono solo dalla presenza e dal tipo di malattia, ma anche dalle risorse economiche, sociali ed altre condizioni pratiche. Includere gli indicatori della qualità della vita all'interno di un sistema di sorveglianza consente di ottenere informazioni utili a descrivere la salute della popolazione secondo una prospettiva più ampia, che tiene conto anche degli interventi e delle politiche non strettamente socio-sanitarie, come quelle occupazionali, previdenziali, urbanistiche e abitative.

Per migliorare le condizioni strutturali che influenzano la qualità della vita collegata allo stato di salute, a livello europeo è stata messa a punto la strategia “Health in all policies (Hiap)” ovvero “Salute in tutte le politiche” che, attraverso un approccio intersettoriale, intende agire sui determinanti sociali della salute ovvero sulle condizioni in cui le persone nascono, crescono, vivono, lavorano e invecchiano. Ciò comporta il coinvolgimento e la responsabilizzazione di un'ampia gamma di settori, innanzitutto quelli dell'occupazione, dell'istruzione e della politica sociale ai diversi livelli di governo (europeo, nazionale, regionale e locale) con l'obiettivo di contrastare in maniera efficace le disuguaglianze di salute.

Essere indipendenti ha indubbe ricadute sul benessere della persona. Dal punto di vista fisico PASSI d'Argento ha preso in considerazione l'indipendenza nello svolgimento delle attività della vita quotidiana valutate mediante strumenti validati e diffusi a livello nazionale ed internazionale.

- *Activities of Daily Living (ADL)*, più di base, come vestirsi e mangiare autonomamente, per valutare la capacità di svolgere attività di base;
- *Instrumental Activities of Daily Living (IADL)*, più complesse, come andare a fare la spesa, per valutare la capacità di svolgere attività strumentali.

1.1 Caratteristiche socio-demografiche

Protezione, salubrità e dignità delle persone sono anche frutto delle politiche sanitarie, sociali, finanziarie oltre che di protezione fisica e ambientale.

La descrizione delle caratteristiche demografiche, sociali ed economiche della popolazione fornisce quindi non solo l'immagine della situazione esistente ma consente anche di cogliere l'entità di differenze che hanno ricadute sulla salute soggettiva ed oggettiva delle persone.



1.1.1 Come è distribuito il campione per genere e classe d'età? Quanto è rappresentativo della popolazione con 65 anni e più?

Il 52% del campione è costituito da persone con età compresa tra 65 e 74 anni (51% della popolazione di 65 anni e più del Veneto – ISTAT 2012), il 33% da persone fra i 75 e gli 84 anni e il 15% ha 85 anni o più.

Le donne rappresentano il 59,5% del campione, con proporzioni crescenti all'aumentare dell'età: 55% nella classe di età 65-74 anni, 63% tra 75 e 84 anni, 68% con 85 anni e più. Il dato riflette il fenomeno di progressiva “femminilizzazione” della popolazione (in Veneto le donne sono il 58% della popolazione con più di 65 anni e, in particolare, il 53% tra 65 e 74 anni, il 59% di quella tra 75 e 84 anni e il 72% di quella con 85anni e più).

L'età media del campione è 75 anni: 74 quella degli uomini, 76 quella delle donne.

La composizione del campione intervistato per classi di età, analizzata separatamente per genere, conferma la diversa distribuzione per età dei 2 sessi (tra le persone con 65 anni e più, quelle con più di 85 anni sono 11 su 100 tra gli uomini e 17 su 100 tra le donne) e la sua buona rappresentatività della popolazione generale per questi aspetti.



1.1.2 Qual è lo stato civile?

Complessivamente le persone coniugate sono il 61% e quelle in stato di vedovanza il 30%; coloro che non si sono mai sposati (7%) o sono separati/divorziati (2%) rappresentano insieme meno di 10 persone su 100.

Lo stato civile presenta evidenti differenze in relazione all'età: dopo i 74 anni sono più numerose le persone vedove (43% vs 18% tra i 65-74 anni) e meno frequenti quelle coniugate (47,5% vs 74%);

In relazione a ciò e alla femminilizzazione della popolazione più anziana, tra le donne non vi è significativa differenza di prevalenza tra le coniugate (45,5%) e le vedove (46%), mentre tra gli uomini i coniugati sono 10 volte più frequenti dei vedovi (83% vs 8%).

1.1.3 Quale è il livello di istruzione?

Tra le persone con 65 anni e più:

- 6 su 10 hanno un basso livello di scolarità: licenza elementare (61%) o nessun titolo di studio (3%);
- il 18,5% ha un diploma di scuola media inferiore;
- il 14% ha quello di scuola media superiore;
- il 3,5% è laureato.


La scolarità bassa è maggiormente diffusa:

- tra le persone più anziane: 53% nella classe di età 65-74 e 75% dopo i 75anni;
- tra le donne (73% vs 51% tra gli uomini).


La differenza di genere per un basso livello di scolarità non si conferma in maniera indipendente dall'età:

- 65-74 anni: 40,5% uomini e 64% donne;
- 75 anni e più: 65% uomini 81% donne.

Stato civile (%)
Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =1.049)



Scolarità bassa *(%)
Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =1.038)



* nessun titolo di studio o licenza elementare

1.1.4 Con chi vivono?


Tra le persone con 65 anni e più, 1 su 5 (22%) vive da sola.

Indipendentemente dalla convivenza con altre figure:

- oltre la metà (60%) vive con il coniuge;
- il 19% vive con figli.

Risultano situazioni poco frequenti vivere con:


- una badante (3%);
- fratelli o sorelle (2%);
- generi/nuore (1%);
- nipoti (2%).



1.1.5 Come arrivano a fine mese?


In Veneto le persone con 65 anni e più riferiscono di arrivare a fine mese, nel seguente modo:

- 56% senza difficoltà (13% molto facilmente, 43% abbastanza facilmente);
- 44% con difficoltà (34% con qualche difficoltà, 10% con molte difficoltà).



1.1.6 Come si distribuiscono le difficoltà economiche?


L'assenza di difficoltà economiche per arrivare a fine mese non cambia in maniera significativa in relazione a genere ed età, mentre viene riferita con maggiore frequenza da persone con scolarità alta (66%) rispetto a quelle con scolarità bassa (nessun titolo di studio o licenza elementare) (48%).



1.1.7 Quanti percepiscono una pensione?

Il 92% della popolazione con 65 anni e più riceve una pensione (97% negli uomini, 88% nelle donne)

La disponibilità di pensione non cambia con l'età tra gli uomini, mentre risulta maggiore tra le donne con 75 anni e più (91%) rispetto a quelle con 65-74anni (85%).



1.2 I sottogruppi della popolazione con 65 anni e più

Un invecchiamento attivo e in buona salute è influenzato da diversi fattori personali, sociali, economici e ambientali (quali ad esempio genere, stili di vita, fattori biologici, fattori legati al sistema dei servizi sanitari e sociali). Questi fattori agiscono durante tutto il corso della vita e determinano, con il progredire dell'età, l'accentuarsi delle differenze individuali legate allo stato di salute e al benessere complessivo della persona. La popolazione con 65 anni e più non è pertanto un gruppo omogeneo, ma appare costituita da persone con caratteristiche, potenzialità e bisogni socio-sanitari estremamente diversi.

Alla luce di questa diversità, nell'indagine PASSI d'Argento si è sperimentata, per la prima volta, una nuova descrizione della popolazione con 65 anni e più con una suddivisione in quattro sottogruppi di persone:


- in buona salute a basso rischio di malattia cronico-degenerativa;
- in buona salute ma a rischio di malattia cronico-degenerativa e fragilità;
- a rischio di disabilità;
- con disabilità.

1.2.1 Perché la popolazione con 65 anni e più è stata suddivisa in sottogruppi?

L'individuazione di sottogruppi all'interno della popolazione con 65 anni e più è funzionale all'identificazione delle priorità di intervento ed è essenziale per la programmazione e valutazione delle strategie messe in atto dai servizi del settore sociale e sanitario e dall'intera società civile.

In un'ottica di orientamento all'azione, ciascun sottogruppo identifica target di interventi specifici che vanno dalle azioni di prevenzione terziaria per le persone con disabilità, alle azioni di prevenzione primaria per le persone a rischio di malattia e fragilità (vedi figura), alle azioni di valorizzazione e protezione sociali trasversali a tutti i sottogruppi.

I sottogruppi di popolazione PASSI d'Argento



1.2.2 Come sono stati individuati i sottogruppi di popolazione?

Per l'identificazione dei sottogruppi si è partiti da una definizione di Salute come dimensione bio-psico-sociale, nella quale la dimensione soggettiva è fondamentale. La Salute è intesa quindi come benessere fisico, mentale e sociale di un individuo o gruppo che deve essere capace, da un lato, di identificare e realizzare aspirazioni e soddisfare bisogni e, dall'altro, di utilizzare le proprie risorse personali e sociali, così come le capacità fisiche per modificare l'ambiente circostante e farvi fronte. L'ambiente familiare e sociale ha un peso determinante nel favorire e mantenere il livello di salute delle persone con 65 anni e più. A fronte di questa definizione di Salute, la popolazione è stata suddivisa in sottogruppi valutando l'autonomia rispetto alle attività della vita quotidiana misurate con indici validati e diffusi a livello internazionale. In particolare è stata valutata l'autonomia che le persone hanno nelle:

- attività di base della vita quotidiana o *Activities of Daily Living* (ADL) come ad esempio mangiare, lavarsi, spostarsi da una stanza all'altra;
- attività strumentali della vita quotidiana o *Instrumental Activities of Daily Living* (IADL) come, ad esempio usare il telefono, cucinare, prendere le medicine;

Si sono così identificati 4 sottogruppi

1. In buona salute a basso rischio di malattia cronico-degenerativa

- sono indipendenti in tutte le ADL
- hanno bisogno di aiuto al massimo per una IADL
- presentano al massimo due delle seguenti cinque caratteristiche o condizioni:
 - a. problemi di masticazione o vista o udito;
 - b. insufficiente attività fisica (PASE score età e genere specifico inferiore al 10° percentile) o abitudine al fumo o consumo di alcol definibile a rischio o scarso consumo di frutta e verdura;
 - c. molte difficoltà economiche riferite o sintomi di depressione o rischio di isolamento sociale;
 - d. almeno una patologia cronica;
 - e. ipertensione.

2. In buona salute ma a rischio di malattia cronico-degenerativa e fragilità

- sono indipendenti in tutte le ADL
- hanno bisogno di aiuto al massimo in una IADL
- presentano tre o più delle seguenti cinque caratteristiche o condizioni:
 - a. problemi di masticazione o vista o udito;
 - b. insufficiente attività fisica (PASE score età e genere specifico inferiore al 10° percentile) o abitudine al fumo o consumo di alcol definibile a rischio o scarso consumo di frutta e verdura;
 - c. molte difficoltà economiche riferite o sintomi di depressione o rischio di isolamento sociale;
 - d. almeno una patologia cronica;
 - e. ipertensione.

3. A rischio di disabilità

- sono indipendenti in tutte le attività ADL
- hanno bisogno di aiuto in almeno due IADL

4. Con disabilità

- hanno bisogno di aiuto in una o più ADL.

1.2.3 Cosa sono le ADL/IADL?

Le **ADL** comprendono le attività di base che la persona deve necessariamente svolgere per vivere senza bisogno di assistenza periodica o continuativa.

Lo strumento più utilizzato per la valutazione del livello di autonomia in queste attività è l'indice di Katz (1963) e comprende le seguenti attività/funzioni: muoversi da una stanza all'altra, farsi il bagno o la doccia, vestirsi, mangiare, essere continenti (per feci e urine), usare i servizi per fare i propri bisogni.

Le **IADL**, rispetto alle ADL, sono attività più complesse, dal punto di vista fisico e/o cognitivo e possono essere svolte anche al di fuori dell'ambiente domestico.

Lo svolgimento di queste attività, seppure in maniera saltuaria, è necessario affinché un soggetto sia autonomo. Ad esempio, un soggetto che non è in grado di fare la spesa o pagare conti o bollette, può vivere da solo esclusivamente per brevissimi periodi. Lo strumento di riferimento per la misura della indipendenza nelle IADL è la scala da cui il termine IADL prende il nome, pubblicata da Lawton e Brody nel 1969, e comprende le seguenti attività: usare il telefono, prendere le medicine, fare la spesa o delle compere, cucinare o riscaldare i pasti, prendersi cura della casa, fare il bucato, spostarsi fuori casa con mezzi pubblici o con la propria auto, pagare conti o bollette.

Per ogni ADL o IADL è prevista una graduazione del grado di autonomia.

Per ciascuna attività, è stato chiesto alla persona intervistata se era in grado di svolgerla “da solo/a, anche se con problemi”, “solamente se aiutato/a”, oppure se non riusciva a svolgerla. Nell'indagine PASSI d'Argento, in una ottica bio-psico-sociale, per la quale le abilità sono il risultato dell'interazione dell'individuo con l'ambiente che lo circonda, la risposta “solamente se aiutato” non è stata considerata come una perdita di indipendenza per lo svolgimento di 3 delle 6 ADL (vestirsi, farsi il bagno o la doccia, essere continenti) e di 4 IADL su 8 (cucinare, fare il bucato, pagare conti o bollette, usare il telefono,).

Sono state prese in considerazione le persone con situazioni di non autonomia nelle ADL (definite persone con disabilità) indipendentemente dalla presenza e dal numero di limitazioni nelle IADL e anche le persone con situazioni di non autonomia “solo” nelle IADL. E' stata anche valutata la diffusione della mancanza di autonomia nelle singole attività della vita quotidiana.

La limitazione in una attività della vita quotidiana comporta di per sé una condizione di bisogno; tuttavia, il livello di assistenza necessario cresce fortemente all'aumentare del tipo (IADL o ADL) e del numero di attività per le quali il soggetto non è autonomo, per cui sono state valute anche il numero di ADL e/o IADL presentate dalle persone con disabilità e da quelle con limitazioni solo nelle IADL.


1.2.4 In Veneto come è distribuita la popolazione con 65 anni e più rispetto ai sottogruppi?

Il 44% delle persone risulta in buona salute e a basso rischio di malattia cronico-degenerativa.

Il 24% è in buona salute ma a più alto rischio di malattia cronico-degenerativa e fragilità.

Il 16% è a rischio di disabilità.

Il 15% risulta avere limitazioni in una o più attività di base della vita quotidiana ADL. In questo ultimo gruppo troviamo le persone che hanno particolare bisogno di assistenza.




1.2.5 Qual è la distribuzione dei sottogruppi in ciascuna classe di età?

Tra le persone di età compresa tra i 65 ed i 74 anni la maggioranza è in buona salute (58%) e quelle con disabilità rappresentano solo il 4%.

Le persone in buona salute ma a rischio sono il 28% tra i 65 ed i 74 anni, il 22% tra i 75-84 anni e il 13% dagli 85 in avanti.

Dopo gli 84 anni persone a rischio di disabilità (28%) e con disabilità (45%) rappresentano la maggioranza delle persone.

Le persone in buona salute e a basso rischio costituiscono il 37% di quelle tra 75 e 84 anni e il 14% di quelle con 85 anni e più.




1.2.6 Qual è la distribuzione dei sottogruppi nei due generi?

La distribuzione per sottogruppi non è del tutto omogenea per genere.

Tra le donne sono più numerose le persone che appartengono ai gruppi con disabilità (18% vs 11% negli uomini) e a rischio di disabilità (19% vs 13% negli uomini).

Tale dato è legato alla maggiore proporzione di donne nelle classi di età più avanzate.



1.3 Autonomia nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, di base e strumentali


1.3.1 Quanti non sono autonomi nelle attività della vita quotidiana (IADL O ADL)?

In Veneto tra le persone con 65 anni e più:

- 6 su 10 (57%) non hanno problemi a svolgere attività della vita quotidiana;
- il 28% presenta problemi di autonomia nelle IADL, ma non nelle ADL;
- il 15% non è autonomo in almeno una ADL, indipendentemente dalla presenza o meno di limitazioni nelle IADL. (Queste persone costituiscono il sottogruppo 4: persone con disabilità.)

Limitazioni nelle attività della vita quotidiana (%)

Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n = 1048)



1.3.2 Attività di base della vita quotidiana ADL

1.3.2.1 Come si distribuiscono le dipendenze nelle ADL?


In Veneto le persone con 65 anni e più non autonome in 1 o più ADL, ovvero quelle con disabilità, sono il 15%.

Tra queste persone:

- il 36% non è autonomo in 1 ADL;
- il 16% in 2 ADL;
- il 16% in 3 ADL;
- il 32% non è autonomo in 4 o più ADL.

Numero di ADL non autonome nelle persone con disabilità (%)

Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n = 148)



Nella popolazione con 65 anni e più questa distribuzione corrisponde ad una prevalenza di circa il 6% per le persone con mancanza di autonomia in 1 ADL e di circa il 5% per quelle non autonome in 4 o più ADL.

1.3.2.2 Quale è la distribuzione per età e sesso delle persone con disabilità?


Le limitazioni nelle ADL aumentano con l'età (4% tra i 65-74 anni e 27% dai 75 anni in su).

Tra i 65 ed i 74 anni si presentano nel 3% degli uomini e nel 4% delle donne.

Dopo i 74 anni vengono invece registrate nel 31% delle donne e nel 21% degli uomini.

La differenza complessiva osservabile tra uomini e donne (11% vs 18%) in Veneto dipende principalmente dalla maggiore presenza femminile dopo i 75 anni.

Persone con disabilità per età e sesso (%)
Indagine PASSI d'Argento
Veneto




1.3.2.3 Quali sono le ADL più frequentemente compromesse?

Tra le persone con disabilità:

- 6 su 10 (64%) non sono autonome nell'andare in bagno;
- il 37% nel fare il bagno o la doccia;
- il 76% ha problemi a spostarsi da una stanza all'altra;
- il 41% ha problemi di incontinenza;
- il 39% non si alimenta autonomamente;
- il 28% è totalmente dipendente nel vestirsi o spogliarsi.

Limitazioni per singole ADL tra le persone con disabilità (%)
Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =148)



1.3.3 Attività strumentali della vita quotidiana IADL


1.3.3.1 Come si distribuiscono le dipendenze nelle IADL?

In Veneto le persone con 65 anni o più non autonome in 1 o più IADL sono il 42%. In particolare:

- l'11% risulta non autonomo in 1 sola IADL;
- una proporzione analoga ha limitazioni in 2 o 3 IADL (13%);
- l'11% non è autonomo in un numero di IADL variabile tra 4 e 6;
- il 7% ha perso l'autonomia in 7-8 IADL.

Tra le persone che hanno problemi anche nelle ADL, ovvero tra quelle con disabilità, questa distribuzione di frequenza è molto diversa: coloro che sono autonomi in tutte le IADL sono un'eccezione (circa 4%), quelli che hanno problemi in 7-8 IADL sono 2 su 5 (42%).

Numero IADL non autonome (%)
Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =1051)



1.3.3.2 Quale è la distribuzione per età e sesso delle persone con almeno 1 IADL non autonoma?


Le persone non autonome in 1 o più IADL aumentano con l'età: rappresentano il 22% tra i 65-74 anni e oltre la metà (64%) dai 75 anni in su.

Tra i 65 ed i 74 anni costituiscono il 19% degli uomini e il 24% delle donne.

Dopo i 74 anni invece risultano il 70% delle donne e nel 54% degli uomini.

La differenza complessiva osservabile tra uomini e donne (33% vs 49%) in Veneto dipende quindi soprattutto dalla maggiore componente femminile dopo i 75 anni.

Persone con almeno 1 IADL non autonoma per età e sesso (%)
Indagine PASSI d'Argento
Veneto




1.3.3.3 Quali sono le IADL più frequentemente compromesse?

Tra coloro che presentano almeno una IADL non autonoma, le attività strumentali che più frequentemente presentano limitazioni risultano:

- spostarsi fuori casa (81%);
- prendersi cura della casa (66%);
- fare la spesa (66%).

L'attività strumentale per la quale viene maggiormente mantenuta l'autonomia è l'uso del telefono: tra le persone con problemi di autonomia nelle IADL solo 1 persona su 12 non lo utilizza in maniera autonoma.

Limitazioni per singole IADL (%)
tra le persone con almeno 1 IADL non autonoma
Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =421)




Tra le persone a rischio di disabilità e quelle con disabilità non cambiano le IADL più frequentemente compromesse ma, ovviamente, aumenta la loro diffusione.

Tra le persone con disabilità 9 su 10 hanno limitazioni nel prendersi cura della casa, nello spostarsi fuori casa e nel fare la spesa.

Tra le persone a rischio di disabilità 8 su 10 hanno limitazioni a fare la spesa, 7 su 10 hanno limitazioni nel prendersi cura della casa.

L'attività che risulta meno limitata si conferma l'uso del telefono: su 100 persone, coloro che non lo utilizzano in maniera autonoma sono 4 tra quelle a rischio di disabilità e 28 tra quelle con disabilità.

Limitazioni per singole IADL (%)
tra le persone a rischio di disabilità e con disabilità
Indagine PASSI d'Argento
Veneto



1.4 Percezione dello stato di salute

La percezione del proprio stato di salute è una dimensione importante della qualità della vita.

Nelle persone con 65 anni e più, indicatori negativi sulla percezione del proprio stato di salute sono correlati ad un rischio aumentato di declino complessivo delle funzioni fisiche, indipendentemente dalla severità delle patologie presenti.

Nelle sorveglianze PASSI e PASSI d'Argento la salute percepita viene valutata col metodo dei “giorni in salute” (Healthy Days), che misura la percezione del proprio stato di salute e benessere attraverso quattro domande: lo stato di salute auto-riferito, il numero di giorni nell'ultimo mese in cui l'intervistato non si è sentito bene per motivi fisici, il numero di giorni in cui non si è sentito bene per motivi psicologici ed il numero di giorni in cui ha avuto limitazioni nelle attività abituali. Dagli anni '80 questo pacchetto di misure standard della “qualità della vita relativa alla salute” (Health Related Quality Of Life –HRQOL) è stato gradualmente inglobato in diversi sistemi di sorveglianza e di survey di popolazione grazie alla sua associazione con gli effetti della presenza negli individui di patologie croniche o degli stessi determinanti e fattori di rischio di malattia.

In tutta Europa, gli uomini hanno un migliore stato di salute percepito rispetto alle donne, i giovani migliore delle persone in età più avanzata, gli occupati uno stato di salute migliore delle persone senza lavoro. Così pure un elevato livello di istruzione e di reddito influenzano positivamente in tutta Europa la percezione dello stato di salute.

PASSI d'Argento indaga anche la variazione della salute percepita rispetto all'anno precedente, informazione che assume particolare interesse nelle persone di età avanzata.


1.4.1 Come percepiscono il proprio stato di salute le persone con 65 anni e più?

Il 40% delle persone con 65 anni e più giudica il proprio stato di salute positivamente (7% molto bene, 33% bene), il 47% discretamente e il rimanente 13% in modo negativo (12% male, 1% molto male).

La percezione peggiora con l'età: il 18% delle persone con 75 anni e più considera in modo negativo il proprio stato di salute, ma rimangono comunque significativamente più numerosi coloro che ne hanno un giudizio positivo (34%).

In Veneto le differenze di genere si osservano in entrambe le classi di età: le donne oltre i 74 anni si sentono significativamente meno in salute degli uomini (molto bene/bene 28% vs 46% degli uomini) e le donne tra i 64 e 75 anni si sentono più male in maniera significativa rispetto agli uomini (male/molto male 12% vs 4% degli uomini).


**Percezione della propria salute
per classi d'età e sesso (%)**
Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =868)



Riferiscono di avere uno stato di salute buono o molto buono il 51% delle persone in buona salute e a basso rischio di malattia, il 35% delle persone in buona salute ma a rischio di malattia, il 20% di quelle a rischio di disabilità e il 21% dei soggetti con disabilità.

Una percezione negativa della propria salute interessa solo il 4% dei soggetti in buone condizioni a basso rischio e quasi 2 su 5 (41%) di quelli con disabilità.

Percezione della propria salute per sottogruppi (%)
Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =859)




1.4.2 Come si sentono rispetto all'anno precedente?

Il 19% delle persone con 65 anni e più si sente meglio rispetto ad un anno prima (4,5% molto meglio, 14,5% meglio), il 51% si sente allo stesso modo, il rimanente 30% si sente peggio (23,5% leggermente, 6,5% molto peggio).

Come ci si sente rispetto all'anno precedente cambia in relazione all'età, ma anche al genere:

- si sentono peggio il 25% delle persone tra 65 e 74 anni e il 37% di quelle con 75 anni e più, ma con prevalenze maggiori nelle donne rispetto agli uomini;
- dopo i 74 anni 16 persone su 100 dicono di sentirsi meglio rispetto all'anno precedente, con differenze di età e genere meno evidenti rispetto a chi dichiara un peggioramento .

Come si sentono rispetto all'anno precedente per classi d'età e sesso (%)
Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =864)




Ritiene peggiorata la propria salute rispetto all'anno precedente:

- circa un quarto (23%) delle persone in buona salute e a basso rischio di malattia;
- 1 persona su 2 (50%) delle persone con disabilità.

In ciascun sottogruppo circa 1 persona su 5 ritiene migliorata la propria condizione di salute rispetto all'anno precedente, ad eccezione delle persone con disabilità che risulta 1 su 10 (11%).

Come si sentono rispetto all'anno precedente per sottogruppi (%)
Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =856)




1.4.3 In media quanti sono i giorni di cattiva salute percepita in un mese e in che misura limitano le attività di tutti i giorni?

Il numero medio di giorni in cattiva salute percepita sugli ultimi 30 aumenta con il progredire dell'età:

- il numero medio di giorni in cattiva salute fisica è 5 tra le persone nella fascia di età 65-74 anni, 7 tra coloro con 75 anni e più;
- mediamente i giorni in cattiva salute psicologica sono 4 tra le persone nella fascia di età 65-74 anni, 6 tra coloro con 75 anni e più;
- per quanto riguarda i giorni con limitazioni di attività per cattiva salute fisica o psicologica, il numero medio è 2 tra le persone con 65-74 anni e 5 dopo i 74 anni.

Media dei giorni in cattiva salute percepita (negli ultimi 30 giorni) per classi di età
Indagine PASSI d'Argento
Veneto



1.4.4 Quante persone si sentono in cattiva salute o hanno limitazioni nelle attività abituali per più di 14 giorni negli ultimi 30 giorni?

Tra le persone con 65 anni e più circa 1 su 10 non si è sentita bene per almeno 14 giorni sugli ultimi 30 per motivi fisici (17%) o psicologici (14%); per questi motivi il 11% non è riuscito a fare le cose di tutti i giorni.

La proporzione di persone con cattiva salute o limitazione delle attività abituali per oltre 14 giorni è maggiore nelle persone con basso livello di istruzione e, in maniera significativa, nelle donne e tra le persone con difficoltà economiche.

Persone con 14 o più giorni di cattiva salute o con limitazione delle attività abituali (negli ultimi 30 giorni) (%) Indagine PASSI d'Argento <i>Veneto</i>			
	Cattiva salute fisica	Cattiva salute psicologica	Limitazione di attività abituale
Popolazione con 65 anni e più	17,5	14	11
Genere			
uomini	11	6	6
donne	22	19,5	15
Classi di età			
65-74	14	11,5	7,5
75 e	22	17	16,5
Istruzione			
bassa	18	16	13
alta	15	10	8
Difficoltà economiche			
molte	33	29	22
alcune	17	14	11
nessuna	12,5	8	7

1.4.5 Quante persone hanno più di 20 “unhealthy days” per motivi fisici o psicologici?

Sommando i giorni di cattiva salute fisica e quelli di cattiva salute psicologica, il 18% della popolazione con 65 anni e più risulta avere più di 20 giorni dell'ultimo mese passati in cattiva salute.

Questa proporzione è significativamente maggiore tra le donne, tra le persone oltre i 74 anni e tra quelle con difficoltà economiche .

20 o più giorni in cattiva salute per motivi fisici o psicologici (%)
Indagine PASSI d'Argento
Veneto

	%	IC 95 %	
Popolazione con 65 anni e più	18	15	21
Genere			
uomini	9,5	6	13
donne	24	20	28
Classi di età			
65-74	14	11	17
75 e oltre	23	19	27
Istruzione			
bassa	19	16	22
alta	15,5	11,5	19,5
Difficoltà economiche			
molte	36	28	44
alcune	20	16	24
nessuna	11,5	9	14

1.5 Soddisfazione per la propria vita

Così come la qualità della vita, anche la felicità, intesa come soddisfazione complessiva della propria vita, può essere misurata unicamente su dati riferiti dai singoli individui.

Negli ultimi anni, è stata attribuita grande importanza alle misure soggettive di felicità e soddisfazione per la propria vita. Le percezioni e le valutazioni soggettive influenzano, infatti, il modo in cui le persone affrontano la vita e per questo motivo possiedono un elevato valore informativo. La felicità nell'accezione originale è intesa e misurata, da alcuni decenni, come "soddisfazione della vita". PASSI d'Argento l'ha rilevata come soddisfazione complessiva della vita condotta da un individuo ricorrendo ad una sola domanda con 4 possibili risposte su un intervallo temporale non specificato.

1.5.1 Le persone con 65 anni e più sono soddisfatte della vita che conducono?

Il 79% delle persone con 65 anni e più sono soddisfatte della vita che conducono (21% molto, 58% abbastanza soddisfatte).



Il rimanente 21% non è soddisfatto (17% poco, 4% per nulla soddisfatto).

L'83% delle persone di età compresa tra i 65 e i 74 anni si dichiara molto o abbastanza soddisfatte della vita che conduce. Tra le persone con 75 anni e più questo valore diminuisce ma rimangono quasi 7 su 10 (73%) le persone soddisfatte della propria vita.

La percentuale di persone poco o per nulla soddisfatte della vita che conducono è maggiore tra le donne (25% contro 16%) e aumenta con il crescere dell'età in entrambi i sessi.

Si ritiene soddisfatto della propria vita:


- 90% delle persone in buona salute e a basso rischio di malattia;
- 73% delle persone in buona salute ma a rischio;
- 59% delle persone con segni di disabilità;
- 62% delle persone con disabilità.



1.6 Indicatori che descrivono il benessere e l'indipendenza: un confronto tra il Veneto e i dati nazionali

In salute pubblica e' sempre più frequente il ricorso ai profili di salute per rappresentare a colpo d'occhio lo stato di salute di un'intera popolazione o di una sua componente. Per quanto non esista un profilo di salute universalmente condiviso per le persone con 65 e più anni, abbiamo usato i risultati di Passi d'Argento per riassumere con pochi indicatori la condizione per ognuno dei capitoli (4) in cui abbiamo ripartito l'informazione raccolta. Nel contesto della sorveglianza questo approccio, oltre a dare un'idea su alcuni aspetti qualificanti di salute di un gruppo di popolazione, permette anche, in maniera semplice e scientificamente solida, di confrontare il valore degli indicatori prescelti con quello di altre unità territoriali (per esempio, le asl fra di loro all'interno di una regione o le regioni fra di loro).

Per realizzare questo approccio abbiamo scelto di utilizzare le spine-chart, un grafico particolare che permette di confrontare il valore di un certo indicatore, misurato localmente, con un valore di riferimento "nazionale" e di testare, in modo, semplice se la differenza rilevata (in meglio o in peggio) sia statisticamente significativa.



Con la "spine chart" come questa si rappresentano in un'unica immagine diversi indicatori. Per ogni indicatore viene riportato il valore della media del pool nazionale (con la linea centrale verticale), i valori del 25° e del 75° percentile (ai limiti della banda azzurra), il valore minimo e massimo (ai limiti della banda beige) riscontrati fra le 115 aziende sanitarie che nel 2012-2013 hanno partecipato alla rilevazione dei dati. Il valore dell'indicatore per l'ASL o la regione cui si riferisce il rapporto viene indicato con un pallino di 3 diversi colori: VERDE, ROSSO o GIALLO a seconda che il valore sia significativamente migliore, peggiore o NON significativamente differente rispetto al valore medio del pool nazionale. La significatività della differenza si evince dal confronto fra gli intervalli di confidenza (indicati) del valore medio del pool nazionale e quelli del valore locale (regionale o aziendale). Se non vi è sovrapposizione di valori, la differenza (in meglio o in peggio che sia) è statisticamente significativa, mentre in caso di sovrapposizione non lo è. Attenzione: non basta, per una certa regione o azienda, avere un pallino verde per escludere che l'aspetto indicato NON sia un problema di salute pubblica.

La popolazione veneta ultra64enne, dal confronto per alcuni indicatori con il pool nazionale, risulta avere una maggior percezione positiva del proprio stato di salute ed una maggiore soddisfazione della propria vita. Anche dal punto di vista economico, la popolazione veneta ultra64enne sta meglio.

2. Fattori di rischio, condizioni di salute e cure

Un invecchiamento attivo e in buona salute è frutto di diversi fattori che agiscono durante tutto il corso della vita e che, in base alle indicazioni dell'OMS, possono essere distinti in:

- determinanti trasversali: genere e cultura;
- determinanti legati al sistema dei servizi sanitari e sociali (ad esempio le attività di promozione della salute e prevenzione delle malattie);
- determinanti comportamentali (ad esempio attività fisica e fumo);
- determinanti legati a fattori individuali (ad esempio fattori biologici e psicologici);
- determinanti economici (ad esempio reddito e sistemi di previdenza sociale).

Per questo, già prima dei 65 anni è essenziale promuovere stili di vita salutari e ridurre i principali fattori di rischio comportamentali correlati alle malattie croniche (sedentarietà, alimentazione non corretta, fumo e abuso di alcol).

Col progredire dell'età è inoltre importante prevenire e ridurre disabilità e mortalità prematura, ad esempio, col contrasto al fenomeno delle cadute e ai problemi di vista e udito.

In una prospettiva rivolta a tutte le fasi della vita, “Rimanere in buona salute” è un obiettivo essenziale che coinvolge i servizi sociali e sanitari e tutti i settori della società civile, oggi più che mai, chiamati a costruire un ambiente sicuro e “salutare” in una società realmente “*age-friendly*”.

2.1 Stili di vita: attività fisica, abitudini alimentari, alcol e fumo

Promuovere stili di vita salutari è una sfida importante per il sistema socio-sanitario, soprattutto se si considera l'attuale quadro epidemiologico caratterizzato dall'alta prevalenza delle malattie cronicodegenerative. Alla base delle principali malattie croniche ci sono fattori di rischio comuni e modificabili, come alimentazione poco sana, consumo di tabacco, abuso di alcol, mancanza di attività fisica che, insieme a fattori non modificabili (ereditarietà, sesso, età), danno origine a fattori di rischio intermedi (l'ipertensione, la glicemia elevata, l'eccesso di colesterolo e l'obesità). Per questo motivo, la promozione di stili di vita salutari, a tutte le età, è importante per prevenire e migliorare il trattamento e la gestione delle principali patologie croniche.

2.1.1 Attività fisica

Negli ultimi 10 anni, è notevolmente aumentata la conoscenza sugli effetti dell'attività fisica e dell'esercizio tra gli uomini e le donne con 65 anni e più.

Una regolare attività fisica protegge le persone anziane da numerose malattie, previene le cadute e migliora la qualità della vita, aumentando anche il benessere psicologico. Nelle persone con 65 anni e più l'attività motoria è correlata direttamente alle condizioni complessive di salute: può essere notevolmente limitata o assente nelle persone molto in là con l'età e con difficoltà nei movimenti. Per questo, la quantità di attività fisica “raccomandabile” varia a seconda delle condizioni generali di salute e dell'età. Nell'indagine Passi d'Argento si è adottato un sistema di valutazione dell'attività fisica (Physical Activity Score in Elderly: PASE) che tiene conto, in maniera semplice, delle diverse esigenze della popolazione anziana; e considera le attività sportive, quelle ricreative (ginnastica e ballo), sia i lavori di casa pesanti o il giardinaggio. Per ciascuna attività viene calcolato uno punteggio che tiene conto del tempo (h/d) dedicato all'attività o della sola partecipazione (yes/no) e del tipo di attività, più o meno intensa. Il punteggio PASE

totale è ottenuto sommando i punteggi delle singole attività pesate.


Sono stati definiti non eleggibili per l'analisi sull'attività fisica le persone con 65 e più anni campionate che presentavano difficoltà nel deambulare in maniera autonoma e quelli che avevano avuto bisogno dell'aiuto del proxy (un familiare o un'altra persona di fiducia regolarmente a contatto con il soggetto) per effettuare l'intervista.

I dati raccolti nell'indagine 2012 del PDA ci hanno permesso di utilizzare le curve di percentili come metodo per la valutazione e descrizione del livello di attività fisica nella popolazione anziana.


Il valore mediano è pari a 93.3 con range (1.4-397). Il punteggio PASE decresce con l'aumentare dell'età e i valori mediani della popolazione calcolati per uomini e donne sono statisticamente differenti (99 vs 90). La popolazione con 65 anni e più è molto eterogenea ed è importante tener conto delle note differenze tra uomini e donne e delle caratteristiche che si assumono con l'avanzare dell'età.

2.1.1.1 Quante sono le persone con 65 o più anni attive fisicamente?

Non esistono degli standard universalmente accettati per l'attività fisica delle persone con 65 anni e più misurabili con il punteggio PASE, vista anche la grande variabilità delle loro condizioni di salute. Standardizzando i valori per genere ed età per le regioni/aziende che hanno partecipato al Passi d'Argento, si ottiene un diagramma a barre che illustra il valore della media e il relativo intervallo di confidenza.



Al fine di utilizzare per l'azione i valori del PASE, si sono costruite su tutta la base di dati del pool nazionale delle curve percentili, in numero di 6, per genere (2) e gruppi di età (3). A titolo di esempio, viene mostrata la curva dei percentili principali per l'intera popolazione ultra64enne del pool di PASSI d'Argento.



In mancanza di cutoff (valori soglia) validi universalmente, per la comprensione del livello di attività fisica delle persone si forniscono delle informazioni che, per essere usate dal punto di vista operativo, devono essere integrate con altre. Per esempio, in Veneto il 6% delle donne fra 65 e 74 anni ha un livello di attività fisica inferiore al 10° percentile (rispetto ai valori del pool nazionale). Il livello di AF è certamente basso. E' necessario tuttavia avere altre fonti di informazione che permettano di stimare se si tratta di inattività fisica modificabile e in quale misura. La tabella seguente mostra la percentuale di persone della nostra regione, eleggibili alle analisi sull'attività fisica, che hanno un punteggio PASE al di sotto di alcuni valori percentili selezionati (50°, 25°, 10°) rilevati sul pool nazionale.

Gruppi di età	Campione di persone in Veneto eleggibili* alle analisi sull'attività fisica n(%)	% di persone al di sotto della mediana del pool** (50° percentile)	% di persone al di sotto del 25° percentile del pool**	% di persone al di sotto del 10° percentile del pool**
Uomini 65-74	212 (28%)	36%	18%	7%
Uomini 75-84	81 (11%)	37%	14%	9%
Uomini 85 e più	14 (2%)	37%	16%	0%
Donne 65-74	284 (35%)	46%	16%	6%
Donne 75-84	153 (20%)	46%	14%	1%
Donne 85 e più	34 (4%)	54%	3%	3%
Totale persone con 65 anni e più	778 (100%)	42%	15%	5%

* gli eleggibili sono le persone autonome nella deambulazione e che non hanno usufruito dell'aiuto del proxy per sostenere l'intervista

** totale dati raccolti nell'indagine PDA 2012/2013

In Veneto 2 su 5 degli ultra 64enni hanno un livello di attività fisica inferiore al 50° percentile rispetto i valori del pool nazionale e 1 su 20 al di sotto del 10° percentile.

Grazie all'analisi dei percentili è possibile stimare il numero di anziani sui quali intervenire con programmi di prevenzione specifici per stimolare la pratica dell'attività fisica. È possibile quindi avere la dimensione reale del problema e quindi anche i costi da supportare.

Supponiamo che si voglia intervenire sul gruppo di anziani con età tra i 65 e i 74 anni con valori di punteggio PASE inferiori al 10° percentile e quindi con una situazione di sedentarietà. In Veneto gli uomini nella classe 65-74 anni sono 246.001 le donne 275.324 (ISTAT – 2012).

Misuriamo la dimensione reale del problema per i differenti percentili:

Uomini:

$246.001 \times 0,36 = 88.560$ (50° percentile)

$246.001 \times 0,18 = 44.280$ (25° percentile)

$246.001 \times 0,07 = 17.220$ (10° percentile)

Donne:

$275.324 \times 0,46 = 126.649$ (50° percentile)

$275.324 \times 0,16 = 44.052$ (25° percentile)

$275.324 \times 0,06 = 16.519$ (10° percentile)

Il nostro lavoro interesserà circa 17.000 uomini e 16.500 donne e a seconda del tipo di intervento di prevenzione che vogliamo attuare possiamo stimare anche la spesa.

2.1.2 Stato nutrizionale e abitudini alimentari

In ogni fase della vita lo stato nutrizionale è un importante determinante delle condizioni di salute. Nelle persone con 65 anni e più, possono manifestarsi problemi nutrizionali secondari tanto agli eccessi quanto alle carenze alimentari, entrambi in grado di provocare la comparsa di processi patologici a carico di vari organi e di favorire l'invecchiamento. In particolare, l'eccesso di peso favorisce l'insorgenza o l'aggravamento di patologie preesistenti (dismetaboliche, cardiovascolari, osteo-articolari) e influisce negativamente sulla qualità della vita della persona. La perdita di peso non intenzionale rappresenta, invece, un indicatore comunemente utilizzato per la fragilità dell'anziano.


Lo stato nutrizionale si misura comunemente attraverso l'indice di massa corporea (IMC), dato dal rapporto del peso (in Kg) ed il quadrato dell'altezza (in metri); le persone vengono classificate sottopeso (IMC < 18,5), normopeso (IMC: fra 18,5-24,9), sovrappeso (IMC: fra 25-29,9), obeso (IMC $\geq$ 30). In PASSI d'Argento poiché questo indice viene calcolato sui dati riferiti dall'intervistato e non misurati direttamente, non si può assegnare un valore assoluto alla distribuzione dello stato nutrizionale nella popolazione in studio.

Adeguate quantità di frutta e verdura assicurano un rilevante apporto di carboidrati complessi, vitamine, minerali, acidi organici, sostanze antiossidanti e di fibre che oltre a proteggere da malattie cardiovascolari e neoplastiche, migliorano la funzionalità intestinale e contribuiscono a prevenire o migliorare la gestione del diabete mellito non insulino-dipendente. Secondo stime dell'OMS complessivamente lo scarso consumo di frutta e verdura è responsabile di circa un terzo degli eventi coronarici e di circa il 10% di ictus cerebrale. La soglia di 400 grammi al giorno, corrispondente a circa 5 porzioni, è la quantità minima consigliata per proteggersi da queste ed altre patologie e assicurare un rilevante apporto di nutrienti (vitamine, minerali, acidi organici) e sostanze protettive antiossidanti. Per questo motivo, in accordo con le linee guida, che raccomandano di consumare almeno 5 porzioni al giorno (five-a-day) di frutta o verdura, insalata o ortaggi, PDA misura il consumo di questi alimenti.

2.1.2.1 Qual è lo stato nutrizionale delle persone con 65 anni e più?

Il 39% risulta normopeso, il 44% in sovrappeso, il 15% obeso. Il 2% è sottopeso.


Le persone in eccesso ponderale, cioè in sovrappeso e obeso, sono il 59%.



2.1.2.2 Quante porzioni di frutta e verdura al giorno consumano le persone con 65 anni e più?

Le persone con 65 anni e più che consumano almeno 5 porzioni di frutta e verdura (“five a day”) raccomandate al giorno sono il 17%;

il 36% consuma solo 1-2 porzioni.




2.1.2.3 Quali sono le caratteristiche delle persone che consumano almeno tre porzioni di frutta e verdura al giorno?

Il consumo di almeno 3 porzioni di frutta e verdura al giorno è più frequente tra le donne (66% vs 58%) e tra le persone con 65-74 anni e più (66% vs 59%).

Consumare almeno tre porzioni di frutta e verdura è più frequente tra:

- le persone che non hanno o hanno qualche difficoltà economiche;
- le persone in buona salute e a basso rischio.



2.1.3 Consumo di alcol

Il consumo di alcol può avere conseguenze sfavorevoli per la salute in tutte le età. La fascia di popolazione con 65 anni e più è ad elevata vulnerabilità rispetto all'alcol: con l'età, infatti, la sensibilità agli effetti dell'alcol aumenta in conseguenza del mutamento fisiologico e metabolico dell'organismo. A partire dai 50 anni circa la quantità d'acqua presente nell'organismo diminuisce e l'alcol viene dunque diluito in una quantità minore di liquido. Questo significa che, a parità di alcol ingerito, il tasso alcolemico risulta più elevato e gli effetti sono più marcati. A questo fenomeno si aggiunge il ridotto funzionamento di alcuni organi come il fegato ed i reni, che non riescono più a svolgere pienamente la funzione di inattivare l'azione tossica dell'alcol e permetterne l'eliminazione dall'organismo. Si deve anche considerare che le persone anziane soffrono spesso di problemi di equilibrio, dovuti all'indebolimento della muscolatura, nonché di una ridotta mobilità. Il consumo di alcol può quindi aggravare la situazione, facilitando le cadute e le fratture. A tutto ciò si deve aggiungere che l'alcol interferisce con l'uso dei farmaci che le persone anziane, molto spesso, assumono quotidianamente. Pertanto, in età avanzata, anche un consumo moderato di alcol può causare problemi di salute. Le Linee Guida dell'INRAN (Istituto Nazionale per la Ricerca sugli Alimenti e la Nutrizione), in accordo con le indicazioni dell'OMS, consigliano agli anziani di non superare il limite di 12 g di alcol al giorno, pari ad 1 Unità Alcolica (330 ml di birra, 125 ml di vino o 40 ml di un superalcolico) senza distinzioni tra uomini e donne. Nell'indagine PASSI d'Argento è stata stimata la prevalenza dei consumatori di alcol e in particolare il numero di persone che bevono più di un'unità alcolica corrispondente a una lattina di birra o un bicchiere di vino o un bicchierino di liquore al giorno. Infine è stato stimato il numero di persone che hanno ricevuto il consiglio di ridurre il consumo di alcol da parte di un operatore sanitario.


2.1.3.1 Distribuzione del consumo di alcol per età e sesso

Il 49% delle persone consumano alcolici.

Il consumo è maggiore negli uomini rispetto alle donne (67% vs 37%).

Considerando l'età la percentuale dei consumatori passa da 53% nella classe di età 65-74 anni a 45% in quella delle persone con 75 anni e più.

Consumo di alcol (si/no) per genere e classi di età (%)
Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =1046)



2.1.3.2 Quante persone con 65 anni e più sono bevitori a rischio, ovvero consumano più di una unità alcolica al giorno? E quali sono le loro caratteristiche?

Il 26% delle persone è un bevitore a rischio, ovvero consuma più di una unità alcolica al giorno, pari a una persona su due delle persone che consumano alcol.

Si tratta di un'abitudine più frequente negli uomini (43% vs 13%) e tra le persone con 65-74 anni e più (30% vs 21%).


Essere bevitori a rischio è più frequente tra coloro che hanno un grado di istruzione più alto (35% vs 21%), e nei soggetti che non hanno difficoltà economiche.

Il 37% delle persone in buone condizioni, ma a rischio consuma alcol.

Consumatori di più di un'unità alcolica al giorno* (%)

Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =1046)

Totale = 26% (IC95% 22 – 29)



* Le persone con 65 anni e più che consumano più di un'unità alcolica al giorno sono definite a rischio.


2.1.3.3 Quante persone hanno ricevuto il consiglio di ridurre il consumo di alcol da parte di un operatore sanitario?

Riferendo la nostra osservazione alla popolazione del Veneto si rileva che:

- il totale delle persone con 65 anni e più che consumano alcol è di 503.828 persone (49% degli intervistati);
- tra questi 261.187 (52%) sono consumatori a rischio;
- tra i 261.187 consumatori a rischio vi sono 29.504 consumatori a rischio (11%) che hanno ricevuto il consiglio di smettere di bere da parte di un medico o di un operatore sanitario; 231.683 consumatori a rischio (89% dei 261.187), invece, non hanno ricevuto consiglio di smettere di bere da parte di un medico o di un operatore sanitario.

Consumatori di alcol non a rischio, consumatori a rischio con e senza consiglio di smettere di bere (proiezione in numeri assoluti)

Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =1046)



* Le persone con 65 anni e più che consumano più di un'unità alcolica al giorno sono definite a rischio.

2.1.4 Abitudine al fumo

Il fumo di tabacco costituisce uno dei principali fattori di rischio per l'insorgenza di numerose patologie cronico-degenerative, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardiovascolare; rappresenta inoltre il maggior fattore di rischio evitabile di morte precoce, a cui gli esperti attribuiscono circa il 12% degli anni di vita in buona salute persi a causa di morte precoce e disabilità (DALY - disability-adjusted life year). Il fumo fa male a tutte le età, ma le conseguenze negative del fumo aumentano con l'aumentare dell'età; le principali cause di mortalità correlate al fumo nelle persone con 60 anni e più sono il tumore del polmone e la broncopneumopatia cronica ostruttiva.


2.1.4.1 Come è distribuita l'abitudine al fumo?

Le persone con 65 anni e più che fumano sono il 7%. Di questi circa il 58% sono considerati forti fumatori ovvero fumano più di 10 sigarette al giorno.

Il 27% ha fumato almeno cento sigarette, ma al momento ha smesso.

Le persone con 65 anni e più che non hanno mai fumato sono il 66%.

Tre le donne i fumatori sono il 6% vs il 9% tra gli uomini, mentre gli ex-fumatori sono il 15% tra le donne vs il 45% tra gli uomini.



* Fumatore: soggetto che dichiara di aver fumato più di 100 sigarette nella sua vita e di fumare al momento

** Ex fumatore: soggetto che dichiara di aver fumato più di 100 sigarette nella sua vita e di non fumare al momento

*** Non fumatore: soggetto che dichiara di aver fumato meno di 100 sigarette nella sua vita e non fuma al momento

2.1.4.2 Quante persone con 65 anni e più sono fumatori ? E quali sono le loro caratteristiche?

Il 7% delle persone con 65 anni e più è un fumatore.


Si tratta di un'abitudine più frequente negli uomini (9% vs 6%) e tra le persone con 65-74 anni e più (10% vs 4%).

Essere fumatori è più frequente tra:

- le persone con livello di istruzione alto
- le persone che hanno molte difficoltà economiche
- le persone in buone condizioni, ma a rischio.

Fumatori* (%)
Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =1030)

Totale = 7% (IC95% 5 – 9)



* Fumatore : soggetto che dichiara di aver fumato più di 100 sigarette nella sua vita e di fumare al momento.


2.1.4.3 Quanti fumatori hanno ricevuto il consiglio di smettere di fumare da parte di un operatore sanitario?

Riferendo la nostra osservazione alla popolazione del Veneto si rileva che:

- il totale delle persone con 65 anni e più che fumano è di 73.295 persone (7% degli intervistati);
- tra i 73.295 fumatori 45.079 (62%) hanno ricevuto il consiglio di smettere di fumare da parte di un medico o di un operatore sanitario;
- tra i 73.295 fumatori 28.216 (38%), invece, non hanno ricevuto consiglio di smettere di fumare.

Fumatori* con e senza consiglio di smettere di fumare (proiezione in numeri assoluti)

Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =1030)



* Fumatore : soggetto che dichiara di aver fumato più di 100 sigarette nella sua vita e di fumare al momento.

2.2 Ipertensione arteriosa


L'ipertensione arteriosa è uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di patologia cardio e cerebrovascolare e, di conseguenza, è associata ad elevati tassi di mortalità, morbidità e disabilità. Il rischio aumenta progressivamente al crescere dell'età. Particolarmente frequente nelle persone con 65 anni e più, ed anzi caratteristica di questa fascia di età, è l'ipertensione sistolica isolata, che tradizionalmente è definita dall'associazione di una pressione arteriosa sistolica superiore a 159 mmHg con diastolica inferiore a 90 mmHg. La sua prevalenza cresce all'aumentare dell'età, dallo 0,8% a 50 anni fino al 23,6% all'età di 80 anni. È ormai definitivamente accertato che anche l'ipertensione sistolica isolata, non meno di quella sisto-diastolica, aumenta il rischio cardiovascolare. Per entrambe le forme, studi clinici randomizzati hanno dimostrato l'efficacia del trattamento antipertensivo nel ridurre la mortalità e la morbidità attribuibili all'ipertensione. Il trattamento non farmacologico dell'ipertensione arteriosa si basa sull'adozione di misure comportamentali, quali la dieta, l'esercizio fisico moderato, l'eventuale cessazione dell'abitudine al fumo e la riduzione del consumo di alcolici.

2.2.1 Quali sono le caratteristiche delle persone che soffrono di ipertensione?

Il 57% riferisce di soffrire di ipertensione.

L'ipertensione arteriosa è più frequente tra:

- le persone con 75 anni e più
- le donne
- le persone con livello di istruzione basso
- le persone che hanno molte difficoltà economiche
- le persone a rischio di disabilità in maniera significativa.



2.3 Prevalenza delle malattie croniche non trasmissibili

L'invecchiamento della popolazione è accompagnato da un aumento del carico delle malattie croniche degenerative, come quelle cerebro-cardiovascolari, il diabete, la malattia di Alzheimer e altre patologie neurodegenerative, tumori, malattie polmonari croniche ostruttive e problemi muscoloscheletrici. Con l'avanzare dell'età è sempre più frequente la presenza di comorbidità ovvero la coesistenza nello stesso individuo di 2 o più patologie croniche. Nella maggior parte dei casi si tratta di malattie croniche, per le quali tuttavia esistono misure di prevenzione efficaci in grado di prevenirle o ridurre la disabilità ad esse associata. La sostenibilità del sistema assistenziale socio-sanitario richiede, pertanto, che vengano implementate misure di prevenzione e promozione della salute, volte a contenere, per quanto possibile, l'insorgenza delle patologie croniche legata all'invecchiamento o, quantomeno, gli esiti disabilitanti.

2.3.1 Qual è la prevalenza di patologie croniche nella popolazione con 65 anni e più?


Tra le persone con 65 anni e più, il 15% soffre di malattie respiratorie e il 20% di diabete.

Il 61% delle persone con 65 anni e più ha almeno 1 patologia cronica, il 52% ne ha 1 o 2.

Distribuzione delle patologie croniche (%)

Indagine PASSI d'Argento

Veneto (n =1052)



2.3.2 Quali sono le caratteristiche delle persone che riferiscono 3 o più patologie croniche?

La percentuale di persone con 3 o più patologie croniche è più elevata tra gli uomini (10% vs 8%) e in maniera significativa tra le persone dai 75 anni e più (13% vs 5%).

Avere tre o più patologie croniche è più frequente maggiore tra:


- le persone con livello di istruzione basso
- le persone con disabilità
- le persone che hanno molte difficoltà economiche in modo significativo.

La quasi totalità (98%) delle persone con 3 o più patologie croniche fa uso di farmaci (vs il 79% tra le persone che non hanno patologie croniche).

Persone che riferiscono 3 o più patologie croniche (%)

Indagine PASSI d'Argento

Veneto (n =1052)



2.4 Problemi di vista, udito e masticazione

Le disabilità percettive legate a vista e udito condizionano le capacità di comunicazione della persone con 65 anni e più, peggiorando notevolmente la qualità di vita ed inducendo problematiche connesse all'isolamento e alla depressione. I problemi di vista costituiscono, inoltre, un importante fattore di rischio per le cadute. Per quanto riguarda la salute orale, questa costituisce, in ogni fase della vita, un aspetto importante per la salute complessiva della persona. Con il progredire dell'età, le difficoltà di masticazione possono determinare carenze nutrizionali e perdita non intenzionale del peso con effetti particolarmente gravi specie tra le persone fragili e con disabilità. I problemi masticatori influenzano inoltre la qualità della vita della persona con 65 anni e più, incidendo sul suo benessere sociale e psicologico.

2.4.1 Problemi di vista

L'OMS stima che a livello mondiale circa il 65% delle persone affette da patologie oculari siano ultracinquantenni e la percentuale è destinata ad aumentare con l'invecchiamento della popolazione (WHO 2011), pregiudicando l'autonomia delle persone più anziane ed esponendole a un maggior rischio di cadute accidentali. Glaucoma, degenerazione maculare senile, retinopatia diabetica e cataratta costituiscono, secondo il *National Eye Institute*, le principali patologie oculari correlate all'età (NIH, 2004). La maggior parte di queste patologie sono prevenibili, ma per questo e per potenziare i servizi di riabilitazione in favore di chi è affetto da deficit visivo, è di fondamentale importanza una strategia di salute pubblica che contempli la sorveglianza, l'educazione sanitaria della popolazione, il coordinamento degli screening, la diagnosi e la terapia. Il sistema PASSI d'Argento permette di stimare la proporzione di anziani con problemi di vista e di fare confronti a livello nazionale e soprattutto locale (Asl e Regioni). Nell'indagine 2012-2013 condotta nella nostra Regione il 10% (IC 95% 8% – 12%) delle persone con 65 anni e più ha riferito di avere problemi di vista, in particolare di non vedere da vicino anche usando gli occhiali.

2.4.1.1 Quali sono le caratteristiche delle persone che hanno problemi di vista?

Il 10% delle persone con 65 anni e più riferisce di avere problemi di vista.


I problemi di vista sono più frequenti in modo significativo tra:

- le persone con 75 anni e più
- le persone con livello di istruzione basso
- le persone a rischio di disabilità e con disabilità.
- I problemi di vista sono più frequenti tra coloro che hanno riferito di essere caduti negli ultimi 30 giorni, rispetto a quelli non caduti (rispettivamente il 18% vs il 9%).

Persone con problemi di vista* (%)

Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =1048)

Totale = 10% (IC95% 8 – 12)



* Le persone con 65 anni e più che dichiarano di vedere male (con l'esclusione di coloro che vedono bene solo con gli occhiali).

2.4.2 Problemi di udito

La riduzione della capacità uditiva è un fenomeno comune nell'invecchiamento e viene definita presbiacusia. Si stima che circa il 30 -35 % della popolazione compresa nella fascia di età 65 – 75 anni è affetta da presbiacusia e la percentuale sale al 50% per le persone con 75 anni e più.

La presbiacusia è un fenomeno progressivo, bilaterale e il più delle volte silente, del quale gli individui non sono spesso consapevoli, mentre il problema non sfugge a conviventi e conoscenti. Numerose classi di farmaci, tra cui diuretici, antibiotici e anti-infiammatori, sono responsabili di danni a carico dell'apparato uditivo, specie in presenza di una ridotta funzionalità renale, come è frequente nelle persone più anziane. La riduzione dell'udito e le conseguenti difficoltà a comunicare con gli altri si ripercuotono negativamente sulla vita fisica, emotiva e sociale della persona, che presenta con maggior frequenza segni di depressione, insoddisfazione della vita e un minore coinvolgimento nelle attività sociali. La presbiacusia si associa anche a un aumentato rischio di cadute, con la possibile conseguente frattura del femore, una delle principali cause di disabilità nell'anziano. La diagnosi della presbiacusia, semplice e poco dispendiosa, ed il suo trattamento rappresentano, quindi, una importante priorità di salute pubblica. In particolare risulta di grande rilevanza per l'anziano l'accesso ai servizi diagnostici audiologici, ai fini della prevenzione delle complicanze che questo deficit sensoriale può comportare.


2.4.2.1 Quali sono le caratteristiche delle persone che hanno problemi di udito?

Il 12% delle persone con 65 anni e più riferisce di avere problemi di udito.

I problemi di udito sono significativamente più frequenti tra:

- le persone con 75 anni e più
- le persone con disabilità.

I problemi di udito sono significativamente più frequenti tra le persone che si trovano in una condizione di isolamento sociale rispetto a chi invece è più integrato e partecipa alla vita sociale, 23% vs 9%.



* Le persone con 65 anni e più che dichiarano di sentire male (con l'esclusione di coloro che sentono bene solo con apparecchi acustici).

2.4.3 Problemi di masticazione

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei paesi a Sviluppo Avanzato, i problemi di salute orale sono il quarto disturbo più costoso. Le persone più anziane molto spesso non ricevono adeguati trattamenti per mancanza di consapevolezza, difficoltà di accesso ai servizi, ma anche per l'idea sbagliata che gli anziani non possano giovare di misure preventive e di interventi di educazione alla salute orale. I problemi di salute orale delle persone con 65 anni e più non sono solo legati alla cattiva masticazione e alla perdita dei denti, includono anche problematiche quali la xerostomia, nota anche come secchezza delle fauci, molto spesso collegata all'assunzione prolungata di farmaci o a patologie tumorali del cavo orale, riconducibili all'abitudine al fumo e al consumo eccessivo di alcol. Le difficoltà di masticazione possono limitare l'assunzione di importanti alimenti più difficili da masticare, determinando talvolta problemi di malnutrizione e anche perdita di peso. Infine, la mancanza di denti o comunque una dentatura compromessa può determinare anche forme di disagio psicologico con fenomeni di isolamento sociale e perdita di stima. Esistono cure efficaci per i problemi di salute orale. Inoltre, è stata dimostrata l'utilità e l'efficacia di interventi di promozione della salute orale. La prevenzione dei problemi di masticazione favorisce il miglioramento della qualità della vita ed è particolarmente importante per gli anziani più fragili o disabili in quanto previene problemi di salute collegati alla malnutrizione e alla perdita di peso. Alcuni fattori di rischio comportamentali come l'abitudine al fumo e il consumo di alcol sono associate a gravi patologie come il cancro del cavo orale.


2.4.3.1 Quali sono le caratteristiche delle persone che hanno problemi di masticazione?

Il 14% delle persone con 65 anni e più riferisce di avere problemi di masticazione.

I problemi di masticazione sono significativamente più frequenti tra:

- le persone con 75 anni e più
- le donne
- le persone con livello di istruzione basso
- le persone che hanno molte difficoltà economiche
- le persone con disabilità.

I problemi di masticazione sono più frequenti tra le persone che hanno dichiarato di aver perso peso negli ultimi 12 mesi (il 17% vs il 13% tra coloro che non hanno perso peso).



* Le persone con 65 anni e più che dichiarano di sentire male (con l'esclusione di coloro che masticano bene solo se usano la dentiera).


2.4.3.2 Quante persone con 65 anni e più sono state dal dentista almeno una volta nell'ultimo anno?

Riferendo la nostra osservazione alla popolazione del Veneto si rileva che:

- il totale delle persone con 65 anni e più che hanno problemi di masticazione è di 140.748 persone (14% degli intervistati);
- tra le 140.748 persone con problemi di masticazione 40.607 (29%) hanno riferito di aver visto il dentista nell'ultimo anno.

Persone con problemi di masticazione andati e non andati dal dentista (proiezione in numeri assoluti)

Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =1032)




2.4.3.3 Perché le persone non si recano dal dentista?

Il 72% non si reca dal dentista perché non ne sente il bisogno e il 17% non lo ritiene opportuno.

Tra le persone con disabilità il 60% dichiara di non essersi recato dal dentista perché pensa di non averne bisogno e il 13% per difficoltà negli spostamenti.

Motivo del non recarsi dal dentista

Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =612)



2.5 Cadute

Ogni anno si verificano in Italia fra i tre e i quattro milioni di incidenti domestici. Si tratta di un fenomeno che colpisce prevalentemente le persone con 65 anni e più, con conseguenze rilevanti in termini di ricoveri, disabilità e mortalità. Tra gli incidenti domestici, le cadute rappresentano la voce più importante. Il problema è particolarmente rilevante non solo per la frequenza e per le conseguenze di ordine traumatico, ma anche per le ripercussioni sul benessere psicologico della persona: anche la sola insicurezza legata alla paura di cadute può determinare una riduzione delle attività quotidiane e dei rapporti interpersonali con progressivo isolamento sociale.

Rispetto alle cause delle cadute, occorre considerare fattori di rischio intrinseci ed estrinseci. I primi comprendono diverse patologie predisponenti, come alcune patologie neurologiche. Fra i secondi rientrano i rischi connessi all'ambiente domestico come pavimenti e scalini sdruciolevoli, scarsa illuminazione, presenza di tappeti, ecc. Altro aspetto importante legato alle cadute è l'assunzione di alcune categorie di farmaci, come gli antipertensivi e gli ipnotici/sedativi.

Per prevenire le cadute sono necessari programmi di intervento mirati a ridurre i principali fattori di rischio per le cadute, a creare le condizioni per un ambiente sicuro e favorevole e a promuovere l'attività fisica.

2.5.1 Quante persone con 65 anni e più sono cadute negli ultimi 30 giorni e quali sono le loro caratteristiche?

L' 8% è caduto/a negli ultimi 30 giorni.

La prevalenza delle cadute aumenta con il crescere dell'età: 6% nella fascia 65-74 anni e 10% sopra i 74 anni.

E' caduto negli ultimi 30 giorni il 15% delle persone con disabilità.

E' caduto il 14% delle persone con problemi di vista (vs il 7% tra le persone che non riferiscono problemi di vista).

La maggior parte delle cadute sono avvenute in casa (52%), mentre in strada si è verificato il 19% delle cadute.

Tra le persone cadute, circa l' 11% è stato ricoverato per più di un giorno a seguito della caduta.


Tra gli intervistati il 39% ha paura di cadere.

Nelle persone tra i 65 e 74 anni cadute, il 51% ha paura di cadere (vs il 72% delle persone con 75 anni e più).

Cadute negli ultimi 30 giorni (%)

Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =1049)

Totale = 8% (IC95% 6 – 9)




2.5.2 Quante persone con 65 anni e più sono cadute e nella loro abitazione non usano precauzioni anticaduta?

Riferendo la nostra osservazione alla popolazione del Veneto si rileva che:

- le persone con 65 anni e più che sono cadute negli ultimi 30 giorni sono 80.544 (8% degli intervistati);
- tra le 80.544 persone cadute 23.164 (29%) non usano misure anticaduta in casa;
- negli ultimi 12 mesi, solo il 10% ha ricevuto consigli da parte di medico o di un altro operatore su come evitare di cadere.

Assenza di misure anti-caduta nel gruppo di persone cadute negli ultimi 30 giorni (proiezione in numeri assoluti)

Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =1049)



2.6 Sintomi di depressione

La depressione è una patologia psichiatrica che può determinare elevati livelli di disabilità, con notevoli costi diretti e indiretti per l'intera società. Essa è caratterizzata da sentimenti di tristezza, sensazione di vuoto interiore e perdita di interesse e piacere. In molti casi, questi sintomi si accompagnano anche a difficoltà nella cura di sé, riduzione e peggioramento delle relazioni sociali con tendenza all'isolamento, sensi di colpa e auto-svalutazione, disturbi del sonno e dell'appetito, astenia e difficoltà di concentrazione.

Con il progredire dell'età la presenza di una sintomatologia depressiva è una condizione frequente e spesso grave: essa determina un peggioramento della qualità della vita, ed è collegata ad una maggiore morbilità e ad un aumento del rischio suicidario. Al contrario, in molti casi si riscontra una sottostima della necessità di curarsi sia da parte delle persone più anziane, che considerano il loro stato psicologico una necessaria conseguenza della loro storia di vita, sia da parte di familiari e conoscenti che l'interpretano come una condizione tipica dell'età avanzata.

Analogamente alla sorveglianza PASSI, il sistema PASSI d'Argento valuta la presenza dei sintomi fondamentali della depressione (umore depresso e perdita di interesse o piacere per le attività che si è soliti svolgere) utilizzando il Patient Health Questionnaire-2 (PHQ-2): un test validato e molto utilizzato a livello internazionale e nazionale, che è caratterizzato da elevata sensibilità. Esso rappresenta un valido strumento per lo screening dei sintomi di depressione anche tra le persone con 65 anni e più.

2.6.1 Quante sono le persone con sintomi di depressione e quali sono le loro caratteristiche?


Il 14% presenta sintomi di depressione.

Questi sintomi sono più diffusi tra:

- le persone con 75 anni e più
- le donne
- le persone con livello di istruzione basso
- le persone che hanno molte difficoltà economiche
- le persone con disabilità o a rischio di disabilità.

Il 35% delle persone con 3 o più patologie croniche presenta sintomi di depressione (vs il 10% delle persone che non riferiscono patologie croniche).

Sintomi di depressioni* (%)
Indagine PASSI d'Argento Veneto (n =825)
Totale = 14% (IC95% 12 – 16)



* Persone con 65 anni e più e punteggio $\Rightarrow$ 3 del *Patient Health Questionnaire* (PHQ-2), calcolato sulla base del numero di giorni nelle ultime 2 settimane in cui la persona ha provato poco interesse o piacere nel fare le cose o si è sentito giù di morale, depressa o senza speranza.

2.6.2 Quante sono le persone con 65 anni e più che presentano sintomi di depressione che non fanno ricorso ad alcuno?


Riferendo la nostra osservazione alla popolazione del Veneto si rileva che:

- le persone con 65 anni e più che presentano sintomi di depressione sono 145.662 (14% degli intervistati);
- tra le 145.662 persone con sintomi di depressione 39.527 (27%) non hanno fatto ricorso ad alcuno.

Richiesta d'aiuto in caso di depressione

Indagine PASSI d'Argento

Veneto (n =825)



2.6.3 A chi ricorrono coloro che presentano sintomi di depressione?


Il 73% delle persone con sintomi di depressione si rivolge a qualcuno.

In particolare: a familiari/amici (15%), a medici/operatori sanitari (23%), a entrambi (35%).

Figure a cui si sono rivolte le persone con sintomi di depressione (%)

Indagine PASSI d'Argento

Veneto (n =108)



2.7 Rischio di isolamento

L'isolamento sociale è un concetto multidimensionale che comprende sia aspetti di natura “strutturale” quali ad esempio il vivere soli e la scarsità di relazioni, sia aspetti di natura “funzionale” come il supporto materiale ed emozionale veicolato dai rapporti in essere. L'assenza di relazioni sociali o la sua relativa scarsità, costituisce, ad ogni età, un importante fattore di rischio per la salute e per il benessere complessivo della persona. Con il progredire dell'età l'isolamento sociale risulta in relazione anche con il declino delle capacità cognitive e, più in generale, con un aumento della mortalità. Inoltre, la solitudine e l'isolamento sociale sono associati ad un maggior ricorso e una maggiore durata delle ospedalizzazioni nonché ad una miriade di altre conseguenze sulla salute, incluse la malnutrizione e l'abuso alcolico o il rischio di caduta. Nell'indagine PASSI d'Argento è stata valutata la partecipazione a incontri collettivi e l'incontrare altre persone anche solo per fare quattro chiacchiere. Sono state considerate a rischio di isolamento sociale le persone che in una settimana normale non svolgevano nessuna di queste attività.

2.7.1 Quante sono le persone a rischio di isolamento sociale e quali sono le loro caratteristiche?

Il 18% è a rischio di isolamento sociale.


Il rischio di isolamento sociale è più frequente tra le persone con 75 anni e più.

Tra gli uomini, il 27% delle persone con 75 anni e più è a rischio di isolamento (il 25% tra le donne con 75 anni e più).

Il 21% delle persone con livello di istruzione basso (nessuna istruzione o elementare) e a rischio di isolamento sociale (vs il 14% tra le persone con istruzione superiore).

Il 52% delle persone con disabilità è a rischio di isolamento.

Rischio di isolamento sociale* (%)
Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n = 1045)
Totale = 18% (IC95% 16 – 21)



* Persone con 65 anni e più che nel corso di una settimana normale NON partecipano a incontri collettivi o telefonano o incontrano altre persone anche solo per fare quattro chiacchiere.

2.8 Sicurezza nell'uso dei farmaci

Con il progredire dell'età, in corrispondenza di una maggiore prevalenza delle patologie croniche, aumentano i livelli di uso e di esposizione ai farmaci. Sono più frequenti i casi di comorbidità e di polifarmacoterapia, con l'assunzione contemporanea di diversi farmaci nell'arco della stessa giornata. La polifarmacoterapia aumenta il rischio di prescrizioni inappropriate e reazioni avverse. Essa, inoltre, può determinare una ridotta efficacia dei farmaci a causa della minore *compliance*.

La revisione regolare dei farmaci è indicata in letteratura come uno degli interventi più efficaci per ridurre le prescrizioni inappropriate di farmaci alle persone con 65 anni e più. La periodica verifica da parte del Medico di Medicina Generale (MMG) della corretta assunzione della terapia, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, può contribuire a limitare eventuali effetti collaterali e interazioni non volute. Nella sorveglianza PASSI d'Argento sono state raccolte informazioni sui farmaci assunti e sull'eventuale controllo dell'uso dei farmaci da parte del medico di medicina generale.


2.8.1 Quante persone con 65 anni e più hanno fatto uso di farmaci negli ultimi 7 giorni?

L' 88% delle persone con 65 anni e più ha assunto farmaci negli ultimi 7 giorni.

Questa percentuale è maggiore tra:

- le persone con 75 anni e più
- le donne
- le persone con livello di istruzione basso
- le persone che hanno difficoltà economiche
- le persone a rischio di disabilità e con disabilità.

Uso dei farmaci negli ultimi 7 giorni (%)
Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =1045)




2.8.2 Quanti tipi differenti di medicine prendono?

Fra coloro che assumono farmaci, il 57% ha dichiarato di assumere da 1 a 3 tipi di farmaci, mentre il 43% assume 4 farmaci o più.

Il 15% ha riferito di avere bisogno di aiuto: sono soprattutto persone con 75 anni e più e con basso livello di istruzione.

Numero di farmaci diversi assunti per giorno (%)
Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =928)



2.8.3 Quanti hanno rivisto la terapia farmacologica con il MMG negli ultimi 30 giorni?

La corretta assunzione della terapia farmacologica (farmaci giusti, orari, quantità) è stata verificata dal medico di fiducia negli ultimi 30 giorni per il 35% degli intervistati.


L'11% ha riferito che questo controllo è avvenuto da 1 a tre mesi prima, il 6% da 3 a 6 mesi prima, il 12% più di 6 mesi prima.

Tra coloro che assumono da 4 farmaci in su (435.579 persone):

- il 41% (pari a 178.588 persone) ha effettuato il controllo dei farmaci con il MMG negli ultimi 30 giorni;
- la percentuale di coloro che controllano i farmaci con il MMG è leggermente più bassa negli uomini rispetto alle donne (40% vs 44%).

Verifica dell'uso dei farmaci con i MMG per consumi ≥ 4 farmaci al giorno (proiezione in numeri assoluti)

Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =380)



2.9 Aiuto nelle attività della vita quotidiana

2.9.1 Quante persone ricevono aiuto tra quelle che hanno limitazioni nelle attività della vita quotidiana? Da chi lo ricevono?

Riceve aiuto quasi la totalità (97%) di coloro presentano situazioni di non autonomia per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana.


Tra coloro che ne hanno bisogno, 9 persone su 10 ricevono aiuto dai familiari.

Badanti (ovvero persone individuate e pagate in proprio) assistono circa un terzo (29%) delle persone con 65 anni e più con disabilità, ma anche il 19% di quelli con mancanza di autonomia nelle sole IADL.

Conoscenti supportano circa un quinto (17%) delle persone con problemi di autonomia nelle attività della vita quotidiana.

Tra le persone con problemi nelle ADL il 16% dichiara di ricevere aiuto da operatori del servizio pubblico (es ASL o Comune) e il 2% di essere assistito presso un centro diurno.

Contributi economici vengono riferiti da quasi un terzo (31%) delle persone con disabilità e dal 8% di quelle con difficoltà nelle IADL.




2.9.2 Come viene giudicato l'aiuto ricevuto?

Il giudizio sull'aiuto ricevuto è stato espresso da metà di coloro che lo hanno ricevuto (48%). Di queste il 71% sono persone con disabilità e il restante 29% sono persone a rischio di disabilità.

Tra coloro che hanno espresso la propria opinione il giudizio è stato prevalentemente positivo (sufficiente/buono):

- 92% tra coloro con limitazioni nelle ADL
- 94% tra coloro che hanno limitazioni solo nelle IADL.



2.10 Vaccinazione antinfluenzale

L'influenza costituisce un rilevante problema di sanità pubblica, in particolare per le possibili gravi complicanze nei soggetti a rischio come le persone con 65 anni e più. La vaccinazione è particolarmente importante in presenza di alcune patologie croniche molto frequenti in età anziana come le patologie dell'apparato respiratorio, cardio-vascolare, il diabete, l'insufficienza renale e i tumori.

Nei paesi industrializzati si stima che l'influenza rappresenti la terza causa di morte per malattie infettive, dopo AIDS e tubercolosi. La vaccinazione antinfluenzale nei gruppi a rischio è un'attività di prevenzione di provata efficacia: mira a rallentare la diffusione del virus nella comunità (prevenzione collettiva) e a prevenire le complicanze (protezione individuale), così da ridurre diffusione, gravità e letalità delle epidemie stagionali. Nel nostro Paese, la vaccinazione contro l'influenza per i gruppi a rischio è stata prevista nel Piano Sanitario Nazionale fin dal 1998-2000, e nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccini fin dal 1999-2000. Il Ministero della Salute raccomanda di vaccinare almeno il 75% delle persone appartenenti alle categorie a rischio. Per le persone con 65 anni e più sono previsti programmi di immunizzazione universale. L'aumento dei livelli di copertura vaccinale nella popolazione con 65 anni e più, richiede la messa in atto di strategie finalizzate a migliorare l'adesione (chiamata attiva, allargamento delle fasce orarie dedicate, vaccinazione a domicilio, etc.).

2.10.1 Quante persone con 65 anni e più NON hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale? E quali sono le loro caratteristiche?

La percentuale di persone che non si sono sottoposte alla vaccinazione è pari a 42%.

Tale percentuale è più alta tra:

- le persone con livello di istruzione alto
- le persone che hanno molte difficoltà economiche;

e in maniera significativa tra:


- le persone con 65-74 anni
- le persone in buone condizioni a basso rischio.

Tra le persone che non hanno effettuato la vaccinazione il 47% ha ricevuto il consiglio di vaccinarsi dal proprio MMG.

Persone che NON hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale (%)

Indagine PASSI d'Argento
Venezia (n = 1038)

Totale = 42% (IC95% 39 – 46)




2.10.2 Quanti hanno ricevuto il consiglio di fare la vaccinazione antinfluenzale?

La vaccinazione antinfluenzale è effettuata dal 58% delle persone con 65 anni e più.

Tra coloro che non hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale (431.083 persone):

- il 53% (pari a 228.004 persone) non ha ricevuto il consiglio di effettuarla
- il 47% (pari a 203.079 persone) ha ricevuto il consiglio di effettuarla.

Vaccinazione antinfluenzale, con e senza consiglio
(proiezione in numeri assoluti)
Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =1038)




2.11 Protezione dalle ondate di calore

Negli ultimi anni si sono accentuati fenomeni climatici estremi che, soprattutto in estate, sono caratterizzati da ondate di caldo con umidità elevata. Se non vengono prese le dovute precauzioni questi fenomeni possono rivelarsi molto pericolosi per la salute delle persone più anziane e con patologie croniche. E' compito dei servizi socio-sanitari favorire la messa in atto di misure preventive strutturali e, soprattutto, comportamentali anche attraverso la diffusione di informazioni e consigli su questo argomento.

2.11.1 Quante persone con 65 anni e più hanno ricevuto consigli per proteggersi dal caldo? E quali sono le loro caratteristiche?

La percentuale di persone che hanno ricevuto consigli per proteggersi dal caldo è del 66% e non dipende dal genere, dall'età, dall'istruzione e dalla condizione economica.

Il 34% delle persone con 65 anni e più non ha ricevuto consigli per proteggersi dal caldo.



2.11.2 Da chi sono state ricevute informazioni o consigli per proteggersi dal caldo?

Il 34% delle persone con 65 anni e più non ha ricevuto nell'ultima estate informazioni o consigli per proteggersi dal caldo.

I mezzi di informazione di massa (radio/TV, giornali, internet) sono risultati la modalità principale per veicolare informazioni o consigli per proteggersi dalle ondate di calore: hanno raggiunto il 45% delle persone.


Il 19% ha ricevuto informazioni o consigli dal MMG.

Il 10% ha ricevuto informazioni o consigli da altre persone, diverse dal MMG.


Il 5% ha ricevuto informazioni o consigli per proteggersi dal caldo attraverso opuscoli e manifesti.

Da chi sono state ricevute informazioni o consigli per proteggersi dal caldo (%)

Veneto (n =1016)



2.12 Indicatori che descrivono fattori di rischio e condizioni di salute: un confronto tra il Veneto e i dati nazionali



Con la "spine chart" come questa si rappresentano in un'unica immagine diversi indicatori. Per ogni indicatore viene riportato il valore della media del pool nazionale (con la linea centrale verticale), i valori del 25° e del 75° percentile (ai limiti della banda azzurra), il valore minimo e massimo (ai limiti della banda beige) riscontrati fra le 115 aziende sanitarie che nel 2012-2013 hanno partecipato alla rilevazione dei dati. Il valore dell'indicatore per l'ASL o la regione cui si riferisce il rapporto viene indicato con un pallino di 3 diversi colori: VERDE, ROSSO o GIALLO a seconda che il valore sia significativamente migliore, peggiore o NON significativamente differente rispetto al valore medio del pool nazionale. La significatività della differenza si evince dal confronto fra gli intervalli di confidenza (indicati) del valore medio del pool nazionale e quelli del valore locale (regionale o aziendale). Se non vi è sovrapposizione di valori, la differenza (in meglio o in peggio che sia) è statisticamente significativa, mentre in caso di sovrapposizione non lo è. Attenzione: non basta, per una certa regione o azienda, avere un pallino verde per escludere che l'aspetto indicato NON sia un problema di salute pubblica.

Dal confronto con la media del pool nazionale di alcuni dei principali indicatori sui fattori di rischio, sulle condizioni di salute e sulle cure degli intervistati, si nota che la popolazione ultra 64enne veneta vive una situazione per molti fattori migliore rispetto ai coetanei del pool nazionale. Unici due fattori in cui i veneti presentano indicatori significativamente peggiori rispetto al pool nazionale sono quelli relativi alla vaccinazione antinfluenzale e al consumo di alcol.

3. Partecipazione

Insieme all'aumento del numero di persone con 65 e più anni, previsto nei prossimi decenni in Italia e nel resto del mondo, cresce anche l'interesse per il contributo che questa fascia di popolazione può dare a tutta la società. Non a caso l'anno 2012 è stato proclamato Anno Europeo per l'Invecchiamento Attivo, con l'intento di incoraggiare i responsabili politici e tutti i gruppi di interesse ad agire con l'obiettivo di creare migliori opportunità per l'invecchiamento attivo e rafforzare la solidarietà tra le generazioni. In questo quadro è stato concepito dalla Commissione europea delle Nazioni Unite per Europa (UNECE)¹, l'indice di invecchiamento attivo (AAI), strumento che permette di misurare e promuovere nell'ambito degli Stati membri dell'UE il potenziale inutilizzato della popolazione anziana. L'indice misura la performance di invecchiamento attivo in quattro distinti ambiti :

- (1) Occupazione;
- (2) Attività sociali e partecipazione;
- (3) Indipendenza e autonomia;
- (4) Capacità e ambiente favorevole per l'invecchiamento attivo.

Ciascun ambito viene indagato attraverso una serie di indicatori, che concorrono a determinare il valore complessivo dell'indice. L'AAI è uno strumento comparativo, che permette ai decisori politici nazionali di valutare la loro performance in tema di invecchiamento attivo rispetto agli altri Stati membri dell'UE e di monitorare i progressi nel tempo; inoltre, calcolato separatamente per uomini e donne fornisce ulteriori approfondimenti sulle azioni politiche necessarie a ridurre le disparità di genere.

La classifica tra gli Stati membri dell'Unione europea per l'indice di invecchiamento attivo vede ai primi posti tre paesi nordici (Svezia, Finlandia e Danimarca), mentre la maggioranza dei paesi dell'Europa centrale e orientale sono in fondo alla classifica; l'Italia si colloca in posizione medio bassa.

E' stata osservata un'elevata correlazione dell'AAI con il PIL pro capite: gli Stati membri dell'UE con maggiore ricchezza e migliore tenore di vita sono più inclini a favorire e sviluppare esperienze di invecchiamento attivo.

Nel 2012 la Commissione europea ha lanciato il Partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute (EIP-AHA): un'iniziativa pilota che mira a coinvolgere Regioni, città, ospedali e organizzazioni per affrontare la sfida rappresentata dall'invecchiamento demografico, con l'obiettivo di accrescere di due anni la speranza di vita in buona salute dei cittadini europei entro il 2020, attraverso un approccio globale, innovativo e integrato all'assistenza, cura e uso di tecnologie per l'invecchiamento sano e attivo.

La partecipazione attiva delle persone anziane può essere promossa attraverso una serie di iniziative, come ad esempio:

¹L'Invecchiamento della popolazione è un fenomeno globale, come è stato riconosciuto dal Piano di Azione Internazionale sull'Invecchiamento (MIPAA) delle Nazioni Unite, adottato dalla Seconda Assemblea Mondiale sull'invecchiamento di Madrid nel 2002. L'MIPAA rappresenta il quadro politico di riferimento globale per indirizzare le risposte dei vari Paesi nei confronti dell'invecchiamento della popolazione. L'UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) è responsabile per l'attuazione di MIPAA in Europa; nel 2012 ha adottato la dichiarazione di Vienna che descrive quattro obiettivi prioritari per i paesi UNECE, da raggiungere entro la fine del terzo ciclo (2017): (i) incoraggiare e mantenere una più lunga attività lavorativa; (ii) promuovere la partecipazione, la non discriminazione e l'inclusione sociale delle persone anziane; (iii) promuovere e salvaguardare la dignità, la salute e l'indipendenza nella maggiore età e (iv) mantenere e rafforzare la solidarietà intergenerazionale. L'AAI è uno strumento importante per essere utilizzato per valutare e controllare l'attuazione delle MIPAA.

incoraggiare i pensionati a lavorare part-time, coinvolgerli in iniziative comunitarie e di volontario, o adattare i sistemi fiscali in modo che venga riconosciuta l'assistenza informale fornita dalle persone anziane (es. baby-sitter).


Tutto questo crea le condizioni ottimali affinché le persone più avanti in età rappresentino una risorsa per la collettività, contribuisce a ridurre il loro livello di dipendenza dagli altri e ad innalzare la qualità della loro vita. Il concetto di “anziano-risorsa” parte da una visione positiva della persona, che è in continuo sviluppo ed è in grado di contribuire, in ogni fase della vita, sia alla propria crescita individuale che collettiva. Già nel 1997 con la dichiarazione di Brasilia, l'OMS definiva la persona anziana come una risorsa per la famiglia, la comunità e l'economia. Oggi è sempre più riconosciuto il valore sociale ed economico di alcune attività svolte dalle persone più anziane quali, ad esempio, attività lavorative retribuite, attività di volontariato, attività in favore di membri del proprio nucleo familiare o amicale. Nell'indagine PASSI d'Argento sono stati misurati alcuni aspetti della partecipazione e dell'essere risorsa. In particolare, è stata valutata la frequenza a corsi di cultura e formazione, l'eventuale attività lavorativa retribuita o di volontariato, attività sociali e comunitarie, supporto e cura offerti a familiari e conoscenti.

3.1 Formazione e apprendimento

Partecipare ad attività culturali ed educative favorisce la crescita individuale e rende attivi nello scambio di conoscenze, di competenze e di memoria, contribuendo così a migliorare i rapporti inter ed intra-generazionali. La sorveglianza PASSI d'Argento ha indagato la partecipazione, negli ultimi 12 mesi, a corsi di formazione per adulti, come corsi di inglese, di computer o università della terza età; l'informazione raccolta può essere considerata anche una misura indiretta delle azioni messe in atto dalla società per valorizzare le persone con 65 e più anni.

Solo il 7% (I.C. 5 - 8) del nostro campione ha dichiarato di avere frequentato corsi di formazione; si tratta soprattutto di donne, di persone appartenenti alla classe di età più giovane, con livello di istruzione più alto e con nessuna difficoltà economiche, in buona salute.

Partecipazione a corsi Indagine PASSI d'Argento Veneto (n=1046)



3.2 Lavoro


Con l'aspettativa di vita in aumento in tutta Europa, anche l'età di pensionamento è in aumento, come dimostrano le recenti riforme apportate al sistema pensionistico anche nel nostro Paese.

Il coinvolgimento degli anziani in attività lavorative retribuite, oltre ad influenzare positivamente la loro salute e il loro benessere, aiuta a promuovere la loro partecipazione attiva nella comunità di appartenenza, contribuendo così alla costituzione di un vero e proprio capitale sociale.

3.2.1 Quante persone con 65 anni e più svolgono un lavoro retribuito?

Il 7,5% del campione (I.C. 6 - 9) ha dichiarato di svolgere un lavoro retribuito. Sono in maggior misura uomini, appartenenti alla classe di età più giovane, con livello di istruzione più alto, con meno difficoltà economiche, in buona salute.

Tra coloro che svolgono un lavoro retribuito il 9% non percepisce una pensione.



3.3 Attività sociali e comunitarie


I contatti sociali e le relazioni con altre persone hanno una influenza positiva sulla salute e sul benessere degli individui in generale e degli anziani in particolare, i quali possono essere più facilmente esposti al rischio di isolamento sociale e, di conseguenza, di depressione.

3.3.1 Quante persone con 65 anni e più partecipano ad attività sociali?

In una settimana tipo, il 27% (I.C. 24 - 30) degli intervistati ha riferito di frequentare il centro anziani o i circoli o la parrocchia o le sedi di partiti politici e di associazioni.

La partecipazione è maggiore tra le persone:


- con meno di 75 anni
- di genere maschile
- con un alto livello di istruzione
- in buona salute.



3.3.2 Quante persone con 65 anni e più partecipano a gite o soggiorni organizzati?

Negli ultimi 12 mesi, circa il 29% (I.C. 26-31) degli intervistati, ha partecipato, con altre persone, a gite o soggiorni organizzati.

Si tratta in ugual misura di donne e uomini, di età più giovane, con livello di istruzione più alto, con meno difficoltà economiche, appartenenti al I° e II° sottogruppo.



3.4 Essere una risorsa per famiglia, conoscenti e collettività

Nell'indagine PASSI d'Argento è stato valutato il supporto fornito dalla persona ultra 64enne, in termini di accudimento e aiuto a congiunti, figli, fratelli/sorelle, genitori, nipoti o amici, attraverso due domande, una riferita a persone conviventi e una a persone non conviventi.


Per documentare il supporto fornito alla collettività è stato chiesto agli anziani se nei 12 mesi precedenti avessero svolto attività di volontariato, ossia attività prestate gratuitamente a favore di anziani, bambini, persone con disabilità o presso ospedali, parrocchie, scuole o altro.

3.4.1 Quanti sono complessivamente gli anziani che rappresentano una risorsa per la società?

Il 36% (I.C. 32-40) degli persone con 65 anni e più intervistati rappresenta una risorsa per conviventi, non conviventi o per la collettività.

Si tratta soprattutto di persone :

- di sesso femminile
- con meno di 75 anni
- con livello d'istruzione alto
- con poche difficoltà economiche
- in buona salute.




3.4.2 Per CHI i nostri anziani rappresentano una risorsa?

Il 13% del campione intervistato (I.C. 10-15) è una risorsa per le persone che vivono sotto lo stesso tetto.

Il 14% (I.C. 11-16) è di supporto e aiuto per figli, fratelli/sorelle, nipoti o amici non conviventi.

In entrambi i casi le donne sono in proporzione maggiore.

Il 10% (I.C. 8-12) svolge attività di volontariato in favore di altri anziani, bambini, persone con disabilità o presso ospedali, parrocchie, scuole o altro.



3.4.3 Quali sono le caratteristiche degli anziani che aiutano familiari e amici con cui condividono l'abitazione?


Si stima che circa 21% (214.104) persone con 65 e più anni, residenti nella nostra regione, rappresentino una risorsa per i conviventi.

La proporzione più alta si registra in coloro che hanno le seguenti caratteristiche:

- donne
- età inferiore ai 75 anni
- livello d'istruzione alto
- in buona salute.

Essere risorsa per i conviventi *

Indagine PASSI d'Argento
Venezia (n=1046)



3.4.4 Quali sono le caratteristiche degli anziani che sono di supporto a persone che non convivono con loro?

Si stima che circa 18% (183.518) persone con 65 e più anni, residenti nella nostra regione, rappresentino una risorsa per i non conviventi.


La proporzione più alta si registra tra coloro che hanno le seguenti caratteristiche:

- età inferiore ai 75 anni
- livello d'istruzione alto
- in buona salute.

Non esistono differenze statisticamente significative per genere.

Essere risorsa per i non conviventi *

Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n=1045)



3.4.5 Quali sono le caratteristiche degli anziani che sono di aiuto alla collettività?

Si stima che circa 10% (101.954) persone con 65 e più anni, residenti nella nostra regione, siano una risorsa per la collettività, cioè svolgono attività di volontariato in favore di altri anziani, bambini, persone con disabilità o presso ospedali, parrocchie, scuole o altro.


La proporzione più alta si registra in coloro che hanno le seguenti caratteristiche:

- età inferiore ai 75 anni
- livello d'istruzione alto
- nessuna difficoltà economica
- in buona salute.

Non esistono differenze statisticamente significative per genere.


Essere risorsa per la collettività

Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n=1042)




3.4.6 Cosa possiamo fare perchè la persona con 65 anni e più possa rimanere una risorsa all'interno dei diversi ambiti di vita?

Il modello rappresenta una sintesi delle azioni che possono essere intraprese da parte della società civile per favorire l'essere risorsa dei propri anziani:



3.5 Indicatori che descrivono la partecipazione e l'essere risorsa: un confronto tra il Veneto e i dati nazionali



La popolazione dai 65 anni e più veneta risulta essere più partecipe alla vita sociale rispetto al pool nazionale sia come risorsa, volontariato e attività di formazione.

4. Ambiente di vita

Accanto ai servizi di assistenza sanitaria primaria, l'esistenza di ambienti favorevoli alla salute costituisce un elemento importante della prevenzione primaria. La predisposizione di ambienti sani e favorevoli alla salute e al benessere per tutte le età corrisponde all'area prioritaria 4 ("Creare comunità in grado di rispondere alle sfide e ambienti favorevoli alla salute") della politica OMS *Salute 2020*. In questo contesto, anche il Piano d'azione per l'invecchiamento sano in Europa 2012-2020 inserisce tra le aree strategiche prioritarie per l'azione gli "Ambienti favorevoli alla salute".

L'obiettivo del piano europeo è quello di portare un numero sempre maggiore di comunità a impegnarsi nel processo di elaborazione di strategie mirate a rendersi maggiormente a misura di anziano, dal momento che importanti decisioni che influenzano l'ambiente di vita vengono spesso assunte a livello locale.


L'accessibilità dei servizi sociosanitari è un elemento determinante per garantire percorsi di promozione e tutela della salute della popolazione con 65 anni e più, e operare per migliorarla rientra anche nell'ambito di una più generale funzione di contrasto alle disuguaglianze. PASSI d'Argento ha esplorato la fruibilità dei servizi sanitari (Servizi della ASL, Medico di famiglia, Farmacia), sociali (Servizi del Comune) e utili alle necessità della vita quotidiana (negozi di generi alimentari, supermercati o centri commerciali) e le difficoltà incontrate per raggiungerli.

Vivere in una abitazione adeguata ai propri bisogni individuali, in un contesto sicuro, ricco di socialità, dove la libertà di movimento e la sicurezza sono assicurate sia dentro le abitazioni che al di fuori, è un bisogno e un diritto essenziale in ogni fase della vita. Con l'avanzare dell'età, e quindi del tempo che si trascorre nella propria abitazione, disporre di un alloggio sicuro e confortevole diventa ancora più importante per una buona qualità della vita.

Per le persone anziane, il sostegno alla partecipazione e all'inclusione sociale, fattori ambientali legati all'edilizia e la sicurezza fanno parte degli aspetti più rilevanti per la realizzazione di un ambiente favorevole alla salute e la "sicurezza fisica" è uno degli indicatori utilizzati nel 2012 dall'Unione Europea per la creazione dell'indice di invecchiamento attivo. PASSI d'Argento ha raccolto informazioni riguardanti l'alloggio di residenza e l'area ad esso circostante. In particolare sono state indagate le condizioni di godimento dell'alloggio (es: proprietà, affitto), possibili fonti di preoccupazione legate alle condizioni abitative e la sensazione di sicurezza nell'area di residenza.

4.1 Accessibilità ai servizi

4.1.1 Quanti hanno difficoltà a raggiungere i servizi?



Le persone con 65 anni e più che esprimono difficoltà a raggiungere i servizi risultano:

- 27% per i servizi della ASL
- 24% per i servizi del Comune
- 20% per il Medico di famiglia
- 19% per la farmacia
- 21% per i negozi di generi alimentari
- 27% per i supermercati e i centri commerciali.

Quindi anche se almeno 7 persone su 10 raggiungono facilmente i servizio più importanti, almeno 2 su 5 ha difficoltà di accesso ad uno di essi.

Quasi la metà delle persone (54%) dichiara di raggiungere “molto facilmente” il Medico di famiglia, modalità che registra il valore più basso (45%) per l’accesso ai servizi della ASL.


4.1.2 Chi ha maggiori difficoltà a raggiungere i servizi sociosanitari?

Raggiungono con difficoltà i Servizi della ASL (%)

Indagine PASSI d'Argento

Veneto (n = 1043)

Totale = 27% (IC95% 23 – 30)




Raggiungono con difficoltà i Servizi del Comune

Indagine PASSI d'Argento

Veneto (n = 1030)

Totale = 24% (IC95% 20 – 28)




Raggiungono con difficoltà il Medico di famiglia (%)

Indagine PASSI d'Argento

Veneto (n = 1045)

Totale = 20% (IC95% 16 – 24)




Raggiungono con difficoltà la farmacia (%)

Indagine PASSI d'Argento

Veneto (n = 1043)

Totale = 19% (IC95% 15 – 22)



Indipendentemente dal tipo di servizio preso in considerazione, difficoltà di accesso sono segnalate con frequenza significativamente maggiore:

- dalle donne rispetto agli uomini;
- dalle persone con 75 anni e più rispetto a quelle tra 65 e 74 anni;
- dalle persone senza titolo di studio o con scolarità elementare rispetto agli altri titoli di studio;
- dalle persone con difficoltà economiche rispetto a quelle che non ne riferiscono;
- dalle persone a “rischio di” o “con” disabilità, rispetto a quelle in buona salute.

4.1.3 Chi ha maggiori difficoltà a raggiungere negozi di generi alimentari e/o supermercati?

Il 27% della popolazione con 65 anni e più riferisce difficoltà a raggiungere negozi di genere alimentari e/o supermercati.

Anche la difficoltà di accesso ai servizi commerciali considerati nell'indagine riguarda in particolar modo:


- le donne (34%);
- i più “anziani” (75 anni e più:44%);
- le persone con scolarità bassa (34%);
- le persone con difficoltà economiche (qualche 19%; molte: 29%);
- le persone a “rischio di” o “con” disabilità (rispettivamente 55 e 80%).

Questi gruppi di popolazione appaiono svantaggiati nell'accesso ai negozi di generi alimentari e ai supermercati/centri commerciali, anche quando considerati separatamente.

Raggiungono con difficoltà negozi di generi alimentari e/o supermercati (%)

Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =1038)

Totale = 27% (IC95% 23 – 31)



4.2 Abitazione

4.2.1 Quanti vivono in un'abitazione propria e quanti in affitto?


8 persone con 65 anni e più su 10 (79%) vivono in casa propria o del coniuge, condizione meno frequente tra coloro che dichiarano molte difficoltà economiche (67%) e tra le persone con disabilità (68%) .

L'8% paga un affitto, situazione che arriva a coinvolgere una persona su 6 (16%) tra coloro che riferiscono molte difficoltà economiche.

Poco numerose sono le persone con 65 anni e più che vivono in case di persona di fiducia (5%) o in abitazioni in usufrutto o comodato d'uso (7%).


La quota di queste 2 categorie di persone però quasi raddoppia (21% complessivamente) dopo gli 85 anni.

Caratteristiche dell'abitazione (%)
Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =1036)



Persone che vivono in abitazione propria
Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =1036)

Totale = 79% (IC95% 77 – 82)




4.2.2 Quali problemi hanno le abitazioni in cui vivono le persone con 65 anni e più?

Tra i problemi dell'abitazione, le spese troppo alte rappresentano il problema più diffuso essendo riferito da oltre la metà (62%) delle persone con 65 anni e più.

Il 16% lamenta eccessiva distanza dalla famiglia e l'11% riscaldamento insufficiente.

Gli altri problemi abitativi indagati vengono riferiti ciascuno da meno del 10% degli persone con 65 anni e più:

- cattive condizioni (8%)
- dimensione insufficiente (4%)
- problemi di erogazione dell'acqua (4%).




4.2.3 Chi segnala maggiormente problemi dell'abitazione in cui vive?

Complessivamente 7 persone con 65 anni e più su 10 riferiscono problemi nell'abitazione: il 51% un problema e il 23% almeno due.

I problemi nell'abitazione vengono segnalati con frequenza non significativamente differente per genere, età, scolarità, mentre in maniera significativa è più frequente tra le persone con difficoltà economiche e con disabilità.

Quando non viene presa in considerazione la segnalazione di spese troppo alte, le persone con 65 anni e più che riferiscono problemi nell'abitazione risultano poco più di un terzo (34%).

In questo caso non si osservano frequenze di segnalazione significativamente differenti per tutte le classificazioni considerate.




4.2.4 La segnalazione di problemi dell'abitazione cambia in relazione alla sua proprietà?

Lo status di proprietario/a dell'abitazione non cambia la frequenza complessiva di segnalazione di problemi dell'abitazione.

Considerando separatamente i problemi di tipo economico (“spese troppo alte”) e gli altri, in entrambi i casi non si registra una frequenza di segnalazione di problematiche dell'abitazione significativa per nessun tipo di abitazione (di proprietà o altro) in cui vivono gli intervistati.

Proprietà dell'abitazione e segnalazioni di problemi (%)
Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n =1036)



* di persone di fiducia o in usufrutto/comodato d'uso

4.3 Sicurezza nell'area di residenza

4.3.1 Quante persone si sentono sicure nell'area in cui vivono?

In Veneto oltre l'80% delle persone con 65 e più anni si sente sicura nell'area in cui vive:


- il 32% molto sicura
- il 54% abbastanza sicura.

Sono quindi 14 persone su 100 le persone che invece non si sentono sicure:

- Il 12% poco sicure
- il 2% per niente sicure.

Quanto si sentono sicuri nell'area di abitazione (%)

Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n = 835)



4.3.2 Quali persone si sentono maggiormente insicure nell'area in cui vivono?

La mancanza di sicurezza nell'area in cui si vive non cambia in relazione a genere, età, scolarità, condizioni economiche e stato di salute.


Seppure in maniera non statisticamente significativa, la sensazione di insicurezza aumenta in relazione alla presenza di difficoltà economiche (12% se nessuna difficoltà; 22% se molte difficoltà).

La sensazione di sicurezza dell'area in cui si vive non cambia in relazione all'abitare in casa di proprietà o in affitto.

Mancanza di sicurezza* nell'area in cui si vive (%)


Indagine PASSI d'Argento
Veneto (n = 835)

Totale = 14% (IC95% 11 – 17)



*= si sentono "poco" o "per niente" sicure

4.4 Indicatori che descrivono l'ambiente di vita e l'accessibilità ai servizi: un confronto tra il Veneto e i dati nazionali



Dal confronto con il pool nazionale, gli ultra64enni veneti dichiarano di aver meno difficoltà di accessibilità ai servizi in modo significativo rispetto ai propri coetanei del pool nazionale. Mentre la situazione relativa all'ambiente di vita, abitazione e sicurezza, non si scosta dalla situazione nazionale.

Bibliografia

Cap. 1 – BENESSERE E INDIPENDENZA

- Istituto Nazionale di Statistica. *Annuario statistico italiano 2012*. Roma: ISTAT; 2012. Disponibile all'indirizzo: http://www3.istat.it/dati/catalogo/20121218_00/PDF/Cap2.pdf; ultima consultazione 24/09/13.
- Katz S, Downs TD, Cash HR, Grotz RC. Progress in development of the index of ADL. *Gerontologist* 1970; 10: 20-30.
- Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. *Gerontologist* 1969; 9: 179-185.
- Istituto Nazionale di Statistica. *La disabilità in Italia: il quadro della statistica ufficiale*. Roma: ISTAT; 2009. Disponibile all'indirizzo: http://www3.istat.it/dati/catalogo/20100513_00/arg_09_37_la_disabilita_in_Italia.pdf; ultima consultazione 24/09/13.
- Network Non Autosufficienza (Ed.). *L'assistenza agli anziani non autosufficienti - Rapporto 2009*. Santarcangelo di Romagna (RN): Maggioli Editore. Disponibile all'indirizzo: http://www.maggioli.it/rna/pdf/rapporto2009-assistenza_anziani.pdf ; ultima consultazione 24/09/13.
- Bertozzi N, Vitali P, Binkin N, Perra A, D'argenio P, ed il Gruppo di Lavoro "Studio Argento". La "Qualità di vita" nella popolazione anziana: indagine sulla percezione dello stato di salute in 11 regioni italiane (Studio Argento, 2002). *Igiene e Sanità Pubblica* 2005; 61:545-559.
- Ôunpuu S, Chambers LW, Patterson C, Chan D, Yusuf S. Validity of the United States Behavioral Risk Factor Surveillance System's health-related quality of life survey tool in a group of older Canadians. *Chronic Diseases in Canada* 2001;22(3-4):93-101.
- Centers for Disease Control and Prevention. *Measuring Healthy Days*. Atlanta, Georgia: CDC; 2000. Disponibile all'indirizzo: <http://www.cdc.gov/hrqol/pdfs/mhd.pdf>; ultima consultazione 24/09/2013.
- Helm DT. The measurement of happiness *American Journal on Mental Retardation*. 2000 Sep;105(5):326-35.

Cap. 2 – FATTORI DI RISCHIO, CONDIZIONI DI SALUTE E CURE

- Klavestrand J, Vingard E. The relationship between physical activity and health-related quality of life: a systematic review of current evidence. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports* 2009;19(3):300-312.
- Bize R, Johnson JA, Plotnikoff RC. Physical activity level and health-related quality of life in the general adult population: A systematic review. *Prev Med* 2007;45(6):401-15.
- Washburn RA, McAuley E, Katula J, Mihalko SL, Boileau RA. The physical activity scale for the elderly (PASE): evidence for validity. *Journal of Clinical Epidemiology* 1999;52(7):643-51.
- Hagiwara A, Ito N, Sawai K, Kazuma K. Validity and reliability of the Physical Activity Scale for the Elderly (PASE) in Japanese elderly people. *Geriatrics and Gerontology International* 2008;8(3):143- 51.
- Scafato E. Alcohol and the elderly: the time to act is now!. *European Journal of Public Health* 2010; 20(6):617-618.
- Burns DM. Cigarette smoking among the elderly: disease consequences and the benefits of cessation. *American Journal of Health Promotion* 2000;14(6):357-61.
- World Health Organization. *Report on the global Tobacco epidemic, 2013*. Geneva: WHO; 2013. Disponibile all'indirizzo: http://www.who.int/tobacco/global_report/2013/en/ ; ultima consultazione 24/09/13.
- World Health Organization. Regional Office for Europe. *Action plan for implementation of the European strategy for the prevention and control of non communicable diseases 2012-2016*. Baku, Azerbaijan: WHO; 2011. Disponibile all'indirizzo: http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0003/147729/wd12E_NCDs_111360_revision.pdf ; ultima consultazione 24/09/13.
- Kocur I, Resnikoff S. Visual impairment and blindness in Europe and their prevention. *British Journal of Ophthalmology* 2002;86:716–722.
- Bernabei V, Morinia V, Moretti F et al. Vision and hearing impairments are associated with depressive--anxiety syndrome in Italian elderly. *Aging Mental Health*. 2011;15(4):467-74.
- Jensen PM, Saunders RL, Thierer T, Friedman B. Factors associated with oral health-related quality of life in community-dwelling elderly persons with disabilities. *Journal of the American Geriatrics Society* 2008 56(4):711–7. Disponibile all'indirizzo: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18284537>; ultima consultazione 24/09/13.
- Programma Nazionale Linee Guida. *Linea guida Prevenzione delle cadute da incidente domestico negli anziani*. PNLG, redazione 2007, aggiornamento 2009. Disponibile

all'indirizzo: http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_incidenti_domestici.pdf; ultima consultazione 24/09/13.

- Blazer, D. G. Depression in Late Life: Review and Commentary. *The Journal of Lifelong Learning in Psychiatry* 2009; VII(1):118-136.
- Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW. The Patient Health Questionnaire-2: validity of a two-item depression screener. *Medical Care* 2003; 41:1284-1292.
- Nicholson NR. Social isolation in older adults: an evolutionary concept analysis. *Journal of Advanced Nursing* 2009;65(6):1342-52.
- Sergi G, De Rui M, Sarti S, Manzato E. Polypharmacy in the elderly: can comprehensive geriatric assessment reduce inappropriate medication use? *Drugs Aging* 2011;28:509–518.
- Ministero della Salute. Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014. Disponibile all'indirizzo: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1721_allegato.pdf; ultima consultazione 24/09/13.

Cap. 3 – PARTECIPAZIONE

- World Health Organization. *Active ageing: a policy framework*, Geneva: WHO; 2002. Disponibile all'indirizzo: http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/who_nmh_nph_02.8.pdf; ultima consultazione 31/08/13.
- Futurage. National Consultations Ageing Research Priorities in Europe until 2025 ITALY. Disponibile all'indirizzo <http://futurage.group.shef.ac.uk/assets/files/Consultations%20public/Italy%20national%20consultations%20summary.pdf> ; ultima consultazione 31/08/13.

Cap. 4 – AMBIENTE DI VITA

- Oswald F, Wahl HW. Housing and health in later life. *Rev Environ Health* 2004;19(3-4):223-52.
- van Kamp I, van Loon J, Droomers M, de Hollander A. Residential environment and health: a review of methodological and conceptual issues. *Rev Environ Health* 2004 Jul-Dec;19(3-4):381-401.

Sitografia

SITI NAZIONALI

L'Istituto nazionale di statistica è un ente di ricerca pubblico. Presente nel Paese dal 1926, è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici. Opera in piena autonomia e in continua interazione con il mondo accademico e scientifico

Istituto Nazionale di Statistica ISTAT

- Previsioni della Popolazione Anni 2011-2065. Disponibile all'indirizzo: <http://demo.istat.it/uniprev2011/index.html?lingua=ita>, ultima consultazione 02/10/2013.
- Disabilità in cifre. 2011. Consultato il 31 agosto 2012. Disponibile all'indirizzo: www.disabilitaincifre.it/descrizioni/lista_met.asp?cod_met=2 ; ultima consultazione 02/10/2013.
- Previsioni della popolazione: anni 2007-2051. Popolazione per età. Roma: ISTAT. 1999-2008. Disponibile all'indirizzo: <http://demo.istat.it/uniprev/index.html?lingua=ita>; ultima consultazione 02/10/2013.
- Indicatori socio-sanitari regionali: speranza di vita, speranza di vita in buona salute, speranza di vita libera da disabilità. Roma: ISTAT; 2009. Disponibile all'indirizzo: <http://www.istat.it/sanita/sociosan/>; ultima consultazione 02/10/2013.
- Previsioni della popolazione: anni 2007-2051. Indicatori. Roma: ISTAT. 1999-2008. Disponibile all'indirizzo: <http://demo.istat.it/uniprev/index.html?lingua=ita>; ultima consultazione 02/10/2013.
- La disabilità in Italia. Il quadro della statistica ufficiale. Roma: ISTAT; 2009. Disponibile all'indirizzo: http://www3.istat.it/dati/catalogo/20100513_00/arg_09_37_la_disabilita_in_Italia.pdf; ultima consultazione 02/10/2013.

Ministero della Salute Disponibile all'indirizzo <http://www.salute.gov.it/> ultima consultazione 02/10/2013

In particolare vedere il “Quaderno” del Ministero della Salute sull'appropriatezza dell'assistenza all'anziano che affronta temi complementari a quelli affrontati dal PASSI d'Argento
<http://www.quadernidellasalute.it/archivio-quaderni/6-novembre-dicembre-2010.php>

Guadagnare Salute. Il sito del programma nazionale: comunicazione e formazione secondo una nuova cultura della prevenzione. In particolare si segnala la sezione sorveglianze: Disponibile all'indirizzo <http://www.guadagnaresalute.it/> ultima consultazione 02/10/2013.

PASSI Sorveglianza sullo stato di salute della popolazione adulta italiana: abitudini, stili di vita, percezioni, dall'attività fisica ai vaccini. Disponibile all'indirizzo <http://www.epicentro.iss.it/passi/> ultima consultazione 02/10/2013.

SNLG Valutazione dell'assistenza e dei percorsi diagnostico-terapeutici: linee guida, documenti d'indirizzo e consensus conference. Disponibile all'indirizzo <http://www.snlg-iss.it/> ultima consultazione 02/10/2013.

OKkio alla Salute Sistema di indagini sulle abitudini alimentari e sull'attività fisica dei bambini delle scuole primarie (6-10 anni). Disponibile all'indirizzo <http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/default.asp> ultima consultazione 02/10/2013.

Progetto Cuore: Epidemiologia e prevenzione delle malattie cerebro e cardiovascolari: carte del rischio, indicatori di malattia, fattori di rischio. Disponibile all'indirizzo <http://www.cuore.iss.it/> ultima consultazione 02/10/2013.

BEN Bollettino Epidemiologico Nazionale. Uno strumento di comunicazione per raccontare esperienze locali, ma di interesse generale per la sanità pubblica. Disponibile all'indirizzo <http://www.epicentro.iss.it/ben/> ultima consultazione 02/10/2013

PASSI d'Argento. Salute e qualità della vita nella terza età in Italia: sistema di indagini sugli stili di vita delle persone con 65 anni e più. Disponibile all'indirizzo <http://www.epicentro.iss.it/passi-argento/default.asp> ultima consultazione 02/10/2013

Istituto Superiore di Sanità (ISS) sezione Pubblicazioni Disponibile all'indirizzo www.iss.it ultima consultazione 02/10/2013.

Italia. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
<http://www.lavoro.gov.it/Pages/default.aspx>

La vita buona nella società attiva. Libro verde sul futuro del modello sociale. Roma: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 2008. Disponibile all'indirizzo: <http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B8453482-9DD3-474E-BA13-08D248430849/0/libroverdeDEF25luglio.pdf>; ultima consultazione 02/10/2013.

SITI INTERNAZIONALI

World Health Organization. WHO.

- *Global recommendations on physical activity for health.* Geneva: WHO; 2010. Disponibile all'indirizzo: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_eng.pdf; ultima consultazione 02/10/2013.
- *Active ageing: a policy frame work.* Geneva: WHO; 2002 (WHO/NMH/NPH/02.8). Disponibile all'indirizzo: http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf; ultima consultazione 02/10/2013.
- World Health Organization. 2008-2013 Action plan for the global strategy for the prevention and control of non communicable diseases. Geneva: WHO; 2008. Disponibile all'indirizzo

http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597418_eng.pdf; ultima consultazione 02/10/2013.

- World Health Organization - Regional Office for Europe. Action plan for implementation of the European strategy for the prevention and control of non communicable diseases 2012-2016.
- Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2011. (EUR/RC61/12). Disponibile all'indirizzo:
http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0003/147729/wd12E_NCDs_111360_revision.pdf; ultima consultazione 02/10/2013.
- European Commission Active Ageing Index (AAI). Disponibile all'indirizzo:
<http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home>; ultima consultazione 02/10/2013.

Eurostat. EU integration seen through statistics. Luxembourg: Publications of the European Union; 2006; Disponibile all'indirizzo: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-71-05-691/EN/KS-71-05-691-EN.PDF; ultima consultazione 02/10/2013.

L'Ufficio Statistico dell'Unione Europea (Eurostat) è una Direzione Generale della Commissione Europea; raccoglie ed elabora dati dagli Stati membri dell'Unione Europea a fini statistici, promuovendo il processo di armonizzazione della metodologia statistica tra gli Stati membri.

European Union. European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations. Disponibile all'indirizzo: <http://europa.eu/ey2012/> ultima consultazione 19/07/2013

European Commission: European Innovation Partnership on Active Healthy Ageing
European Innovation Partnership on Active Healthy Ageing. Disponibile all'indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/>; ultima consultazione 02/10/2013.

World Economic Forum (2012). *Global Population Ageing: Peril or Promise?* World Economic Forum: Ginevra. Disponibile all'indirizzo:
<http://www.globalaging.org/agingwatch/World%20Economic%20Forum%20-%20peril%20or%20promise.pdf>; ultima consultazione 02/10/2013.

Global Age Watch Index

Per 91 paesi al mondo è ora disponibile un quadro di indicatori simile all'active ageing index dell'EU/UNECE. Possibile fare dei confronti fra Paesi e distinguere l'andamento per i diversi aspetti che caratterizzano l'active ageing

<http://www.helpage.org/global-agewatch/>

SITI DI APPROFONDIMENTO

Moodle.org è il sito di comunità dove si discute e si realizza Moodle. Si tratta di una applicazione web libera (open source) che i formatori possono utilizzare per creare siti di formazione efficaci. Disponibile all'indirizzo www.moodle.org ultima consultazione 02/10/2013.

CCM Il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm) è un organismo di coordinamento tra il ministero della Salute e le Regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze. Disponibile all'indirizzo <http://www.ccm-network.it/> ultima consultazione 02/10/2013