

Tabella 1: Associazione tra caratteristiche del campione e uso dei diversi ausili per smettere di fumare, tra i rispondenti che hanno tentato di smettere negli ultimi 12 mesi (N=6112).

	Nessun aiuto % * (N)	E-cigarette % * (N)	Altri metodi § % * (N)	p-value
Totale	86.4 (5301)	10.7 (621)	2.9 (190)	
Sesso %				
Maschi	85.9 (2965)	11.7 (374)	2.4 (88)	0.0026
Femmine	87.0 (2336)	9.3 (247)	3.7 (102)	
Età (anni)				
18-34	91.5 (1195)	7.0 (161)	1.5 (38)	<0.001
35-49	82.3 (1776)	14.1 (283)	3.6 (76)	
50-69	85.1 (1530)	10.9 (177)	4.0 (76)	
Istruzione ^				
Alta	85.4 (3168)	11.4 (358)	3.2 (107)	0.213
Bassa	87.6 (2129)	9.6 (263)	2.8 (83)	
Difficoltà economiche ^^				
Nessuna	87.4 (2109)	9.6 (215)	3.0 (70)	0.008
Qualche	87.5 (2179)	9.7 (243)	2.8 (74)	
Molte	82.8 (1003)	14.0 (162)	3.2 (46)	
Area geografica di residenza				
Nord	86.8 (2590)	9.9 (275)	3.3 (94)	0.255
Centro	84.7 (1272)	12.2 (174)	3.1 (50)	
Sud e Isole	87.0 (1439)	10.6 (172)	2.4 (46)	
Cigarette fumate al giorno ^^^				
Fumatore occasionale (< 1 sig/gg)	95.6 (178)	2.3 (5)	2.1 (4)	<0.001
Fumatore (1-19 sig/gg)	88.7 (4181)	8.7 (403)	2.6 (125)	
Forte fumatore (≥20 sig/gg)	76.9 (922)	18.8 (212)	4.3 (61)	

\* percentuali pesate; ^ 4 valori mancanti; ^^ 11 valori mancanti; ^^^ 21 valori mancanti; § farmaci per smettere di fumare; programmi di cessazione dal fumo offerti dalle ASL o altre strutture; altri metodi non specificati.