

Tabella 2: Associazione tra metodi per smettere di fumare e astinenza dal fumo.

Tentativi di smettere negli ultimi 12 mesi (N=6112)			
	Tentativo riuscito	Tentativo fallito	AdjustedPrevalence Ratio (95% IC)
	N (%*)	N (%*)	
Totale	583 (9.4)	5529 (90.6)	
Sesso			
Maschi	320 (9.2)	3107 (90.8)	1 [^]
Femmine	263 (9.7)	2422 (90.3)	1.1 (0.89-1.35)
Età (anni)			
18-34	216 (9.5)	1978 (90.5)	1 [^]
35-49	208 (9.3)	1927 (90.7)	0.99 (0.78-1.26)
50-69	159 (9.5)	1624 (90.5)	1.06 (0.83-1.35)
Istruzione			
Alta	174 (7.1)	2301 (92.9)	1 [^]
Bassa	407 (11.0)	3226 (89.0)	1.64 (1.30-2.06)
Difficoltà economiche			
Molte	95 (8.5)	1116 (91.5)	1 [^]
Qualche	215 (8.4)	2281 (91.6)	0.93 (0.68-1.26)
Nessuna	269 (11.1)	2125 (88.9)	1.13 (0.85-1.52)
rea geografica di residenza			
Sud e Isole	142 (8.4)	1515 (91.6)	1 [^]
Centro	141 (9.3)	1355 (90.7)	1.08 (0.82-1.41)
Nord	300 (10.6)	2659 (89.4)	1.25 (0.99-1.58)
Cigarette fumate al giorno			
Fumatore occasionale (< 1 sig/gg)	16 (8.4)	171 (91.6)	1
Fumatore (1-19 sig/gg)	412 (8.6)	4297 (91.4)	0.85 (0.44-1.62)
Forte fumatore (≥20 sig/gg)	152 (12.6)	1043 (87.4)	1.69 (1.32-2.16)
Metodi per smettere di fumare			
Nessun aiuto	502 (9.4)	4799 (90.6)	1 [^]
E-cigarette	52 (8.2)	569 (91.8)	0.81 (0.58-1.14)
Altri metodi §	29 (14.6)	161 (85.4)	1.42 (0.95-2.13)

* percentuali pesate; [^] categoria di riferimento; § farmaci; farmaci per smettere di fumare; programmi di cessazione dal fumo offerti dalle ASL o altre strutture; altri metodi non specificati.