Esposizione ai rischi del fumo e dell'alcol in gravidanza e durante l'allattamento

Dati PASSI 2014

Fumo di sigaretta

L'esposizione delle donne in gravidanza e dei loro bambini al fumo di sigaretta e all'alcol non è trascurabile in Italia: è quanto emerge dai dati PASSI 2014.

Consumo di alcol

Tra le donne in gravidanza il 16% fuma e il 14% consuma alcol. Tra le donne che allattano il 12% fuma e il 28% consuma alcol.

Popolazione femminile di 18-49 anni residente in Italia.
Dati PASSI 2014.

PASSI è un sistema di sorveglianza sulla salute e i fattori di rischio comportamentali della popolazione adulta Italiana, condotto dalle ASL e coordinato dal Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel 2014, fra le donne in età fertile sono state raccolte anche informazioni inerenti lo stato di gravidanza al momento dell'indagine e l'allattamento per le neomamme (partorienti nei 12 mesi precedenti). Delle 11.503 donne intervistate di età compresa tra i 18 e i 49 anni, il 4% ha dichiarato di aver partorito nei 12 mesi precedenti l'intervista e, fra queste, poco più della metà ha dichiarato di allattare.

Il fumo e il consumo di alcol in gravidanza o durante l'allattamento sono particolarmente dannosi per la salute del nascituro e del bambino

In gravidanza

Il consumo di alcol è controindicato per gli effetti che può avere sul feto: l'alcol nuoce direttamente agli organi in formazione provocando malformazioni e disabilità comportamentali e neuro-cognitive. Il fumo di tabacco espone a rischi sia la madre sia il feto: aumenta il rischio di gravidanza ectopica (extrauterina), rottura prematura delle membrane, distacco intempestivo della placenta, placenta previa, aborto, natimortalità, parto pretermine, basso peso

alla nascita, basso peso per l'età gestazionale e anomalie congenite come la labiopalatoschisi (labbro leporino).

Dopo la nascita, nelle donne che hanno fumato in gravidanza si può riscontrare un aumentato rischio di SID\$ (sindrome della morte improvvisa del lattante).

In allattamento

Il consumo di alcol presenta rischi legati al passaggio nel latte materno e alla riduzione della capacità nella cura del bambino. Il consumo cronico di bevande alcoliche è una delle rare controindicazioni all'allattamento. Vi è la tendenza a sottovalutare i danni dell'alcol e persistono alcune false convinzioni sulla sua presunta capacità di favorire la produzione del latte materno. L'assunzione di 1 o 2 bevande alcoliche, incluse quelle a bassa gradazione, può causare nel bambino

riduzione dell'assunzione di latte (del 20% circa), agitazione e disturbi del sonno.

Inoltre, l'alcol può limitare la secrezione del latte inibendo l'ossitocina che è l'ormone che invece ne favorisce l'emissione.

L'astensione dal fumo è raccomandata non solo in presenza del bambino ma anche negli ambienti frequentati dal bambino.

Poiché non esistono livelli di esposizione al fumo o al consumo di alcol privi di rischi per la salute riproduttiva, è necessario promuovere azioni che riducano al minimo tali esposizioni.

Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute-CCM.

Publicato su *Epidemiologia e Prevenzione* 2016; 40 (1): 76-76; disponibile al link:

www.epiprev.it/rubrica/il-fumo-di-tabacco-e-il-consumo-di-alcol-nelle-donne-gravidanza-e-fra-le-donne-che-allattano