

COMUNICATO STAMPA

Papilloma Virus, la campagna vaccinale



Servizio Sanitario della Toscana

www.usl11.toscana.it

Iniziata la somministrazione del vaccino contro il cancro della cervice uterina nel territorio dell'Asl 11 di Empoli. La campagna vaccinale pubblica gratuita contro il **Papilloma Virus (HPV)** interessa **le bambine nel corso del dodicesimo anno di età, cioè quelle nate nel 1997 e nel 1996**. Le famiglie interessate ricevono una lettera di invito per presentarsi alla vaccinazione contro l'agente virale responsabile del cancro della cervice uterina presso i centri vaccinali distrettuali.

Il vaccino viene somministrato per via intramuscolare in tre dosi: la seconda dose deve essere eseguita un mese dopo la prima, la terza dose cinque mesi dopo la seconda; non sono riportati effetti collaterali di rilievo.

Si tratta di una importante iniziativa di prevenzione, con un grande investimento economico ed organizzativo, i cui frutti si potranno vedere solo tra qualche decennio: l'obiettivo della campagna è, infatti, quello di giungere a una forte riduzione del tumore del collo dell'utero nelle prossime generazioni.

In Italia l'offerta pubblica gratuita della vaccinazione è rivolta alle bambine tra gli undici e i dodici anni di età, perché in questa fascia è massimo il profilo beneficio-rischio. La somministrazione del vaccino prima dell'inizio dei rapporti sessuali è, infatti, particolarmente vantaggiosa perché induce un'efficace protezione prima di un eventuale contagio con il virus HPV, che si acquisisce di norma subito dopo l'inizio dell'attività sessuale, e perché la risposta immunitaria in questa fascia di età è maggiore di quella osservata nelle donne in altre fasce di età. Non è attualmente prevista, pertanto, offerta di vaccinazione in altre età. E' allo studio, comunque, un ulteriore sviluppo della strategia vaccinale per valutare l'allargamento, in futuro, dell'offerta vaccinale anche ad altre fasce di età.

E' opportuno ricordare che il vaccino affianca, ma non sostituisce, lo screening periodico della cervice uterina (pap test), attualmente raccomandato per le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni, perché protegge dalle lesioni causate solo da alcuni HPV oncogeni, responsabili comunque di oltre il 70% dei tumori. Per tutti gli altri genotipi oncogeni l'unica prevenzione resta il pap-test.

Con cortese preghiera di diffusione

Empoli, li 17 Luglio 2008

U.O.C. Comunicazione e Marketing
U.O.S. Ufficio Stampa
Responsabile: Maria Antonietta Cruciani
50053 - Empoli
Via dei Cappuccini, 79
Tel. 0571/702957/54/10
Fax 0571/702972
Cell. 335/1028141
E-mail:
comunicazione@usl11.tos.it