



Dipartimento di Prevenzione
U.O.S.D. Immunoprofilassi e Programmi di
Prevenzione e Promozione della Salute

Via Repubbliche Marinare snc - 00121 Ostia
Tel. 56483052-59 - Fax 06 56483053
e-mail: immunoprofilassi.rmd@aslromad.it
cdc 54050102



Roma,

Oggetto: Vaccinazione anti-papillomavirus umano

AI GENITORI di _____

E' noto che un virus molto comune, il papillomavirus umano, può provocare lesioni che se non individuate e trattate, possono condurre all'insorgenza del tumore del collo dell'utero, una malattia che ancora oggi in Italia colpisce ogni anno migliaia di donne. Fortunatamente questo cancro è altamente prevenibile effettuando un Pap-test ogni tre anni dai 25 ai 64 anni al fine di individuare il tumore in fase precoce.

Oggi, abbiamo uno strumento in più per prevenire questa malattia. Esiste un vaccino preventivo, sicuro ed efficace solo per le donne di età inferiore ai 26 anni, rivolto contro i principali tipi di papillomavirus che causano il tumore. Il vaccino non contiene virus intero e non può quindi in nessun caso causare infezione o malattia.

Il pap test comunque costituirà una forma di protezione indispensabile dopo il compimento del venticinquesimo anno di età anche per le donne vaccinate.

Il vaccino va somministrato in tre dosi: la seconda a 2 mesi dalla prima, la terza a 4 mesi dalla seconda per iniezione intramuscolare alla spalla. Solo raramente può dare qualche effetto collaterale consistente in un leggero rossore nel punto di iniezione e qualche linea di febbre di breve durata.

Il vaccino è efficace solo nelle donne che non abbiano ancora avuto contatto con il virus, dunque la probabilità che una donna ne abbia beneficio diminuisce drasticamente dopo l'inizio dell'attività sessuale.

La Regione mette a disposizione gratuitamente il vaccino per tutte le ragazze al dodicesimo anno di età e cioè, per le bambine nate tra il primo gennaio ed il 31 dicembre 1998.

È un'importante opportunità per proteggere vostra figlia dal rischio delle malattie da papillomavirus, per difenderla dal tumore del collo dell'utero.

La vaccinazione verrà effettuata presso i Centri Vaccinali dell'Azienda Sanitaria Locale. Vi invitiamo quindi a prendere contatto con il Centro Vaccinale di zona; a tal fine si allega il prospetto delle sedi vaccinali e degli orari di accesso per poter praticare la vaccinazione.

Certi dell'attenzione che darete a questa importante iniziativa di prevenzione, porgiamo cordiali saluti,

Il Direttore Dipartimento di Prevenzione

Dr. Claudio Fantini

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Anna Rosalba Buttiglieri