



Ministero della Salute

Progetto «Sistema di sorveglianza sugli otto determinanti di salute del bambino, dal concepimento ai 2 anni di vita, inclusi nel programma GenitoriPiù»

Analisi delle conoscenze degli operatori coinvolti nella sperimentazione della sorveglianza

Roma 13 maggio 2016

Stefano Campostrini – Stefania Porchia



Chi - Perché - Come - Cosa

CHI

- Gli operatori che, a contatto con le famiglie, realizzano la sorveglianza

PERCHE'

- Per rilevare le conoscenze degli operatori responsabili della sorveglianza in quanto “filtri” diretti dell’utenza
- per capire quali aree di conoscenza sono ancora da sostenere negli operatori

COME

- Questionario strutturato autocompilato

COSA

- Stessi determinanti presenti nella sorveglianza

Adesione alla rilevazione

Questionario cartaceo
compilato prima della
formazione

Rilevazione web-based
conclusa la fase di rilevazione

Unità Operativa	prima rilevazione	seconda rilevazione		
	n. risposte	n. questionari inviati	n. risposte	Tasso di risposta
ASL Milano	24	32	30	93,8%
Veneto	25	11	11	100,0%
Campania	21	25	23	92,0%
Puglia	6	22	20	90,9%
Calabria	12	17	16	94,1%
Marche	30	27	21	77,8%
TOTALE	118	134	121	90,3%

Stesso strumento di rilevazione

Profilo degli operatori coinvolti



oltre 80% donne

Circa 85% oltre 45 anni


Soprattutto:

- Infermiere (33%)
- Assistenti sanitarie (25%)
- Medici (20%)



ALLATTAMENTO MATERNO - 1


tempi allattamento esclusivo secondo l'OMS






ALLATTAMENTO MATERNO - 2

A Suo parere, fino a che età è auspicabile che i bambini vengano allattati al seno?




ASSUNZIONE BEVANDE ALCOLICHE IN GRAVIDANZA - 3

A suo parere l'assunzione di alcol in gravidanza - se ci si limita a moderate quantità di alcol è escluso che provochi danni





ASSUNZIONE BEVANDE ALCOLICHE E ALLATTAMENTO

In caso di assunzione occasionale di moderate quantità di alcol è possibile allattare al seno?




FUMO E ALLATTAMENTO

Secondo Lei, se la madre fuma, dovrebbe smettere di allattare al seno?



VACCINAZIONI - 1


I bambini prematuri devono ricevere le vaccinazioni secondo il normale calendario vaccinale





VACCINAZIONI - 2


Infezioni con sintomi lievi come tosse, febbre lieve precludono la somministrazione dei vaccini raccomandati





VACCINAZIONI


Da 1 (per niente d'accordo) a 5 (molto d'accordo) valuti la seguente affermazione: **Vengono fatte troppe vaccinazioni in un'unica soluzione**






VACCINAZIONI

Da 1 (per niente d'accordo) a 5 (molto d'accordo) valuti la seguente affermazione: Seguendo stili di vita sani si possono evitare le malattie senza necessità di vaccinare il bambino




POSIZIONE IN CULLA 1

Mettere a dormire il bambino a pancia in sù protegge dalla SIDS?



POSIZIONE IN CULLA - 2


Mettere a dormire il bambino di fianco protegge dalla SIDS?





LETTURA AD ALTA VOCE


In che periodo i genitori dovrebbero cominciare a leggere ad alta voce ai loro bambini?





CORRETTA ASSUNZIONE ACIDO FOLICO

Conoscenza tempi di assunzione acido folico





IN SINTESI

- Aver partecipato alla sorveglianza ha inciso sulle conoscenze degli operatori di tutte le Unità Operative in relazione ai diversi determinanti
- esistono ancora delle **aree di miglioramento** specialmente per quanto attiene a:
 - mantenere l'allattamento materno anche se la mamma fuma
 - i benefici dell'allattamento prolungato oltre i due anni fcdi vita del bambino
 - l'effetto dell'alcol in gravidanza e in allattamento
- Le **conoscenze più consolidate** sembrano essere:
 - tempo di allattamento esclusivo al seno
 - la posizione a pancia un su come protettiva per prevenire la sids
 - tempi efficaci di assunzione dell'acido folico (non solo quelli corretti)

Aree di attenzione: atteggiamento verso le vaccinazioni