

IL CALENDARIO VACCINALE DELLA REGIONE VENETO

La Regione del Veneto con DGR n. 411 del 26/02/2008 ha approvato un nuovo calendario vaccinale che va a completare e ad integrare il precedente calendario dell'età evolutiva in vigore a partire dal 1° gennaio 2006.

La denominazione "Calendario vaccinale della regione Veneto" sottolinea l'allargamento del numero di vaccinazioni prima comprese in calendario (solo vaccinazioni per l'età evolutiva) ad alcune vaccinazioni per l'adulto: è infatti prevista l'offerta gratuita del vaccino antipneumococco 23valente e della dose di richiamo del vaccino antitetanico ai sessantacinquenni. Inoltre, l'inserimento in Calendario dell'offerta gratuita del vaccino antinfluenzale a tutti gli anziani, risponde alla necessità di ampliare l'adesione a questa importante misura di prevenzione all'inizio di ogni stagione influenzale come da indicazioni della Circolare Ministeriale.

Il nuovo calendario prevede inoltre alcune novità relativamente alle vaccinazioni per i bambini e gli adolescenti. L'utilizzo del preparato tetravalente anti morbillo, parotite, rosolia e varicella consente l'immunizzazione contro le quattro malattie in un'unica somministrazione, con un miglioramento dell'adesione delle famiglie. Continuano comunque i programmi di ricerca attiva e vaccinazione degli adolescenti con anamnesi negativa per varicella al 14°-15° anno di età.

Per quanto riguarda la vaccinazione anti meningococco C coniugato, l'offerta attiva e gratuita interessa tre coorti: oltre alla somministrazione al 13esimo mese e al 15esimo anno, è stata inserita la coorte del sesto anno di vita allo scopo di raggiungere una protezione globale dell'età infantile contro questa grave malattia in un arco di tempo minore.

Come riportato in Calendario il Veneto proporrà a partire dal gennaio 2008 l'offerta attiva e gratuita del vaccino anti-HPV alle dodicenni: la letteratura scientifica internazionale concorda infatti nel ritenere tale coorte di età il target preferenziale della campagna vaccinale in quanto la somministrazione del vaccino prima dell'inizio dell'attività sessuale garantisce una protezione elevata prima di un eventuale contagio con il virus HPV.

Le utenti (sotto i 26 anni) di altre fasce di età che richiedessero il vaccino, possano vaccinarsi presso i Servizi Vaccinali ad un prezzo agevolato secondo quanto previsto dal Tariffario Unico Regionale (DGR n. 412 del 26/02/2008).

Calendario Vaccinale della Regione Veneto (DGR n. 411 del 26/02/2008)

Vaccino	Nascita	offerta attiva e gratuita								offerta gratuita	
		3° mese ¹	5° mese	13° mese	14° mese	15° mese	6° anno	12° anno	15° anno	65 anni	>65 anni
DTP		DTaP	DTaP	DTaP			DTaP		dTap		
Tetano										Tetano ²	
IPV		IPV	IPV	IPV			IPV				
Epatite B	HB ³	HB	HB	HB							
Hib		Hib	Hib	Hib							
MPRV					MPRV		MPRV ⁴				
Varicella⁵									varicella		
PCV⁶		PCV	PCV			PCV					
Men C⁷				Men C			Men C		Men C		
HPV⁸								HPV			
PV 23valente⁹										PV 23valente	
Influenza¹⁰										Influenza	Influenza

Legenda:

DTaP: vaccino antidiftero-tetanico-pertossico acellulare;

IPV: vaccino antipolio inattivato;

Hib: vaccino contro le infezioni invasive da *Haemophilus influenzae b*;

PCV: vaccino antipneumococcico coniugato;
Men C: vaccino antimeningococco C coniugato;
HB: vaccino antiepatite B;
MPRV: vaccino tetravalente antimorbillo-parotite-rosolia-varicella;
dTap: vaccino difterite-tetano-pertosse per adulti;
HPV: vaccino antipapillomavirus
PV 23valente: vaccino antipneumococcico 23valente

Note alla tabella

1. *Per terzo mese di vita si intende il periodo che intercorre dal compimento del 61° giorno di vita fino al 90° giorno di vita, ovvero dal compimento della 8ª settimana di vita fino alla 12ª settimana di vita.*
2. *L'offerta della vaccinazione sarà orientata in via prioritaria ai soggetti con anamnesi negativa per vaccinazione antitetanica (ciclo completo).*
3. *Nei nati da madre HbsAg positiva si somministrano contemporaneamente, entro 12-24 ore dalla nascita ed in siti separati, la prima dose di vaccino (HB) e una dose di immunoglobuline specifiche anti-epatite B (HBIG). Il ciclo vaccinale va completato da una seconda dose a 4 settimane dalla prima, da una terza dose dopo il compimento dell'ottava settimana (può coincidere con la prima somministrazione del ciclo normale) e da una quarta dose all'11 mese (può coincidere con la 3ª dose del ciclo normale).*
4. *la seconda dose della vaccinazione MPRV nel corso del 6° anno di età partirà dall'anno 2011 per la coorte di nascita 2005. Fino al 2010 prosegue come di prassi la somministrazione della seconda dose del vaccino MPR.*
5. *Programmi di ricerca attiva e vaccinazione degli adolescenti con anamnesi negativa per varicella.*
6. *Vaccino pneumococcico coniugato: programmi di ricerca attiva e vaccinazione dei soggetti a rischio elevato; vaccinazione dei nuovi nati come da specifico programma regionale.*
7. *Offerta attiva e gratuita di un'unica dose a tre coorti di età: 13° mese, 6° anno e 15° anno.*
8. *Gruppo target per il 2008: coorte di ragazze nate nel 1996 e nel 1997. La coorte del 1997 potrà essere oggetto di convocazione anche nell'anno successivo. Il ciclo vaccinale prevede 3 dosi (0, 2, 6 mesi).*
9. *Unica somministrazione ai 65enni.*
10. *Offerta gratuita di una dose di vaccino antinfluenzale all'inizio di ogni stagione influenzale secondo le indicazioni specificate annualmente dalla Circolare Ministeriale, con particolare attenzione all'età pediatrica e alle varie categorie a rischio.*

N.B. Si precisa che rimangono valide le indicazioni per l'offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni alle categorie a rischio previste dalle specifiche normative nazionali e regionali.