



Il consumo di ALCOL nella ASL 10 FIRENZE: i dati del sistema di sorveglianza Passi 2007-2010

Indicatori consumo di alcol (ultimi 30 giorni) ASL 10 Firenze	Periodo temporale	
	2007-2010	
- Forti bevitori ¹	12,4%	
- Bevitori fuori pasto	7%	
	2007-2009	2010
- Bevitori <i>binge</i> ^{2,3}	6,5%	10,8%
- Bevitori a rischio ⁴	14,7%	20,9%

¹ chi negli ultimi 30 giorni, ha consumato, anche in una singola occasione, 3 o più unità alcoliche (uomini) e 2 o più unità alcoliche (donne)
² 2007-2009: chi negli ultimi 30 giorni ha consumato almeno una volta in una singola occasione 6 o più unità alcoliche
³ 2010: chi negli ultimi 30 giorni ha consumato almeno una volta in una singola occasione 5 o più unità alcoliche (uomini) e 4 o più unità alcoliche (donne)
⁴ forte bevitore e/o bevitore fuori pasto e/o bevitore *binge*

Consumi di alcol

Nella Asl 10 di Firenze il 65,4% degli intervistati dichiara di essere bevitore, ossia di aver consumato negli ultimi 30 giorni almeno un'unità di bevanda alcolica*.

Nel 2010, il 10,8% degli intervistati della Asl può essere classificabile come bevitore *binge*. Questa percentuale è leggermente più alta rispetto a quella del triennio precedente, 2007-2009, perché nel 2010 i valori che definiscono il consumo *binge* sono variati da "aver consumato negli ultimi 30 giorni almeno una volta in una singola occasione 6 o più unità alcoliche" a "5 o più unità alcoliche per gli uomini e 4 o più per le donne".

Tale incremento si ripercuote anche sulla percentuale di bevitori a rischio del 2010 (20,9%), definiti tali o perché consumatori *binge* o perché forti bevitori o perché bevitori fuori pasto oppure per una combinazione delle tre modalità. Nel 2010, nella Regione Toscana e nel Pool di ASL, le percentuali di bevitori a rischio sono, rispettivamente, del 19,5% e 19%.

L'atteggiamento degli operatori sanitari

Solo una piccola parte degli intervistati (17,5%) riferisce che un operatore sanitario si è informato sui comportamenti in relazione al consumo di alcol.


La percentuale di bevitori che ha ricevuto il consiglio di bere meno da parte di un operatore sanitario è del 3,8%.

Tra i fattori di rischio comportamentali il consumo di alcol rappresenta l'abitudine di cui si ha meno consapevolezza.

Attenzione degli operatori sanitari (ultimi 12 mesi) ASL 10 FI	2007-2010
Persone cui un medico o un operatore sanitario ha chiesto se bevono*	17,5%
Bevitori cui un medico o un operatore sanitario ha suggerito di bere meno**	3,8%

* il denominatore comprende coloro che dichiarano di essere stati da un medico o altro operatore sanitario negli ultimi 12 mesi.

**il denominatore comprende tutti i bevitori, anche quelli a cui un medico o altro operatore sanitario negli ultimi 12 mesi non ha chiesto se bevono




Consumatori a rischio
Pool di Asl, PASSI 2010 (%)

* L'unità alcolica corrisponde a una lattina di birra, un bicchiere di vino o un bicchierino di liquore.

Alcol e guida 2007-2010

Secondo i dati 2007-2010 del sistema di sorveglianza Passi relativi alla Asl 10 di Firenze, tra i bevitori di 18-69 anni che hanno guidato l'auto/moto negli ultimi 12 mesi, il 12,4% dichiara di aver guidato sotto l'effetto dell'alcol, cioè dopo avere bevuto nell'ora precedente almeno due unità alcoliche.

Nel 2010, nella Regione Toscana e nel Pool di Asl, le percentuali di intervistati che hanno guidato sotto effetto dell'alcol sono, rispettivamente, del 9,6% e 10%.



Guida sotto l'effetto dell'alcol tra i bevitori 18-69 anni che hanno guidato l'auto/moto negli ultimi 12 mesi
Pool di Asl, PASSI 2010 (%)

Conclusioni

La maggior parte degli intervistati nella Asl 10 di Firenze dichiara di consumare alcolici (65,4%). Si stima che circa un 15% degli adulti abbia abitudini di consumo considerate a rischio per quantità o modalità di assunzione. I dati mettono in risalto uno scarso l'interesse dei medici e degli altri operatori sanitari rispetto al consumo di alcol dei propri assistiti: solo pochi bevitori (3,8%) riferiscono di aver ricevuto un consiglio di bere meno.

Una minoranza della popolazione (12,4%) continua a mettere a rischio la propria vita e quella degli altri guidando sotto l'effetto dell'alcol. Un terzo degli intervistati nella Asl riferisce di essere stato fermato dalle Forze dell'Ordine, ma i controlli sistematici con l'etilotest, strumento di provata efficacia nella riduzione della mortalità da incidente stradale, non sono ancora molto diffusi nella regione Toscana (13,6%) come pure a livello nazionale (11%).

A cura del coordinamento aziendale PASSI – Dipartimento di Prevenzione ASL 10 Firenze


Che cos'è il sistema di sorveglianza PASSI?

PASSI (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia) è un sistema di sorveglianza della popolazione adulta. L'obiettivo è stimare la frequenza e l'evoluzione dei fattori di rischio per la salute, legati ai comportamenti individuali, oltre alla diffusione delle misure di prevenzione. Tutte le 21 Regioni o Province Autonome hanno aderito al progetto. Un campione di residenti di età compresa tra 18 e 69 anni viene estratto con metodo casuale dagli elenchi delle anagrafi sanitarie. Personale delle Asl, specificamente formato, effettua interviste telefoniche (circa 25 al mese per Asl) con un questionario standardizzato. I dati vengono poi trasmessi in forma anonima via internet e registrati in un archivio unico nazionale. A dicembre 2010, sono state caricate complessivamente oltre 130 mila interviste. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epicentro.iss.it/passi.

Controlli delle Forze dell'Ordine

Il 30,6% degli intervistati riferisce di aver avuto negli ultimi 12 mesi almeno un controllo da parte delle Forze dell'Ordine e in media circa 2 volte.

Nel 2010, nella Regione Toscana e nel Pool di Asl, le percentuali di persone fermate dalle Forze dell'Ordine sono, rispettivamente, del 35% e 34%.



Controllo da parte delle Forze dell'Ordine negli ultimi 12 mesi
Pool di Asl, PASSI 2010 (%)

Nel 2010, nella Regione Toscana e nel Pool di Asl, le percentuali di intervistati sottoposti ad etilotest, tra quelli fermati, sono rispettivamente, del 13,6% e 11%.