



Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia

# Sistema di sorveglianza Passi

## Sicurezza domestica

periodo 2010-2013

### Valle d'Aosta



# Sicurezza domestica

Gli infortuni domestici rappresentano un problema di interesse rilevante per la sanità pubblica, sia dal punto di vista della mortalità e della morbosità, sia per l'impatto psicologico sulla popolazione in quanto la casa è ritenuta generalmente il luogo più sicuro per eccellenza. Al contrario, gli incidenti domestici costituiscono un problema di salute di grandi dimensioni che interessa prevalentemente l'infanzia, il lavoro domestico e l'età avanzata come conseguenza di fattori di rischio specifici, sia intrinseci (relativi alla persona) sia estrinseci (relativi all'ambiente domestico).

PASSI rileva il livello di consapevolezza del rischio di incidente domestico, cioè il primo movente per mettere in atto misure volte alla riduzione dei fattori di rischio ambientali e comportamentali.

A partire dal 2012 PASSI misura inoltre la percentuale di incidenti in casa per cui è stato necessario il ricorso al medico di famiglia, al pronto soccorso o all'ospedale.


## Qual è la percezione del rischio di subire un infortunio domestico?

- In Valle d'Aosta la percezione del rischio infortunistico in ambito domestico appare scarsa: circa il 94% degli intervistati ha dichiarato infatti di considerare questo rischio basso o assente.
- In particolare hanno una più bassa percezione del rischio:
  - gli uomini
  - le persone senza o con poche difficoltà economiche
- La presenza di persone potenzialmente a rischio (bambini e anziani) nel nucleo familiare è invece un fattore che aumenta la percezione del rischio di infortunio domestico.

### Percezione del rischio di infortunio domestico<sup>1</sup>

Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche  
Valle d'Aosta – PASSI 2010-13

**Totale: 6,3%** (IC 95%: 4,9%-7,6%)




<sup>1</sup> Persone che hanno valutato "bassa" o "assente" la possibilità di avere un infortunio domestico nel proprio nucleo familiare

## Consapevolezza del rischio di infortunio domestico

Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2010-13

Totale: 5,9% (IC95%: 5,8%-6,1)



\* In Lombardia non tutte le ASL hanno partecipato alla rilevazione.

## Infortunio in ambiente domestico

Prevalenze per Regione di residenza - Passi 2010-13



- Nel pool di Asl PASSI 2010-13 la percentuale di persone con una corretta percezione del rischio di infortunio domestico è circa del 6%.
- Emergono differenze statisticamente significative nel confronto tra Regioni.

## **Quanti hanno subito un infortunio domestico per il quale sono dovuti ricorrere al medico di famiglia, al pronto soccorso o all'ospedale?**

Nel periodo 2010-13, in Regione, la percentuale di intervistati che, nei 12 mesi precedenti all'intervista, ha riportato un incidente in casa che ha richiesto il ricorso alle cure del medico di famiglia o l'accesso al pronto soccorso o l'ospedalizzazione, è poco meno del 3%. Nel pool di Asl PASSI, nello stesso periodo, questa percentuale è del 3,5%.

## **Conclusioni e raccomandazioni**

Le persone intervistate hanno una bassa consapevolezza del rischio infortunistico in ambiente domestico, anche quando vivono con bambini o anziani o sono esse stesse ultra 64enni: condizioni e situazioni, queste, in cui il rischio tende ad aumentare e in cui bisognerebbe quindi agire in modo preventivo.

Esistono programmi efficaci per la prevenzione delle cadute degli anziani e anche degli infortuni dei bambini e di quelli legati al lavoro domestico. Inoltre le Regioni e le Aziende sanitarie sono impegnate nel Piano nazionale di prevenzione degli incidenti domestici.