

Tabella 3 - Tassi standardizzati aggiustati di ospedalizzazione potenzialmente evitabile per 10.000 abitanti per cinque malattie acute, per Regione. Anni 2020 e 2021

Regioni	Appendicite acuta complicata			
	Osservati 2020	Differenza (osservati-attesi)*	Osservati 2021	Differenza (osservati-attesi)*
Piemonte	2,28	0,07	2,35	0,14
Valle d'Aosta	2,08	-0,98	2,25	-0,81
Lombardia	2,28	0,33	2,22	0,26
Provincia Autonoma di Bolzano	2,26	-0,67	2,21	-0,72
Provincia Autonoma di Trento	2,67	-0,01	4,32	1,64
Veneto	2,17	0,12	2,53	0,48
Friuli Venezia Giulia	1,79	-0,01	2,13	0,33
Liguria	1,30	-0,73	1,76	-0,27
Emilia-Romagna	1,97	-0,46	2,20	-0,23
Toscana	2,93	0,07	2,64	-0,21
Umbria	1,89	-0,45	1,94	-0,39
Marche	2,01	0,02	1,91	-0,08
Lazio	0,99	-0,66	0,94	-0,71
Abruzzo	2,32	0,30	2,77	0,75
Molise	2,94	0,98	2,01	0,04
Campania	1,84	0,41	1,91	0,48
Puglia	2,32	0,43	2,41	0,53
Basilicata	1,71	0,24	2,46	0,99
Calabria	1,89	0,29	1,90	0,31
Sicilia	2,02	0,13	2,33	0,44
Sardegna	2,55	0,28	2,54	0,27
Italia	2,19	0,18	2,29	0,28

Regioni	Ulcera perforata con emorragia			
	Osservati 2020	Differenza (osservati-attesi)*	Osservati 2021	Differenza (osservati-attesi)*
Piemonte	1,32	-0,47	1,56	-0,23
Valle d'Aosta	1,85	-1,49	1,42	-1,92
Lombardia	1,70	-0,09	1,69	-0,10
Provincia Autonoma di Bolzano	2,48	0,14	2,37	0,03
Provincia Autonoma di Trento	1,40	-0,49	1,48	-0,41
Veneto	1,63	-0,27	1,76	-0,14
Friuli Venezia Giulia	1,67	-0,34	1,74	-0,27
Liguria	1,48	-0,93	1,28	-1,13
Emilia-Romagna	2,01	-0,60	1,75	-0,85
Toscana	2,49	0,08	2,13	-0,29
Umbria	1,43	-0,74	1,49	-0,67
Marche	1,33	-0,34	1,13	-0,54
Lazio	0,94	-0,70	0,81	-0,83
Abruzzo	1,35	-0,49	1,00	-0,83
Molise	2,68	0,00	1,76	-0,91
Campania	1,84	0,30	1,49	-0,04
Puglia	2,18	0,44	1,83	0,09
Basilicata	2,52	0,09	2,10	-0,33
Calabria	1,99	0,31	1,26	-0,42
Sicilia	1,18	-0,02	0,93	-0,27
Sardegna	2,00	-0,17	2,13	-0,05
Italia	1,77	-0,10	1,64	-0,22

(*) Differenza tra il tasso standardizzato osservato per 10.000 abitanti e il valore stimato. Il tasso stimato è calcolato con il modello di regressione di Poisson basato sui dati 2017-2019

Segue

Continua

Regioni	Infezioni del tratto urinario			
	Osservati 2020	Differenza (osservati-attesi)*	Osservati 2021	Differenza (osservati-attesi)*
Piemonte	5,03	-0,78	5,02	-0,80
Valle d'Aosta	5,81	-2,04	8,54	0,69
Lombardia	10,74	0,24	12,02	1,53
Provincia Autonoma di Bolzano	14,27	-0,57	14,72	-0,11
Provincia Autonoma di Trento	7,11	-0,65	6,46	-1,30
Veneto	8,33	-0,28	9,40	0,79
Friuli Venezia Giulia	10,34	-0,96	11,23	-0,08
Liguria	4,76	-4,07	5,56	-3,27
Emilia-Romagna	14,34	-2,35	16,12	-0,57
Toscana	6,58	-1,06	7,95	0,31
Umbria	8,40	-4,74	8,94	-4,19
Marche	6,70	-1,39	5,87	-2,23
Lazio	2,78	-2,21	2,94	-2,05
Abruzzo	3,02	-1,85	3,21	-1,66
Molise	2,64	-1,16	2,70	-1,10
Campania	3,45	-0,17	3,50	-0,13
Puglia	4,17	-0,59	3,28	-1,48
Basilicata	2,57	-1,18	2,46	-1,29
Calabria	2,94	-0,51	2,44	-1,01
Sicilia	3,73	-0,52	3,65	-0,60
Sardegna	5,60	-1,60	5,86	-1,33
Italia	7,48	-0,22	7,90	0,20

Regioni	Disturbi idroelettrolitici			
	Osservati 2020	Differenza (osservati-attesi)*	Osservati 2021	Differenza (osservati-attesi)*
Piemonte	1,70	-1,58	1,71	-1,57
Valle d'Aosta	4,33	-0,46	5,19	0,40
Lombardia	1,67	-0,70	1,69	-0,68
Provincia Autonoma di Bolzano	4,27	-3,10	5,38	-1,98
Provincia Autonoma di Trento	0,59	-0,85	0,49	-0,95
Veneto	2,27	-0,88	2,07	-1,07
Friuli Venezia Giulia	3,51	-1,73	2,61	-2,63
Liguria	1,26	-3,67	1,11	-3,82
Emilia-Romagna	2,04	-1,10	1,97	-1,17
Toscana	4,53	-1,04	3,60	-1,96
Umbria	2,10	-2,65	2,48	-2,27
Marche	1,62	-1,78	1,31	-2,08
Lazio	1,25	-1,80	1,17	-1,88
Abruzzo	1,94	-1,58	1,71	-1,81
Molise	1,99	-1,20	2,18	-1,01
Campania	0,93	-0,14	0,83	-0,23
Puglia	2,84	-0,41	2,28	-0,98
Basilicata	3,41	0,28	2,89	-0,23
Calabria	2,73	0,61	1,78	-0,34
Sicilia	2,33	-0,28	2,00	-0,61
Sardegna	9,69	-0,80	7,88	-2,61
Italia	2,51	-0,77	2,25	-1,03

(*) Differenza tra il tasso standardizzato osservato per 10.000 abitanti e il valore stimato. Il tasso stimato è calcolato con il modello di regressione di Poisson basato sui dati 2017-2019

Segue

Continua

Regioni	Malattie infiammatorie delle ovaie e delle tube di Falloppio			
	Osservati 2020	Differenza (osservati-attesi)*	Osservati 2021	Differenza (osservati-attesi)*
Piemonte	1,61	-0,34	1,63	-0,33
Valle d'Aosta	2,26	0,85	1,30	-0,11
Lombardia	1,47	-0,81	1,67	-0,61
Provincia Autonoma di Bolzano	2,15	-0,60	1,44	-1,30
Provincia Autonoma di Trento	1,23	-1,01	1,34	-0,90
Veneto	1,59	-0,47	1,79	-0,26
Friuli Venezia Giulia	1,25	-0,52	1,88	0,12
Liguria	1,60	-0,04	1,52	-0,12
Emilia-Romagna	1,57	-0,96	1,74	-0,79
Toscana	1,10	-0,64	1,91	0,17
Umbria	1,06	-0,75	1,37	-0,44
Marche	1,38	-0,61	1,38	-0,61
Lazio	0,87	-1,25	1,02	-1,10
Abruzzo	2,08	-0,04	2,04	-0,07
Molise	1,89	0,45	1,71	0,26
Campania	1,60	-0,24	1,46	-0,38
Puglia	1,38	-0,41	1,52	-0,27
Basilicata	1,40	-0,16	1,19	-0,38
Calabria	1,15	-0,58	1,33	-0,41
Sicilia	1,65	-0,07	1,35	-0,36
Sardegna	1,70	-0,82	1,70	-0,82
Italia	1,53	-0,50	1,67	-0,36

(*) Differenza tra il tasso standardizzato osservato per 10.000 abitanti e il valore stimato. Il tasso stimato è calcolato con il modello di regressione di Poisson basato sui dati 2017-2019