



**Convegno CNESPS**  
Roma 10 febbraio 2005

# ***LA MEDICALIZZAZIONE DELLA NASCITA***

**Michele Grandolfo**

**Reparto Salute della donna e dell'età evolutiva**

# LA NASCITA

***Una cartina di tornasole:***

**Per la qualità dei servizi socio-sanitari**

**Per i modelli di riferimento**

***Modello sociale di salute o modello biomedico?***

***Approccio in termini di empowerment o disempowerment?***

**Nel 2002 è stata condotta una indagine campionaria sul percorso nascita per valutare lo stato dell'arte dopo il varo del Progetto Obiettivo Materno Infantile (POMI, 2000) e la sua integrazione nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA, 2002)**

**7500 intervistate a un anno di distanza dal parto (rispondenza: 86%) in 59 ASL di 15 Regioni e Province Autonome**

***Quale applicazione delle raccomandazioni del POMI?***

***Con quali esiti?***

**POMI - D.m. 24 aprile 2000 “P.O. materno infantile”. G. U. n.131, 7 giugno 2000**

**L.E.A. - G.U. n.19, 23 gennaio 2002, pag. 37**

**Giudizio di adeguatezza delle informazioni ricevute da parte di chi ha assistito la gravidanza, per figura professionale.**

<i>Figura professionale</i>	<i>Assistite %</i>	<i>Punteggio medio</i>	<i>Puntegg.≥5 %</i>	<i>OR</i>	<i>95% C.I.</i>
<b>Ginecologo privato</b>	<b>27.0</b>	<b>2.96</b>	<b>24.9</b>	<b>1</b>	
<b>Gin.priv. che lavora in ospedale.</b>	<b>47.9</b>	<b>2.66</b>	<b>19.9</b>	<b>0.75</b>	<b>0.66-0.85</b>
<b>Ginecologo pubblico</b>	<b>16.2</b>	<b>2.40</b>	<b>19.0</b>	<b>0.71</b>	<b>0.59-0.84</b>
<b>Ostetrica</b>	<b>2.2</b>	<b>4.20</b>	<b>52.1</b>	<b>3.28</b>	<b>2.38-4.52</b>
<b>Consultorio familiare</b>	<b>5.7</b>	<b>3.33</b>	<b>32.4</b>	<b>1.44</b>	<b>1.15-1.81</b>

(punteggio massimo:7 - numero di argomenti su cui si è chiesto un giudizio di adeguatezza sulle informazioni ricevute)

**Numero medio di ecografie per tipo di gravidanza e per area geografica**

<i>Gravidanza</i>	<i>Nord</i>	<i>Centro</i>	<i>Sud</i>
<b>Fisiologica</b>	<b>4.6</b>	<b>5.2</b>	<b>5.9</b>
<b>Patologica lieve</b>	<b>5.1</b>	<b>5.9</b>	<b>6.5</b>
<b>Patologica grave</b>	<b>6.0</b>	<b>6.2</b>	<b>7.0</b>

(numero di ecografie raccomandate in Italia: 3)

## Partecipazione ai corsi di accompagnamento alla nascita per area geografica e sede del corso

<i>Area geografica</i>	<i>Partecipazione</i>		<i>Sede del corso</i>		
	<i>N</i>	<i>%</i>	<i>Ospedale</i>	<i>CF</i>	<i>Privato</i>
<b>Nord</b>	<b>593</b>	<b>37.7</b>	<b>42.3</b>	<b>49.9</b>	<b>7.8</b>
<b>Centro</b>	<b>1399</b>	<b>39.2</b>	<b>36.5</b>	<b>57.7</b>	<b>5.8</b>
<b>Sud</b>	<b>274</b>	<b>12.0</b>	<b>17.2</b>	<b>69.7</b>	<b>13.1</b>

*Le donne meno istruite hanno minore opportunità di frequentare i corsi*


**Giudizio di adeguatezza complessivo per le attività e le informazioni, per sede del corso di accompagnamento alla nascita**

<i>Sede del corso</i>	<i>N</i>	<i>%</i>	<i>Punteggio medio</i>	<i>Puntegg.≥7 %</i>	<i>OR</i>	<i>95% C.I.</i>
Ospedale	809	35.7	5.9	39.8	1	
CF	1294	57.1	6.8	57.5	2.05	1.71-2.45
Privato	163	7.2	6.1	42.9	1.14	0.81-1.60

(punteggio massimo: 10)

**Il POMI assegna ai CF il compito di offrire attivamente i corsi**

Percentuale di parti con TC



## Fattori associati al parto con TC

**Età ≥ 30 anni (OR=1.62)**

**Pluripara senza TC preced. (OR=0.27)**

**Pluripara con TC preced. (OR=11.61)**

**Gravidanza patologica (OR=1.76)**

**Assist. pren. gin. pubbl. (OR=0.78)**

**Assist. pren. CF (OR=0.56)**

**Partecipazione corsi accomp. nascita att. o prec. grav. (OR=0.83)**

**Parto in struttura conv. o privata (OR=1.79)**

**Età gest. ≤ 36 sett. (OR=2.09)**

**Peso alla nascita < 2500 g (OR=3.28)**


**≥ 4000 g (OR=1.66)**

**Gemellarità (OR=3.46)**

**Residenza Centro (OR=1.29)**



**Sud (OR=1.80)**

# Risultati ➔ Le donne preferiscono il parto spontaneo



Percentuale di donne con preferenza per il parto spontaneo a seconda della modalità del parto

# Risultati → “Timing” dell’attaccamento al seno poco soddisfacente; % allattamento esclusivo non soddisfacente



## Fattori associati all’attaccamento al seno oltre 2 ore dal parto

**Casalinga (OR=1.20)**

**Pluripara (OR=0.88)**

**Assistenza prenatale pubblica (OR=0.84)**

**Partec. corsi accomp. nascita**

**attuale o prec. grav. (OR=0.84)**

**Parto TC an. epidurale (OR=2.12)**

**TC an. generale (OR=4.30)**

**Età gest. ≤ 36 sett (OR=1.97)**

**Peso nascita < 2500 g (OR=1.76)**

**Gemellarità (OR=1.73)**

**Rooming in (OR=0.46)**

**Inform. non adeg. allattamento (OR=1.52)**


**Preferenza TC (OR=1.25)**

**Residenza Centro (OR=1.89)**


**Sud (OR=2.88)**

# Risultati ➔ Persistenza allattamento completo a tre mesi non soddisfacente

## Allattamento completo a 3° mese



## Percentuale di bambini ricoverati in ospedale nel 1° anno di vita



### Fattori associati all'allattamento completo oltre 3 mesi

**Età ≥ 30 anni (OR=1.25)**

**Istruzione ≥ media superiore (OR=1.23)**

**Parto TC (OR=0.81)**

**Punteggio 1-2 (OR=1.34)**

**Punteggio 3-4 (OR=1.55)**

**Punteggio 5-6 (OR=2.56)**

**Residenza al Centro (OR=0.80)**

**al Sud (OR=0.73)**

### Fattori associati a ricovero in ospedale del/la bambino/a nel primo anno di vita

**Istruzione ≥ media superiore (OR=0.79)**

**Pluripara (OR=1.25)**

**Età gest. ≤ 36 sett. (OR=1.41)**

**Peso alla nascita < 2500 g (OR=1.97)**

**Allatt. al seno > 5 mesi (OR=0.75)**

# Conclusioni

- ➔ **Eccesso di esposizione a pratiche non raccomandate sulla base delle evidenze scientifiche (medicalizzazione)**
- ➔ **Scarsa attività di informazione e counselling (migliore in corsi di accompagnamento alla nascita)**
- ➔ **Scarso sostegno dell'allattamento materno**

**L'applicazione delle raccomandazioni del POMI  
(con particolare riferimento alla valorizzazione dei consultori familiari)  
determina migliori risultati ed esiti**

- ➔ ***Necessità di un sistema di sorveglianza attiva e indagini di approfondimento sul percorso nascita***
- ➔ ***Necessità di messa a punto, implementazione, monitoraggio e valutazione di progetti prototipali secondo le indicazioni del POMI***