



*Ministero del Lavoro della Salute
e delle Politiche Sociali*



Altre informazioni relative al monitoraggio della legge 3/2003 e la loro integrazione con i dati PASSI

Lorenzo Spizzichino



Guadagnare salute:

*i progressi
delle aziende sanitarie
per la salute in Italia*

Napoli, 25 Settembre 2009

Salute in tutte le politiche





Strategia per il controllo del tabagismo

Sorveglianza su:

- **Prevalenza**
- **Supporto all'applicazione della legge**
- **Disassuefazione dal fumo**
- **Vendite dei prodotti del tabacco**
- **Effetti sullo stato di salute**



Sistema di Sorveglianza

Strumento base per le strategie di salute pubblica



Strumento per l'”advocacy”


**(inteso come appoggio istituzionale, legislativo, politico
alle azioni che migliorano la salute dei cittadini)**



INFORMAZIONE PER AGIRE




Prevalenza dei fumatori



Le Regioni con la prevalenza più alta sono la Campania (23,8%) e il Lazio (23,3%) quelle con la prevalenza più bassa sono la Valle d'Aosta (17,5%) e la Liguria (20,2%).

Le Regioni con la riduzione più marcata tra il 2003 e il 2008 sono la Valle d'Aosta (-17,7%) e la Sardegna (-16,2%) hanno invece aumentato la prevalenza la Puglia (+5,9%), la Calabria (+5,4%), la Basilicata (+2,7%) e l'Abruzzo (+0,3%)


Prevalenza dei fumatori secondo le indagini DOXA condotte tra il 1957 ed il 2009



I fumatori sono aumentati di 2 milioni rispetto all'anno scorso




Confronto - tutti




- Diverse popolazioni prese in esame
- Diversi metodi di indagine
- Diverse definizioni
- stessi andamenti temporali?
- Convergenza?

Prevalenza nei giovani




Le Regioni con la prevalenza più alta sono il Trentino AA (28,8%) la Sardegna e l'Umbria (24,8%) quelle con la prevalenza più bassa sono Calabria (15,5%) e Campania (17,2%).

Confronto - giovani




- Diverse popolazioni prese in esame
- Diversi metodi di indagine
- Diverse definizioni
- stessi andamenti temporali?
- Convergenza?

Confronto - adulti



- Diverse popolazioni prese in esame
- Diversi metodi di indagine
- Diverse definizioni

-Convergenza?
- Stessi andamenti temporali?



—◆— ISTAT (45-64) —■— PASSI (45-64) —▲— ISS/DOXA (45-64)

Sorveglianza dei giovani: i prossimi passi



Global Youth Tobacco Survey


- **Questionario auto compilato di circa 60 domande a studenti di 13-15 anni su informazioni, comportamenti e atteggiamenti relativi al consumo di prodotti del tabacco**
- **Rappresentatività solo nazionale (per ora)**

Supporto all'applicazione della legge


A partire dal 2005 il Ministero della Salute/CCM e i NAS hanno pianificato ed effettuato oltre 14mila controlli in tutta Italia

La legge sembra essere rispettata anche se le multe sono pressoché raddoppiate tra il 2005 e il 2009

Fines



% of fines total and to smokers




Supporto all'applicazione della legge

% delle multe per inosservanza della legge

Multe totali (2007-2009)


Italia = 7,7%



Range: 1,9% Abruzzo – 19,5% Toscana

Multe ai fumatori (2007-2009)

Italia = 2,8%




Range: 0% FVG e VdA – 10% Toscana





Progetto nazionale condotto dalla regione Veneto controllo sui posti di lavoro privati e pubblici

Regioni coinvolte	10	9
ASL coinvolte	33	13
N° di Uffici controllati	863	308
N° di stanze controllate	3,828	2,431



Opinione del responsabile alla sicurezza



Vendita dei prodotti del tabacco 2004 -2008


- 6.9% → - 6,850 ton → - 342 milioni di pacchetti

Sales (Tons)	2004	2005	2006	2007	2008	diff2008/ 2004	2009*
Cigarettes	98.846,4	92.822,3	93.807,4	92.821,3	91.978,8	-6,9%	89.461,1
RYO	658,6	777,2	855,6	1.014,1	1.247,4	+89,4%	1.492,8
Cigars	667,7	645,2	694,3	743,3	765,2	+14,7%	757,9
Cigarillos	424,2	429,8	479,3	512,6	539,9	+27,3%	590,3
Snuff	12,2	11,4	11,7	12,1	13,1	+7%	13,6
Total	100.609,1	94.685,9	95.848,4	95.103,4	94.545,1	-6%	92.315,7

* La Proiezione per le vendite 2009 sembra produrre un calo di altri 110 milioni di pacchetti di sigarette

Vendita dei prodotti del tabacco 2004 -2009*


Cigarette sales 2004-2009*



Nel periodo 2004—2008 le vendite delle sigarette sono calate e la stima costruita sui dati dei primi 7 mesi del 2009 mostrano un calo ancora più accentuato


Viceversa gli altri prodotti del tabacco sono in aumento con l'esplosione delle sigarette fai da tè (meno costose) anche se rappresentano solamente l'1,5% di tutte le vendite di tabacco

Other Tobacco products sales 2004-2009*



Vendita delle sigarette 2005 -2008

Sembra esserci un gradiente nord-sud nelle vendite delle sigarette negli ultimi 4 anni, anche se vanno presi in considerazione alcuni aspetti legati alle vendite transfrontaliere o illegali



Disassuefazione dal fumo

VARIABLES		ODDS RATIO	95% CI	
			Inf.	Sup.
SEX	Male	1		
	Female	1,39	1,25	1,54
AGE	14-29	1		
	30-44	0,90	0,71	1,14
	45-59	1,06	0,87	1,30
	60 +	1,36	1,05	1,75
EDUCATION	Low	1		
	High	1,23	1,10	1,36
DAILY CIGARETTES CONSUMPTION	20 +	1		
	10 - 19	0,58	0,51	0,66
	0 - 9	0,55	0,48	0,64
	Occasionally	0,93	0,79	1,10
YEARS OF SMOKING	15 +	1		
	10-14	1,43	1,18	1,73
	5 - 9	1,66	1,31	2,10
	0 - 4	2,58	2,00	3,33
SERIOUS CHRONIC DISEASES	no	1		
	yes	1,13	0,97	1,33
ECONOMICAL STATUS	Insufficient/scarce	1		
	Adequate/Very good	1,38	1,24	1,53
METHOD	Alone	1		
	More methods	0,18	0,04	0,84
	Helped by MD	2,25	1,61	3,16
	Support Group	1,31	0,77	2,26
	Pharmacological aid	0,41	0,29	0,58
	therapies	1,52	0,99	2,32

Disassuefazione dal fumo


Vendita dei prodotti per smettere di fumare

Il Bupropione e la Vareniclina sono dei farmaci a tutti gli effetti e necessitano di una ricetta per essere acquistati, attualmente sono a carico del paziente

I sostitutivi della nicotina (cerotti, gomme, caramelle e spray) sono invece considerati farmaci da banco

Products (units)	2004	2005	2006	2007	2008*	Variation
Bupropion + varenicline	12.649	9.399	7.409	5.937 + 47.307	106.788 +103.704	+744%
Nicotine patches	237.900	635.276	335.241	184.233	178.250	-25%
Nicotine tablet	19.446	32.165	37.716	34.014	41.042	+111%
Nicotine gum and candy	433.601	532.969	416.159	468.001	438.665	+1%
Nicotine inhaler	49.201	51.126	41.334	39.730	37.260	-24%
Total	752.797	1.260.935	837.859	636.269	905.709	+20%

Andamento mensile della vendita dei prodotti sostitutivi della nicotina




L'andamento delle vendite sembra essere altamente condizionato dalle campagne pubblicitarie in occasione dell'immissione sul mercato di nuovi prodotti

Disassuefazione dal fumo


Servizi Territoriali per la Cessazione dal Fumo di Tabacco: distribuzione regionale

Aggiornamento 2008



*Centri di ospedali, ASL

**Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)




Pizzi E A, Di Pucchio A, Rossi S, Carosi G, Martucci L, Mattioli D, Mazzola M, Mastrobattista L, Di Givoannandrea R, Solimini R, Pacifici R, Zuccaro P, Guida ai servizi territoriali per la cessazione dal fumo di tabacco (aggiornamento 2008). Roma. Istituto Superiore di Sanità; 2009. (Strumenti di Riferimento 09/S1).

Effetti della legge sullo stato di salute

Fumo e infarto acuto del miocardio


Dati provenienti dall'archivio SDO del Ministero elaborati da diversi ricercatori

Decrease (%) of admissions one year after the ban



La legge sembra aver avuto un effetto immediato sulla riduzione dei ricoveri

Tasso di ricovero per infarto dopo il divieto confrontato con il periodo precedente la legge. Risultati aggiustati per trend e stagionalità (2002-2006)



Conclusioni

- La legge Sirchia è la prima (e unica) legge in Italia monitorata nella sua applicazione sin dal primo momento della sua entrata in vigore
- L'approccio Integrato utilizza più fonti prodotte da diversi soggetti, istituzionali e non.

La legge ha funzionato per:

- Tutelare i non fumatori (ma bisogna continuare con i controlli)
- Ridurre la prevalenza (ma non tra i giovani e poco tra le donne)

C'è bisogno di:

- Sorvegliare (per agire su) i comportamenti dei giovanissimi
- proporre e sostenere programmi per la cessazione basati sulle evidenze raccolte

Grazie per l'attenzione!



l.spizzichino@sanita.it



Programmi di prevenzione nelle scuole

Progetti selezionati come “best practices”

- **Alla conquista del Pass per la città del sole, una città senza fumo (5 anni)**
 - **Club dei vincenti. Un piano speciale contro il fumo (9-10 anni) scuole elementari**
 - **Liberi di scegliere (11-12 years)**
 - **Smoke Free Class Competition (15-16 anni) scuole superiori**
-

Prevenzione e advocacy



***Training on anti-tobacco
counselling for Midwives
Mamme libere dal fumo***

genit  ri più
Prendiamoci più cura della loro vita

Campagna di educazione per i genitori

Non Fumare!

Ministero/CCM – Veneto e altre Regioni – LILT

Prevenzione e Advocacy Campagne educative 2009

taac



“Il fumo Uccide, difenditi!”



Law activity

- **Ratification of the WHO-FCTC (Law 18.3.2008)**
 - **Participation in the Third Conference of the Parties (Durban 2008)**
 - **Participation in the process of review of the Directive 2001/37/CE (new health warnings and pictorial warnings)**
-



Le iniziative che, secondo i giovani, lo Stato dovrebbe attuare per convincerli a non iniziare a fumare

	<i>Valori %</i>
▪ Educazione nelle scuole	33,4%
▪ Rendere più difficile l'accesso / più controlli sulle vendite ai minori	32,7%
▪ Aumenti di prezzo	28,0%
▪ Ci dovrebbero pensare i genitori / le famiglie	17,7%
▪ Eliminare i distributori automatici	15,7%
▪ Vietare la vendita di sigarette/eliminare le sigarette	7,4%
▪ Fare campagne pubblicitarie antifumo	4,2%
▪ Far pagare multe ai fumatori	0,8%
▪ Creare diversivi/impegnare i giovani con altre attività	0,3%
▪ Altre iniziative	1,2%
▪ Non vede risoluzione al problema del tabagismo	0,8%
▪ Non sa / non indica	10,4%

Misure preventive che lo Stato potrebbe attuare per ridurre il fenomeno del fumo ed aiutare i fumatori a smettere di fumare

MOLTO + ABBASTANZA utile ed efficace

