



Guadagnare salute:

*i progressi*  
delle aziende sanitarie  
*per la salute in Italia*

# Alcol e sicurezza stradale: I risultati del sistema PASSI

Pirous Fateh-Moghadam

Valentina Minardi

per il Gruppo Tecnico Nazionale PASSI

# Il contesto


- Il consumo di alcol è associato a
  - numerose malattie
  - incidenti
    - stradali
    - sul lavoro
    - domestici
  - violenza



# L'alcol è il 3° fattore di rischio

## di malattia, disabilità e morte prematura in Europa

proporzione di Daly attribuibile a 7 fattori di rischio  
nella Regione europea dell'Oms (2000)



# La soglia di rischio

- I livelli di consumo considerati modesti e non pericolosi sono in continuo ribasso
  - più di 2 unità per gli uomini
  - più di 1 una unità per le donne
- Tumore alla mammella → rischio aumenta anche per quantità minime

Allen N et al. Moderate Alcohol Intake and Cancer Incidence in Women. J Natl Cancer Inst 2009;101:296–305



# Obiettivo di sanità pubblica

- non è l'astinenza ma
- la riduzione delle quantità di alcol consumate e
- l'eliminazione del consumo in determinate situazioni o condizioni
  - guida
  - lavoro
  - gravidanza
  - età minorile
  - ecc.



# Dati PASSI 2008


Pool di ASL (n=37.560)



# Consumo di alcol

## Pool PASSI – 2008


- Consuma alcol (59%)






# Bevitori ad alto rischio. Per classe di età

## Pool PASSI – 2008




# Bevitori ad alto rischio. Per sesso

## Pool PASSI – 2008



# Bevitori ad alto rischio. Per istruzione

## Pool PASSI – 2008



# Caratteristiche dei bevitori ad alto rischio

Pool PASSI – 2008

- I bevitori a rischio sono più spesso:
  - Giovani
  - Di sesso maschile
  - Di istruzione elevata
- Confermato da analisi multivariata



# Chiesto dal medico sul consumo alcolico

## Pool PASSI – 2008

- Nel pool di Asl partecipanti al sistema solo il 16% degli intervistati ha riferito che un medico o un altro operatore sanitario si è informato sul consumo di alcol
- Poco più del 6% dei bevitori a rischio ha riferito di aver ricevuto da un medico o un altro operatore sanitario il consiglio di bere meno



# Guida sotto l'effetto dell'alcol


Pool PASSI – 2008

- Il 12% degli intervistati ha dichiarato di aver guidato dopo aver bevuto almeno due unità alcoliche nell'ora precedente
- L'abitudine a guidare sotto effetto dell'alcol è più frequente tra gli uomini e nella fascia di età 18-34 anni

# Quante persone sono state controllate dalle Forze dell'ordine?

## Pool modulo opzionale (n=5.200)


- Tra le Regioni che hanno approfondito il problema degli incidenti stradali il 41% degli intervistati che sono andati in auto/moto negli ultimi 12 mesi dichiara di aver subito un controllo (da guidatore o da passeggero)



# Quante persone hanno effettuato l'etilotest?

Pool modulo opzionale (n=5.200)

- Solo il 9% dei fermati riferisce che il guidatore è stato sottoposto anche all'etilotest
  - Il 20% dei 18-24
  - Il 2% dei 50-69



# Conclusioni 1/2

- Circa due terzi consumano abitualmente alcolici
- Circa un quinto può essere considerato un bevitore ad alto rischio
  - L'alto rischio è legato al sesso maschile e alla giovane età
- Ancora scarso il livello di attenzione e i consigli di bere meno da parte di medici ed operatori sanitari
  - Occorrono sensibilizzazione e formazione sul tema



## Conclusioni 2/2

- I controlli sistematici con etilotest risultano ancora poco diffusi e sembrano indirizzati maggiormente verso i giovani
  - ampio margine di miglioramento
  - maggiore diffusione di pratiche di prevenzione e contrasto già avviate nel nostro Paese



Sandro BALDISSERA, Nancy BINKIN, Barbara DE MEI, Gabriele FONTANA,  
Valentina MINARDI, Alberto PERRA, Valentina POSSENTI, Stefania SALMASO

Nicoletta BERTOZZI

Stefano CAMPOSTRINI

Giuliano CARROZZI

Paolo D'ARGENIO, Stefania VASSELLI

Angelo D'ARGENZIO

Pirous FATEH-MOGHADAM

Giada MINELLI

Massimo O. TRINITO

Eva BENELLI, Stefano MENNA

