

Obiect: Invitație la vaccinarea împotriva VIRUSULUI PAPILLOMA (HPV) pentru prevenirea carcinomului cervical uterin.

Dragi părinți,

V-am rezervat o programare pentru a-i oferi fiicei dumneavoastră vaccinarea împotriva virusului uman Papilloma (HPV)

Programarea pentru administrarea _____doze de vaccin este fixată pentru data _____la orele_____ la centrul de vaccinare aflat în _____

În caz de imposibilitate în această dată, și/sau pentru informații ulterioare, vă rugăm să telefonați la n. _____

Minora trebuie să fie însoțită de unul din părinți. În cazul în care părintele nu poate fi prezent, va putea împuternici în scris un înlocuitor. În împuternicirea, semnată de părinte, va fi necesară indicarea numelui și prenumelui persoanei care însoțește minora. Este necesară de asemenea copia documentului de identitate a părintelui. Vă amintim să aduceți carnetul de vaccinare.

Dacă fiica dumneavoastră a efectuat deja vaccinarea în alt sediu, vă invităm să ne comunicați data vaccinării pentru înregistrarea în fișa personală.

Cu această ocazie vă semnalăm unele informații care privesc sănătatea fiicei dumneavoastră, în așa fel încât vaccinarea să fie un gest conștient.

Cancerul de col uterin, în Italia lovește în fiecare an mii de femei, și este cauzat de un virus foarte comun, virusul uman papilloma (HPV).

Tulpinile 16 și 18 ale acestui virus (cele mai întâlnite și periculoase), sunt de fapt în grad de a provoca leziuni care, dacă nu sunt individualizate și tratate, pot provoca în timp, infecția responsabilă de carcinomul colului uterin

Astăzi, împotriva virusului uman papilloma, care se transmite, de obicei, imediat după începerea activității sexuale, nu există nici o cură; vaccinarea reprezintă așadar o armă eficientă pentru prevenirea infecției. De aceea Regiunea Toscana, prin intermediul Serviciului Sanitar Regional, oferă tuturor adolescentelor care au reședința în Toscana, cu vârsta de unsprezece ani împliniți, posibilitatea de **a se vaccina gratuit**.

Vaccinarea este deosebit de avantajoasă deoarece:

- Garantează o protecție eficientă înainte de un contagiu eventual cu virusul HPV, care se dobândește de obicei imediat după începerea activității sexuale, care variază în funcție de principiile de comportament care inspiră viața persoanelor.
- Răspunsul sistemului imunitar, la doisprezece ani e mai mare decât acela observat la fetele și femeile cu alte vârste.

Să așteptați „câțiva ani” pentru că „fiica mea este încă mică” poate fi o greșală pentru că s-ar pierde o oportunitate excelentă de a răspunde foarte bine vaccinării, și de a fi protejați în mod sigur înainte de orice posibilitate de contagiu.

Înainte de introducerea vaccinării împotriva HPV, screeningul periodic (Pap Test) era unicul instrument la dispoziție pentru prevenire care a permis individualizarea precoce ale

leziunilor cauzate de virusul Papilloma (HPV). Astăzi, combinația **vaccinare și pap-test** reprezintă modalitatea cea mai eficientă și completă pentru prevenirea cancerului de col uterin.

Este important să precizăm că vaccinarea însoțește dar nu înlocuiește screening-ul periodic (Pap Test) recomandat la momentul actual, la fiecare 3 ani, femeilor cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 ani.

Vaccinul este sigur. Eventuale efecte colaterale ușoare care se pot manifesta în urma vaccinării (umflătură și roșeață în locul injecției, stare generală rea sau uneori febră ușoară) dispar în mod spontan fără nici o consecință în câteva zile.

Vaccinarea trebuie amânată în caz de boli febrile în fază acută.

Contraindicațiile pentru folosirea vaccinului sunt sarcina și reacțiile alergice grave la medicamente și/sau componente ale vaccinului (excipiente), de comunicat personalului sanitar.

Pentru informații vă puteți adresa medicului pediatru sau medicului de familie, sau centrului de vaccinare sau Igienă Publică al Regiei USL.

Alte informații sunt disponibile pe site-urile internet acreditate:

<http://www.regione.toscana.it/iointantomivaccino>