



ItOSS  
Italian Obstetric Surveillance System




# ECLAMPSIA

Studio osservazionale, prospettico *population-based*  
in 9 Regioni (75% dei nati in Italia) - anni 2018-2020

Stima del tasso di incidenza: 0,15/1000 parti  
(109/716.222)


Indice di buona qualità della assistenza prenatale in Italia

## Fattori di rischio



**Nel 41% dei casi nessun segno o sintomo prima dell'attacco eclamptico**

## Timing attacco eclamptico



## Terapia

- MgSO<sub>4</sub> + antipertensivi
- Appropriata stabilizzazione prima del parto

## Esiti

Morbosità materna	33%
Mortalità materna	0,9%
Parto pretermine	46%
Mortalità perinatale	2,6%

**Evitare intervallo troppo breve tra attacco eclamptico e parto; si raccomanda di stabilizzare appropriatamente la paziente prima del parto per ridurre la morbosità materna**

Dossier ItOSS sui disordini ipertensivi della gravidanza disponibile al link [www.epicentro.iss.it/itoss/pdf/Dossier-ipertensione-gravidanza-2016.pdf](http://www.epicentro.iss.it/itoss/pdf/Dossier-ipertensione-gravidanza-2016.pdf)

Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute-CCM (2016)