


# OKkio alla SALUTE

## Risultati dell'indagine 2019

### ASL TO5



OKkio alla SALUTE è un sistema di sorveglianza nazionale istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità  
(DPCM del 3 marzo 2017, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 maggio 2017)

**A cura di:**

Margherita Gulino (Direttore S.C. IAN), Carmela Di Mari (Dirigente medico S.C. IAN), Alice Schialva (Dietista S.C.IAN), Monica Minutolo (Dietista S.C.IAN), Angela Dimartino (Dirigente medico S.C.IAN)

**Hanno contribuito alla realizzazione della raccolta dati 2019**

**- il gruppo di coordinamento nazionale:**

Angela Spinelli, Paola Nardone, Marta Buoncristiano, Michele Antonio Salvatore, Mauro Bucciarelli, Silvia Andreozzi, Ferdinando Timperi, Daniela Galeone, Maria Teresa Menzano, Alessandro Vienna.

**- il comitato tecnico della sorveglianza:**

Marta Buoncristiano, Giulia Cairella, Marcello Caputo, Margherita Caroli, Chiara Cattaneo, Laura Censi, Liliana Coppola, Simona De Introna, Barbara De Mei, Maria Paola Ferro, Daniela Galeone, Mariano Giacchi, Giordano Giostra, Marina La Rocca, Laura Lauria, Gianfranco Mazzarella, Maria Teresa, Menzano, Paola Nardone, Federica Pascali, Anna Rita Silvestri, Daniela Pierannunzio, Michele Antonio Salvatore, Angela Spinelli, Alessandro Vienna.

**-a livello regionale:**

Marcello Caputo (referente regionale); Gianfranco Corgiat Loia (Dirigente settore regionale); Monica Bonifetto, Paolo Ferrari, Leonardo Filippone (Dirigente Ufficio IV USR per il Piemonte e referente regionale), Paola Damiani / Daniela Pinna (referenti USR).

**- a livello provinciale:**

Bruna Balossino (referente alla salute dell'ufficio scolastico di Alessandria), Martina Gado (referente alla salute dell'ufficio scolastico provinciale di Asti), Monica Pisu (referente alla salute dell'ufficio scolastico provinciale di Biella), Marcello Strizzi (referente alla salute dell'ufficio scolastico provinciale di Cuneo), Gabriella Colla (referente alla salute dell'ufficio scolastico provinciale di Novara), Anna Maria Capra, Sara Coccolo (referente alla salute dell'ufficio scolastico provinciale di Torino), Angelo Iaderosa (referente alla salute dell'ufficio scolastico provinciale di Verbano-Cusio-Ossola), Laura Musazzo (referente alla salute dell'ufficio scolastico provinciale di Vercelli)

**- Referenti e operatori a livello aziendale:**

Margherita Gulino (referente), Carmela Di Mari, Angela Dimartino, Monica Minutolo, Alice Schialva, Anna Aldrighetti, Ilaria De Luca, Marina Mortara

Un ringraziamento particolare ai dirigenti scolastici e agli insegnanti: il loro contributo è stato determinante per la buona riuscita della raccolta dei dati qui presentati.

Un ringraziamento alle famiglie e agli alunni che hanno preso parte all'iniziativa, permettendo così di comprendere meglio la situazione dei bambini della nostra Regione.

**Copia del volume può essere richiesta a:**

Monica Minutolo  
Via San Francesco D'Assisi, 35- 10042 Nichelino (TO)  
nutrizione@aslto5.piemonte.it

**Sito internet di riferimento per lo studio:**

[www.epicentro.iss.it/okkioallasalute](http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute)

# Indice

---

<b>Indice</b> .....	4
<b>Prefazione</b> .....	5
<b>Introduzione</b> .....	6
<b>Metodologia</b> .....	8
<b>Descrizione della popolazione</b> .....	10
<b>Lo stato ponderale</b> .....	13
<b>Le abitudini alimentari</b> .....	20
<b>L'attività fisica</b> .....	26
<b>Le attività sedentarie</b> .....	32
<b>La percezione delle madri sulla situazione nutrizionale e sull'attività fisica dei bambini</b> .....	35
<b>L'ambiente scolastico e il suo ruolo nella promozione di una sana alimentazione e dell'attività fisica</b> .....	39
<b>Conclusioni generali</b> .....	51
<b>Bibliografia essenziale</b> .....	53

## Prefazione

---

Tra i Paesi della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la percentuale di bambini obesi continua ad essere alta con picchi di obesità grave e l'Italia rimane uno dei Paesi con il più alto tasso di obesità infantile.

Considerato che, è ormai scientificamente riconosciuto come l'obesità infantile rappresenti un fattore predittivo per la persistenza di obesità in età adulta con conseguente aumento dei rischi per la salute, quali l'instaurarsi di patologie cronic-degenerative correlate a cattive abitudini alimentari e di vita, è fondamentale intervenire attraverso la prevenzione.

Il progetto di sorveglianza nutrizionale OKkio alla Salute, giunto oramai alla sesta edizione, continua a rappresentare un eccellente modello di collaborazione tra sistema sanitario, sistema educativo e scolastico, famiglie e responsabili delle politiche locali.

OKkio alla SALUTE descrive la variabilità geografica e l'evoluzione nel tempo dello stato ponderale, degli stili alimentari, dell'abitudine all'esercizio fisico dei bambini della III classe primaria, al fine di poter costruire interventi preventivi sempre più puntuali, efficienti ed efficaci.

Rispetto alla rilevazione del 2016, nella nostra ASL si assiste ad un lieve incremento della prevalenza dei bambini in sovrappeso ed obesi, infatti, il dato, dopo una flessione registrata tra il 2012 ed il 2016, ha registrato una nuova crescita.

Solo l'8% dei bambini assume 5 porzioni di frutta e verdura giornalmente; questo dato è superiore al valore nazionale e leggermente inferiore a quello regionale, rispettivamente del 6% e del 9%. Circa 1 bambino su 5 consuma bevande zuccherate e succhi di frutta quasi tutti i giorni ed assume bibite zuccherate almeno 1 volta al giorno, dato comunque inferiore rispetto ai dati regionali e nazionali. Solo 3 bambini su 5 fanno una colazione adeguata ed una merenda leggera a metà mattina.

Riguardo all'attività fisica, migliora rispetto alla precedente rilevazione la percentuale dei "Bambini fisicamente non attivi" passando dal 19% del 2016 al 12% nel 2019. Tale dato si pone al di sotto sia della media regionale (14,0%) sia di quella nazionale (20,3%).

E' plausibile ipotizzare che l'emergenza pandemica da Sars-Cov-2 abbia influenzato i comportamenti alimentari e lo svolgimento di attività fisica dei nostri bambini, con possibili ripercussioni sul loro stato ponderale. Pertanto, in attesa dei prossimi dati, è indispensabile continuare ad implementare tutti gli interventi messi in campo dalla nostra ASL.

Il miglioramento degli stili di vita è alla portata di ogni singolo cittadino e su questo occorre concentrare gli sforzi del Dipartimento di Prevenzione dell' ASL e di tutti gli attori coinvolti a vario titolo.

**Il Direttore**  
**S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione**  
**Dott. ssa Margherita GULINO**

**Il Direttore Sanitario**  
**Dott. Giovanni MESSORI IOLI**

## Introduzione

---

Il sovrappeso e l'obesità sono un fattore di rischio per l'insorgenza di patologie cronico-degenerative e una sfida prioritaria per la sanità pubblica. In particolare, l'eccesso ponderale in giovane età ha implicazioni a breve e a lungo termine sulla salute e rappresentano un fattore di rischio per lo sviluppo di patologie in età adulta.

Per comprendere la dimensione del fenomeno nei bambini e i comportamenti associati, a partire dal 2007, il Ministero della Salute/CCM ha promosso e finanziato lo sviluppo del sistema di sorveglianza OKkio alla SALUTE, coordinato dal Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità e condotto in collaborazione con le Regioni e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La sorveglianza è alla base delle strategie italiane in materia di prevenzione e promozione della salute quali il Programma Governativo "Guadagnare salute" e il Piano Nazionale della Prevenzione e, in ambito internazionale, aderisce alla "Childhood Obesity Surveillance Initiative" (COSI) della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (<http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-revention/nutrition/activities/monitoring-and-surveillance/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi>).

Da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM del 3 marzo 2017, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 maggio 2017), OKkio alla SALUTE è ufficialmente inserito tra i sistemi e i registri di rilevanza nazionale ed è istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità. OKkio alla SALUTE descrive la variabilità geografica e l'evoluzione nel tempo dello stato ponderale, degli stili alimentari, dell'abitudine all'esercizio fisico dei bambini della III classe primaria e delle attività scolastiche che possono favorire la sana nutrizione e il movimento.

Ad oggi, a livello nazionale, sono state effettuate sei raccolte dati (2008-9, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019) ognuna delle quali ha coinvolto oltre 40.000 bambini e genitori e 2.000 scuole.

In particolare, nel 2019 hanno partecipato 2.735 classi, 47.543 bambini e 50.502 genitori, distribuiti in tutte le regioni italiane.

I bambini in sovrappeso sono il 20,4% [IC95% 19,9-20,9] e i bambini obesi sono il 9,4% [IC95% 9,0-9,7], compresi i bambini gravemente obesi che da soli sono il 2,4% [IC95% 2,3-2,6]. Persistono tra i bambini le abitudini alimentari scorrette: infatti, l'8,7% dei bambini salta la prima colazione e il 35,6% fa una colazione non adeguata (ossia sbilanciata in termini di carboidrati e proteine); il 55,3% fa una merenda di metà mattina abbondante; il 24,4% dei genitori dichiara che i propri figli non consumano quotidianamente frutta e/o verdura e il 25,4% dichiara che i propri figli consumano quotidianamente bevande zuccherate e/o gassate. I valori dell'inattività fisica e dei comportamenti sedentari permangono elevati: il 20,3% dei bambini non ha fatto attività fisica il giorno precedente l'indagine, il 43,5% ha la TV in camera, il 44,5% guarda la TV e/o gioca con i videogiochi/tablet/cellulare per più di 2 ore al giorno e solo un bambino su 4 si reca a scuola a piedi o in bicicletta. Dati simili a quelli osservati nelle precedenti rilevazioni confermano l'errata percezione dei genitori dello stato ponderale e dell'attività motoria dei propri figli: tra le madri di bambini in sovrappeso o obesi, il 40,3% ritiene che il proprio figlio sia sotto-normopeso.

Inoltre, grazie alla partecipazione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, è stato possibile raccogliere informazioni sulla struttura degli impianti, sui programmi didattici e sulle iniziative di promozione della sana nutrizione e dell'attività fisica degli alunni in 2.477 plessi di scuole primarie italiane. I principali risultati evidenziano che il 75% delle scuole possiede una mensa; il 43% prevede la distribuzione per la merenda di metà mattina di alimenti salutari (frutta,

yogurt, ecc.). Inoltre, 1 scuola su 3 ha coinvolto i genitori in iniziative favorevoli a una sana alimentazione e in quelle riguardanti l'attività motoria.

Nel report vengono presentati i risultati della raccolta dati effettuata nel 2019 e riportati gli indicatori presenti nel Piano Nazionale della Prevenzione.

## Metodologia

---

OKkio alla SALUTE è una sorveglianza di popolazione basata su indagini epidemiologiche ripetute, a cadenza regolare, su campioni rappresentativi della popolazione in studio.

Pertanto, è orientata alla raccolta di poche informazioni, principalmente su fattori di rischio modificabili, mediante l'utilizzo di strumenti e procedure semplici, accettabili da operatori e cittadini e sostenibili dai sistemi di salute.

### Popolazione in studio

---

È stata scelta la classe terza della scuola primaria, con bambini intorno agli 8 anni, perché l'accrescimento a quest'età è ancora poco influenzato dalla pubertà, i bambini sono già in grado di rispondere con attendibilità ad alcune semplici domande e i dati sono comparabili con quelli raccolti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in vari altri Paesi europei.

Le scuole rappresentano l'ambiente ideale per la sorveglianza: i bambini sono facilmente raggiungibili sia per la raccolta dei dati che per gli interventi di promozione della salute che seguiranno la sorveglianza.

### Modalità di campionamento

---

Il metodo di campionamento è "a grappolo", cioè le classi ("grappoli" o "cluster") sono estratte casualmente dalle liste di campionamento predisposte dagli Uffici Scolastici su base regionale o di ASL e tutti i bambini della classe sono inclusi. Per ciascuna scuola la probabilità di veder estratte le proprie classi è proporzionale al numero degli alunni iscritti (metodo della *probability proportional to size*).

La numerosità campionaria è stata individuata per ogni regione, ASL o macroarea sulla base della popolazione di bambini di classe terza primaria residenti, sulla prevalenza dell'eccesso ponderale riscontrato nella precedente raccolta dei dati e al *design effect*, con una precisione della stima del 3% per la regione e del 5% per la ASL.

### Strumenti e procedure di raccolta dati

---

Nel 2008 è stata sviluppata la prima versione dei 4 questionari di OKkio alla SALUTE. Negli anni successivi alcune domande del questionario sono state cambiate e sono stati aggiunti ulteriori quesiti a seguito di richieste del Ministero della Salute, del Comitato Tecnico della Sorveglianza e della Childhood Obesity Surveillance Initiative dell'OMS Europa (COSI). Nel 2019 sono state introdotte alcune domande riguardanti la percezione dell'ambiente (in particolare l'inquinamento dell'aria) e l'inclusione dell'educazione ambientale tra le attività scolastiche; sono stati inoltre modificati alcuni quesiti sulla base delle indicazioni del COSI. I quattro questionari sono: uno da somministrare ai bambini in aula, uno per i genitori da compilare a casa e due destinati rispettivamente agli insegnanti e ai dirigenti scolastici.

Il questionario per i bambini comprende semplici domande riferite a un periodo di tempo limitato (dal pomeriggio della giornata precedente alla mattina della rilevazione). I bambini hanno risposto al questionario in aula, individualmente e per iscritto, e gli operatori si sono resi disponibili per chiarire eventuali dubbi.

Inoltre, i bambini sono stati misurati (peso e statura) da operatori locali addestrati utilizzando bilancia e stadiometri standardizzati e di elevata precisione. In caso di esplicito rifiuto dei



genitori, il questionario non è stato somministrato e i bambini non sono stati misurati. Non è stata prevista alcuna forma di recupero dei dati riguardanti i bambini assenti, né di sostituzione dei bambini con rifiuto.

Per stimare la prevalenza di sovrappeso e obesità è stato utilizzato l'Indice di Massa Corporea (IMC o BMI in inglese), ottenuto come rapporto tra il peso espresso in chilogrammi al netto della tara dei vestiti e il quadrato dell'altezza espressa in metri. Per la definizione del sottopeso, normopeso, sovrappeso, obeso e gravemente obeso si sono utilizzati i valori soglia per l'IMC desunti da Cole et al., come consigliato dalla International Obesity Task Force (IOTF); nel report nazionale sarà possibile visionare le prevalenze dello stato ponderale utilizzando anche le curve OMS. Nell'analisi dei dati sono stati considerati sottopeso i bambini con un valore di IMC uguale o inferiore a 17 in età adulta ed è stato possibile, inoltre, calcolare la quota di bambini gravemente obesi, ovvero con un valore di IMC in età adulta pari o superiore a 35 (Cole et al., 2012).

Le domande rivolte ai genitori hanno indagato alcune abitudini dei propri figli quali: l'attività fisica, i comportamenti sedentari, gli alimenti consumati, la percezione dello stato nutrizionale e del livello di attività motoria.

Alcuni dati sulle caratteristiche dell'ambiente scolastico, in grado di influire favorevolmente sulla salute dei bambini, sono stati raccolti attraverso i due questionari destinati ai dirigenti scolastici e agli insegnanti. La collaborazione intensa e positiva tra operatori sanitari e istituzioni scolastiche ha permesso un ampio coinvolgimento dei bambini e dei loro genitori contribuendo alla buona riuscita dell'iniziativa.

In particolare, la disponibilità e l'efficienza degli insegnanti ha consentito di raggiungere un livello di adesione delle famiglie molto alto.

La raccolta dei dati è avvenuta in tutte le regioni tra marzo e giugno 2019.

L'inserimento dei dati è stato effettuato dagli stessi operatori sanitari che hanno realizzato la raccolta delle informazioni, mediante una piattaforma web sviluppata ad hoc.

## Analisi dei dati

---

L'analisi dei dati è stata finalizzata, principalmente, alla stima delle prevalenze delle variabili rilevate. Per alcune di queste, in particolare per quelle che sono soggette a confronti temporali successivi o con altre realtà territoriali (Regioni o ASL), sono stati calcolati anche gli intervalli di confidenza al 95%. In qualche caso, al fine di identificare differenze sono stati calcolati dei rapporti di prevalenza e realizzati dei test statistici. Nel presente rapporto, dove opportuno, viene indicato se le differenze osservate tra le 6 rilevazioni sono o non sono statisticamente significative. Data la ridotta numerosità del campione aziendale, rispetto a quello nazionale o regionale, e di conseguenza intervalli di confidenza generalmente più ampi, è necessaria la massima cautela nell'interpretare e commentare i confronti negli anni dei dati al fine di evitare conclusioni errate. Questa annotazione vale in particolar modo per i risultati relativi all'ambiente scolastico, in cui il campione è di circa 20-30 scuole per ASL.

Le analisi sono state effettuate usando il software Stata vers.14.2.

## Descrizione della popolazione

Quante scuole e quante classi sono state coinvolte nell'indagine?

Nel 2019, nella Asl TO5, hanno partecipato all'indagine il 100% delle scuole e il 100% delle classi sui 22 plessi scolastici e sulle 23 classi rispettivamente campionate.

**Distribuzione delle classi per tipologia di comune di appartenenza  
ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019 (N=23 classi)**


ZONA ABITATIVA	N	%
≤ 10.000 abitanti	-	-
Da 10.000 a più di 50.000 abitanti	-	-
> 50.000 abitanti (non metropolitana)	-	-
Comuni di area metropolitana (centro e periferia)	23	100

- Le scuole e le classi partecipanti si trovano in comuni di area metropolitana (centro e periferia).
- Per la classificazione della tipologia dei comuni si è seguito il sistema adottato dall'Istat.

Partecipazione dei bambini e delle famiglie allo studio

La percentuale di bambini/famiglie che ha partecipato all'indagine è un importante indicatore di processo. Una percentuale alta, oltre a garantire la rappresentatività del campione, sottolinea l'efficacia delle fasi preparatorie dell'indagine. Una risposta bassa a causa non solo di un alto numero di rifiuti ma anche di assenti, superiore al 5-10% (percentuale di assenti attesa in una normale giornata di scuola), potrebbe far sospettare una scelta delle famiglie dettata per esempio dalla necessità di "proteggere" i bambini in eccesso ponderale. In questo caso, il campione di bambini delle classi selezionate potrebbe non essere sufficientemente rappresentativo dell'insieme di tutte le classi della Regione, in quanto la prevalenza di obesità riscontrata nei bambini misurati potrebbe essere significativamente diversa da quella degli assenti.

Bambini coinvolti: quanti i partecipanti, i rifiuti e gli assenti?



- Solo il 3,6% dei genitori ha rifiutato la misurazione dei propri figli. Questo valore è risultato inferiore a quello nazionale (circa 5%). Questo dato sottolinea una buona gestione della comunicazione tra ASL, scuola e genitori.
- Nella giornata della misurazione erano assenti 25 bambini pari al 5,2% del totale di quelli iscritti. La bassa percentuale di assenti tra i consensi rassicura, al pari del favorevole dato sui rifiuti, sull’attiva partecipazione dei bambini e dei genitori.
- I bambini ai quali è stato possibile somministrare il questionario e di cui sono stati rilevati peso e statura sono stati quindi 438 ovvero il 91,4% degli iscritti negli elenchi delle classi.
- Hanno risposto al questionario dei genitori 456 delle famiglie dei 479 bambini iscritti (95,2%).

### Bambini partecipanti: quali le loro caratteristiche? \_\_\_\_\_

Le soglie utilizzate per classificare lo stato ponderale variano in rapporto al sesso e all’età dei bambini considerati; pertanto, è necessario tener conto della loro distribuzione.

#### Età e sesso dei bambini – ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019

ETÀ	N	%	SESSO	N	%
<7 anni	-	-	Maschi	229	52,4
8 anni	242	55,6	Femmine	208	47,6
9 anni	187	43,0			
≥ 10	6	1,4			

- La proporzione di maschi e di femmine nel nostro campione è simile.
- Al momento della rilevazione, la grande maggioranza dei bambini che ha partecipato allo studio aveva fra 8 e 9 anni, con una media di 8 anni e 9 mesi di vita.

### Genitori partecipanti: chi sono e cosa fanno? \_\_\_\_\_

La scolarità dei genitori, usata come indicatore socioeconomico della famiglia, è associata in molti studi allo stato di salute del bambino. Il questionario è stato compilato più spesso dalla madre del bambino (87,1%), meno frequentemente dal padre (12,9%). Di seguito vengono riportate le caratteristiche di entrambi i genitori dei bambini coinvolti; i capitoli successivi nella maggior parte dei casi presenteranno analisi che tengono conto del livello di istruzione solo della madre che di fatto è la persona che ha risposto più frequentemente al questionario rivolto ai genitori.

- La maggior parte delle madri ha un titolo di scuola superiore (48,2%) o laurea (31,2%).
- I padri che hanno un titolo di scuola superiore sono il 45,6% e la laurea il 20,7%.
- L' 11,9% delle madri e il 14,7% dei padri sono di nazionalità straniera.
- Il 50,3% delle madri lavora a tempo pieno.

Con il reddito a disposizione della famiglia, il 36,8% dei rispondenti dichiara di arrivare a fine mese con qualche difficoltà e il 7,1% dichiara di arrivarci con molte difficoltà.

**Livello di istruzione, occupazione e nazionalità della madre e del padre**  
**ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**

CARATTERISTICHE	MADRE		PADRE	
	N	%	N	%
<b>Grado di istruzione</b>				
Nessuna, elementare, media	92	20,6	146	33,6
Diploma superiore	215	48,2	198	45,6
Laurea	139	31,2	90	20,7
<b>Nazionalità</b>				
Italiana	386	88,1	382	85,3
Straniera	52	11,9	66	14,7
<b>Lavoro*</b>				
Tempo pieno	193	50,3	-	-
Part time	124	32,3	-	-
Nessuno	67	17,4	-	-

\* Informazione raccolta solo sulla persona che compila il questionario; essendo la madre colei che lo compila nella grande maggioranza dei casi, il dato non è calcolabile per il padre.


## Lo stato ponderale

L'obesità ed il sovrappeso in età evolutiva possono favorire lo sviluppo di gravi patologie quali le malattie cardio-cerebro-vascolari, diabete tipo 2 ed alcuni tumori. Negli ultimi 30 anni la prevalenza dell'obesità nei bambini è drasticamente aumentata e, sebbene da qualche anno in alcuni Paesi si assiste ad una fase di plateau, i valori sono ancora molto elevati.

### Quanti sono i bambini in sovrappeso o obesi?


L'indice di massa corporea (IMC) è un indicatore indiretto dello stato di adiposità, semplice da misurare e comunemente utilizzato negli studi epidemiologici per valutare l'eccedenza ponderale (il rischio di sovrappeso e obesità) di popolazioni o gruppi di individui. Per la determinazione di sottopeso, normopeso, sovrappeso, obeso e gravemente obeso, sono stati utilizzati i valori soglia proposti da Cole et al. e raccomandati dall'IOTF.

**Stato ponderale nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3<sup>a</sup> primaria nel territorio dell'ASL TO5 (%)-ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**



- Tra i bambini della nostra Asl l'1,4% (IC95% 0,6%-3%) risulta in condizioni di obesità grave, il 5,8% risulta obeso (IC95% 4%-8%), il 19,2% sovrappeso (IC95% 15,6%-23,3%), il 71% normopeso (IC95% 66,3%-75,3%) e il 2,6% sottopeso (IC95% 1,2%-5,4%).
- Complessivamente il 26,4% dei bambini, ovvero 1 bambino su 4, presenta un eccesso ponderale che comprende sia sovrappeso che obesità.


**Sovrappeso e obesità per Regione (%) nei bambini di 8-9 anni che frequentano la 3<sup>a</sup> primaria. OKkio alla SALUTE 2019**



- Il dato relativo al sovrappeso dei bambini della nostra Asl, risulta leggermente superiore alla media della regione Piemonte, con il 19,2% di bambini in condizione di sovrappeso (contro il dato medio regionale del 18,5%) ma comunque inferiore alla media nazionale (20,4%), mentre il dato sull'obesità, ovvero il 7,2% dei bambini è in media con quello regionale ed inferiore al dato nazionale (9,4%).

## Qual è l'andamento del sovrappeso e obesità negli anni? \_\_\_\_\_

**Trend sovrappeso e obesità - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**



- Rispetto alle precedenti rilevazioni nella nostra Asl si assiste ad un lieve incremento della prevalenza di bambini in sovrappeso e obesi.
- Il dato, dopo una flessione registrata tra il 2012 e il 2016, ha infatti registrato una nuova crescita nel corso dell'ultima rilevazione.

## Qual è il rapporto tra stato ponderale e caratteristiche del bambino e dei genitori? \_\_\_\_\_


In alcuni studi, il sesso del bambino, la zona geografica di abitazione, il livello di scolarità e lo stato ponderale dei genitori sono associati alla situazione di sovrappeso o obesità del bambino.

**Stato ponderale dei bambini di 8 e 9 anni per caratteristiche demografiche del bambino e della madre (%) – ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**

CARATTERISTICHE	NORMO/SOTTOPESO	SOVRAPPESO/OBESO
<b>Età</b>		
8 anni	73,9	26,1
9 anni	73,3	26,7
<b>Sesso</b>		
Maschi	72,9	27,1
Femmine	74,4	25,6
<b>Zona abitativa</b>		
<10.000 abitanti	-	-
10.000-50.000	-	-
>50.000	-	-
metropolitana/perimetropolitana	73,6	26,4
<b>Istruzione della madre</b>		
Nessuna, elementare, media	70,0	30,0
Superiore	71,6	28,4
Laurea	82,4	17,6

- Nella ASL TO5, le prevalenze di obesità e di sovrappeso sono simili tra i bambini di 8 e 9 anni con una lieve prevalenza nel sesso maschile.
- Il rischio di obesità diminuisce con il crescere della scolarità della madre, da 8,8% per titolo di scuola elementare o media, a 7,4% per diploma di scuola superiore, a 3,9% per la laurea.

**Stato ponderale dei bambini rispetto a quello dei genitori - ASL TO5, OKkio alla SALUTE**



- Dai dati autoriferiti dai genitori emerge che, nella nostra Asl, il 20,6% delle madri è in sovrappeso e il 7,1% è obeso; i padri, invece, sono nel 39,6% sovrappeso e 10,2% obesi.
- Quando almeno uno dei due genitori è in sovrappeso il 16,5% dei bambini risulta in sovrappeso e il 6% obeso. Quando almeno un genitore è obeso il 28,6% dei bambini è in sovrappeso e il 14,3% obeso.

*Nei giorni di scuola quante ore dormono i bambini?* \_\_\_\_\_

In alcuni studi si è osservato che le ore di sonno del bambino sono associate al suo stato ponderale. Diverse fonti e istituzioni internazionali raccomandano che i bambini in età scolare dormano almeno 9-10 ore al giorno. Per tale motivo, nel questionario rivolto al genitore viene posta la domanda per stimare le ore di sonno dei bambini nei giorni di scuola, ovvero non considerando i giorni festivi che possono rappresentare un'eccezione alle normali abitudini.

**Ore di sonno dei bambini - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**

ORE E MINUTI	Sotto-normopeso	Sovrappeso-obeso
	%	%
< 9 ORE	76,1	23,9
9 ore – 9 ore e 29 minuti	70,1	29,9
9 ore e 30 minuti – 9 ore e 59 minuti	73,3	26,7
≥10 ore	77,7	22,3



- All'interno del nostro campione, l'11% dei bambini dorme meno di 9 ore; dato inferiore alla media nazionale pari al 13%.
- Il nostro campione non evidenzia una correlazione significativa tra ore di sonno e stato ponderale del bambino.


### Le caratteristiche del parto e nei primi mesi di vita possono influenzare lo stato ponderale?

Tra i fattori che vengono indicati in letteratura come potenzialmente associati allo stato ponderale del bambino ve ne sono alcuni che riguardano il parto e i primi mesi di vita. Per tale motivo dal 2016, nel questionario rivolto ai genitori, sono state inserite alcune domande per rilevare, con riferimento al proprio bambino, il tipo di parto, la settimana gestazionale, il peso alla nascita e il tipo di allattamento. Nella tabella seguente sono riportati i risultati della nostra Asl per le caratteristiche sopra indicate in confronto con quelli rilevati a livello nazionale.


Dati relativi al parto e ai primi mesi di vita del bambino - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019

CARATTERISTICA ALLA NASCITA	MODALITÀ	VALORE AZIENDALE 2019	VALORE NAZIONALE 2019
Tipo di parto	Taglio Cesareo	32,3%	40,1%
Settimana gestazionale	<37	9,0%	14,5%
Peso alla nascita (in grammi)	< 2500	8,4%	7,6%
	2500-3300	48,1%	48,1%
	3300-4000	36,6%	37,4%
	≥4000	6,9%	6,9%
Allattamento al seno	Mai/<1 mese	26,5%	24,1%
	1-6 mesi	22,1%	33,8%
	>6 mesi	51,5%	42,2%

Stato ponderale dei bambini per tipologia del parto - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019



**Stato ponderale dei bambini per durata allattamento al seno - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**



- Sia il tipo di parto che l'allattamento al seno appaiono associati con lo stato ponderale del bambino.
- Inoltre, tra i bambini con peso alla nascita inferiore ai 2.500 gr, il 20,6% è risultato sovrappeso e il 5,9% obeso, mentre tra i bambini con peso alla nascita  $\geq 4.000$  gr, i valori sono risultati rispettivamente 32,1% e 10,7%. Tra i bambini nati a  $\leq 37$  settimane, le percentuali di sovrappeso e obesi sono maggiori rispetto ai bambini nati dopo questo periodo.

**Per un confronto - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**

	Valori aziendali (%)						VALORE REGIONALE 2019 (%)	VALORE NAZIONALE 2019 (%)
	2008	2010	2012	2014	2016	2019		
Prevalenza di bambini sotto-normopeso	73,0	69,0	74,0	76,0	76,0	74,0	74,5	70,0
Prevalenza di bambini sovrappeso	20,0	22,0	18,0	17,0	17,0	19,0	18,5	20,0
§Prevalenza di bambini obesi**	8,0	9,0	8,0	7,0	6,0	7,0	9,4	9,0
§Prevalenza di bambini sovrappeso e obesi**	28,0	31,0	26,0	24,0	24,0	26,4	29,8	30,0

§ Variabili per le quali è stato effettuato un confronto tra le rilevazioni svolte a livello regionale. La variazione statisticamente significativa ( $p < 0,05$ ) è indicata con \*\*

## Conclusioni

---

In questa sesta rilevazione si sono riscontrati dei cambiamenti anche se non particolarmente rilevanti. Permane, in ogni caso, il problema dell'eccesso di peso nella popolazione infantile.

I risultati del presente rapporto accrescono ulteriormente la reale e giustificata preoccupazione sul futuro stato di salute della nostra popolazione.

Un'ampia letteratura scientifica conferma inconfutabilmente il rischio che il sovrappeso, e in misura sensibilmente maggiore l'obesità, già presenti in età pediatrica ed adolescenziale persistano in età adulta. Inoltre, i primi mesi di vita del bambino e il tipo/modalità di allattamento al seno possono risultare fattori predittivi del futuro stato di salute del bambino, soprattutto per quanto riguarda lo stato ponderale.

Per cogliere segni di cambiamento del fenomeno e per misurare gli effetti legati agli interventi di popolazione è necessario mantenere una sorveglianza continua del fenomeno nella nostra popolazione infantile.


## Le abitudini alimentari

Una dieta qualitativamente equilibrata, in termini di bilancio fra grassi, proteine e glucidi, e la sua giusta distribuzione nell'arco della giornata, contribuisce a produrre e/o a mantenere un corretto stato nutrizionale. Alcuni indicatori alimentari presenti in questo capitolo hanno subito nel 2019 modifiche parziali nelle modalità di risposta al fine di renderli confrontabili con quelli degli altri Paesi che aderiscono al COSI.

### I bambini consumano la prima colazione? (le risposte dei bambini)

Diversi studi dimostrano l'associazione tra l'abitudine a non consumare la prima colazione e l'insorgenza di sovrappeso. In accordo con quanto indicato dall'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (CREA-NUT), è stata considerata adeguata la prima colazione che fornisce un apporto sia di carboidrati che di proteine (per esempio: latte e cereali o succo di frutta e yogurt).

**Adeguatezza della colazione consumata dai bambini (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**



- Da quanto riportato dai bambini sulla colazione effettuata il giorno della rilevazione, nella nostra Asl solo il 56,3% dei bambini fa una colazione qualitativamente adeguata.
- Il 7,8% non fa colazione (più nelle bambine rispetto ai bambini, 8,7% versus 7%) e il 35,9% non la fa qualitativamente adeguata.
- La prevalenza del non fare colazione è più alta nei bambini di madri con titolo di studio diploma superiore, mentre la percentuale di chi fa una colazione adeguata aumenta con l'aumentare del titolo di studio della madre.

Il COSI, rispetto al nostro Paese, monitora l'abitudine dei bambini di consumare la prima colazione attraverso le sole risposte fornite dai genitori. Nel 2019, il Comitato Tecnico di OKkio alla SALUTE ha deciso di aggiungere all'informazione del bambino anche quella del genitore ma riferita ad un arco temporale più ampio, ovvero "una settimana tipica".

**Frequenza della colazione in una settimana tipica (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**


FREQUENZA	%
Ogni giorno	72,5
Quasi tutti i giorni della settimana (4-6 giorni)	12,7
Qualche giorno a settimana (1-3 giorni)	10,0
Mai	4,7

Le differenze che si osservano tra quanto riferito dai bambini e dai genitori possono essere dovute al differente riferimento temporale (la mattina dell'indagine per i bambini e la settimana tipica per i genitori).

*I nostri bambini, durante la merenda di metà mattina, mangiano in maniera adeguata?*

Oggi giorno si raccomanda che venga consumata a metà mattina una merenda contenente circa 100 calorie, che corrispondono in pratica a uno yogurt o a un frutto o a un succo di frutta senza zuccheri aggiunti. La merenda fornita dalla scuola agli alunni è stata considerata adeguata.

**Adeguatezza della merenda di metà mattina consumata dai bambini (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**




- Nel 65,2% (15) delle classi è stata distribuita una merenda di metà mattina.
- La maggior parte dei bambini (62,9%) consuma una merenda adeguata di metà mattina.
- Circa un terzo dei bambini (30,9%) la fa inadeguata e il 6,2% non la fa per niente.
- Non sono emerse differenze per sesso del bambino e per livello di istruzione della madre.

## Quante porzioni di frutta e verdura mangiano i nostri bambini al giorno?


Le linee guida sulla sana alimentazione prevedono l'assunzione di almeno cinque porzioni al giorno di frutta o verdura. Il consumo di frutta e verdura nell'arco della giornata garantisce un adeguato apporto di fibre e sali minerali e consente di limitare la quantità di calorie introdotte.

Consumo di frutta nell'arco della settimana (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019



- Nella nostra Asl, i genitori riferiscono che solo il 21,5% dei bambini consuma la frutta 2-3 volte al giorno e il 24,6% una sola volta al giorno.
- Il 4,6% dei bambini mangia frutta meno di una volta a settimana o mai.
- Non sono emerse differenze statisticamente significative per sesso del bambino, mentre il consumo aumenta al crescere del livello di istruzione della madre.

Consumo di verdura nell'arco della settimana (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019



- Nella nostra Asl, i genitori riferiscono che il 20,7% dei bambini consuma verdura 2-3 volte al giorno; il 19,6% una sola volta al giorno.
- Il 6,9% dei bambini consuma verdura meno di una volta a settimana o mai.
- Non sono emerse particolari differenze per sesso del bambino mentre il consumo aumenta al crescere del livello di istruzione della madre.
- Il 49,7% dei bambini consuma almeno due volte al giorno frutta e/o verdura.

### In una settimana tipica, quante volte i bambini bevono e mangiano i seguenti cibi e bevande?

L'alimentazione può influenzare lo stato ponderale. Il consumo di bibite zuccherate e/o gassate nel 2019 è stato indagato con modalità diverse rispetto al passato e con l'aggiunta della categoria dei succhi di frutta 100% frutta e delle bibite a ridotto contenuto di zucchero. Inoltre, nell'ultima rilevazione di OKkio alla SALUTE sono state aggiunte altre categorie di alimenti che non erano stati mai indagati prima, ovvero i legumi, gli snack salati e dolci.

#### Consumo abituale di alimenti per categoria - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019

FREQUENZA DI CONSUMO	SUCCHI DI FRUTTA 100% FRUTTA	BIBITE CONF. CONTENENTI ZUCCHERO (tè, aranciata, cola, succhi di frutta, ecc.)	BIBITE CONF. A RIDOTTO CONTENUTO DI ZUCCHERO (cola light/zero, ecc.)	LEGUMI	SNACK SALATI (patatine, popcorn, noccioline, ecc.)	SNACK DOLCI (merendine, biscotti, caramelle, torte, ecc.)
Mai	18,6	14,1	63,4	19,0	10,4	2,5
meno di una volta a settimana	29,5	49,1	24,9	32,3	54,0	12,3
qualche giorno (1-3 giorni)	32,2	28,3	10,6	44,6	30,0	34,5
quasi tutti i giorni (4-6 giorni)	11,6	4,9	0,5	2,3	4,7	29,6
una volta al giorno tutti i giorni	6,9	2,0	0,2	0,9	0,7	17,0
più volte al giorno tutti i giorni	1,1	1,6	0,5	0,9	0,2	4,0

- Nella nostra Asl il 4,9% dei bambini assume bevande zuccherate confezionate contenenti zucchero quasi tutti i giorni, mentre un complessivo 3,6% dichiara di assumerle tutti i giorni, anche più volte al giorno
- Il 51,3% dei bambini non consuma mai legumi o meno di una volta a settimana
- Il consumo di snack salati e dolci "più volte al giorno, tutti i giorni" è rispettivamente dello 0,2% e del 4,0%
- Mentre non vi è differenza fra maschi e femmine per le diverse categorie di alimenti, la prevalenza di consumo di bibite confezionate contenenti zucchero una volta al giorno tutti i giorni diminuisce con il crescere della scolarità della madre

## L'igiene orale dei bambini: quanti bambini si lavano i denti dopo cena? \_\_

L'abitudine di lavarsi i denti è essenziale per la prevenzione della carie dentale e dell'igiene del cavo orale. L'83,7% dei bambini della nostra Asl ha dichiarato di essersi lavato i denti la sera precedente l'indagine. A livello nazionale questo dato è risultato pari all'83%. Nella nostra Asl i genitori hanno riportato che il 21,2% dei bambini lava i denti non più di una volta al giorno; dato nazionale 31%

## I cambiamenti salutari adottati in famiglia \_\_\_\_\_

Nel questionario rivolto ai genitori, al fine di approfondire la propensione alla prevenzione, nel 2016 sono state introdotte domande relative all'uso abituale di comportamenti salutari adottati in famiglia legati all'alimentazione e all'igiene orale.

Nella nostra Asl i comportamenti salutari più frequentemente adottati sono risultati: aumentare il consumo di verdura e ortaggi (70,3%), ridurre il consumo di alimenti già pronti o in scatola (65,6%), limitare il consumo di snack salati (55,8%), inserire la frutta come spuntino (50,7%), ridurre il sale durante la preparazione dei pasti (49,6%), non aggiungere sale a tavola (36,6%), leggere con maggiore attenzione le etichette nutrizionali (36,2%), acquistare pane poco salato (8,9%).

### Per un confronto- ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019

	Valori aziendali (%)						VALORE REGIONALE 2019 (%)	VALORE NAZIONALE 2019 (%)
	2008	2010	2012	2014	2016	2019		
<sup>§</sup> hanno assunto la colazione al mattino dell'indagine**	91,0	93,0	94,0	96,0	94,0	95,0	93,0	91,3
<sup>§</sup> hanno assunto una colazione adeguata il mattino dell'indagine**	60,0	58,0	61,0	61,0	57,0	56,0	58,0	55,7
hanno assunto una merenda adeguata a metà mattina	40,0	32,0	68,0	58,0	54,0	63,0	52,0	41,2
assumono 5 porzioni di frutta e/o verdura giornaliera	2,0	2,0	11,0	11,0	12,0	8,0	9,0	5,7
assumono bibite zuccherate e/o gassate almeno una volta al giorno	38,0	38,0	38,0	37,0	34,0	19,0	24,0	23,9

<sup>§</sup> Variabili per le quali è stato effettuato un confronto tra le rilevazioni svolte a livello regionale. La variazione statisticamente significativa ( $p < 0,05$ ) è indicata con \*\*



## Conclusioni

---

Nella nostra Asl con la sesta raccolta dei dati, si conferma la diffusione fra i bambini di abitudini alimentari che non sempre favoriscono una crescita armonica e sono fortemente predisponenti all'aumento di peso. Questo rischio per i bambini può essere limitato grazie alla modifica delle abitudini familiari e tramite il sostegno della scuola ai bambini e alle loro famiglie.

## L'attività fisica

L'attività fisica è un fattore determinante per mantenere o migliorare la salute dell'individuo poiché è in grado di ridurre il rischio di molte malattie cronic-degenerative. Si consiglia che i bambini facciano attività fisica moderata o intensa ogni giorno per almeno 1 ora. Questa attività non deve essere necessariamente continua ed include tutte le attività motorie quotidiane.

### Quanti bambini sono fisicamente non attivi?

La creazione delle condizioni che permettono ai bambini di essere attivi fisicamente dipende dalla comprensione di tale necessità da parte della famiglia e ancora di più dalla società in generale, incluso la scuola. Nel nostro studio, il bambino è considerato non attivo se non ha svolto almeno 1 ora di attività fisica il giorno precedente all'indagine (cioè, attività motoria a scuola e attività sportiva strutturata e ha giocato all'aperto nel pomeriggio). L'inattività fisica è stata studiata non come abitudine, ma solo in termini di prevalenza puntuale riferita al giorno precedente all'indagine.

#### Bambini fisicamente non attivi<sup>#</sup> (%) – - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019

CARATTERISTICHE	NON ATTIVI
<b>Sesso</b>	
Maschi	10,5
Femmine	14,6
<b>Zona abitativa</b>	
<10.000 abitanti	-
10.000-50.000	-
>50.000	-
metropolitana/perimetropolitana	12,4


<sup>#</sup> Il giorno precedente non hanno svolto attività motoria a scuola e attività sportiva strutturata e non hanno giocato all'aperto nel pomeriggio

- Nel nostro studio il 12,4% dei bambini risulta non attivo il giorno antecedente all'indagine.
- Solo il 10,3 % tuttavia ha partecipato ad un'attività motoria curricolare a scuola nel giorno precedente (questo può dipendere dal fatto che il giorno precedente poteva non essere quello in cui era prevista l'ora curricolare).
- Le femmine non attive (14,6%) sono in percentuale maggiore dei maschi (10,5%).

## I bambini giocano all'aperto e fanno attività sportiva strutturata? \_\_

Il pomeriggio dopo la scuola costituisce un buon periodo della giornata per permettere ai bambini di fare attività fisica; è quindi molto importante sia il gioco all'aperto che lo sport strutturato. I bambini impegnati in queste attività tendono a trascorrere meno tempo in attività sedentarie (televisione/videogiochi/tablet/cellulare) e quindi a essere meno a rischio di sovrappeso/obesità.

**Bambini che hanno giocato all'aperto e/o fatto sport il giorno precedente le rilevazioni (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**




- Il 77,8% del totale dei bambini ha giocato all'aperto il pomeriggio antecedente all'indagine.
- I maschi giocano all'aperto più delle femmine.
- Il 42,9% dei bambini ha fatto attività sportiva strutturata il pomeriggio antecedente all'indagine.

## Secondo i genitori, durante la settimana quanti giorni i bambini fanno attività fisica per almeno un'ora? \_\_\_\_\_


Per stimare l'attività fisica dei bambini si utilizza l'informazione fornita dai genitori, ai quali si è chiesto quanti giorni, in una settimana normale, i bambini giocano all'aperto o fanno sport strutturato per almeno un'ora al giorno al di fuori dell'orario scolastico. Nel questionario 2019 è stato inoltre richiesto ai genitori di riportare, secondo le indicazioni dell'OMS, il totale delle ore a settimana che i bambini dedicano a queste attività.

**Giorni di attività sportiva strutturata per almeno un'ora durante la settimana (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**



- Secondo i genitori, nella nostra Asl, circa 4 bambini su 10 (36,3%) fanno almeno un'ora di attività sportiva strutturata per 2 giorni la settimana, il 14,5% neanche un giorno e solo il 2% da 5 a 7 giorni.
- I maschi fanno attività sportiva strutturata più giorni delle femmine.

**Giorni di giochi di movimento per almeno un'ora durante la settimana (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**




- Per quanto riguarda il tempo dedicato ai giochi di movimento, nella nostra Asl, circa 1 bambino su 5 (20%) fa almeno un'ora di attività per 2 giorni la settimana, il 5% neanche un giorno e solo il 37,9% da 5 a 7 giorni.
- I maschi fanno giochi di movimento più giorni delle femmine.

### Come si recano a scuola i bambini (percorso casa scuola e viceversa)?


Un altro modo per rendere fisicamente attivi i bambini è far loro percorrere il tragitto casa-scuola a piedi o in bicicletta, compatibilmente con la distanza del loro domicilio dalla scuola. Nel 2019 i bambini hanno risposto a questa domanda riferendosi al giorno in cui si è svolta la rilevazione; a completamento di questa informazione, come accade nel COSI, ai genitori è stato chiesto come solitamente i bambini si recano/tornano da scuola.

- Il 23,4% dei bambini, nella mattina dell'indagine, ha riferito di essersi recato a scuola a piedi o in bicicletta/monopattino/pattini (indicatore del PNP); invece, il 76% ha utilizzato un mezzo di trasporto pubblico o privato.
- Non si rilevano differenze degne di nota per sesso e fra le diverse tipologie di zona abitativa.

**Percorso casa-scuola (%) riferito dai genitori - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**



**Percorso scuola-casa (%) riferito dai genitori - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**



- Secondo i genitori, nel tragitto casa-scuola il 25,9% dei bambini si è recato a scuola a piedi o in bicicletta/monopattino/pattini; invece, il 74,1% ha utilizzato un mezzo di trasporto pubblico o privato. Per il ritorno il 70,1% dei bambini ha utilizzato un mezzo di trasporto pubblico o privato e il 30% è tornato a piedi/bicicletta/monopattino.

## Quali sono i motivi per i quali i bambini non si recano a scuola a piedi o in bicicletta/monopattino/pattini?

Capire quali possono essere i motivi che impediscono alle loro famiglie di portare i bambini a scuola (e viceversa) a piedi o in bicicletta/monopattino/pattini è fondamentale per poter intervenire con politiche/azioni ad hoc così come la realizzazione di infrastrutture (piste ciclabili, pedonali, percorsi liberi dal traffico, ecc.).

**Motivi che impediscono di recarsi a scuola a piedi o in bicicletta/monopattino/pattini (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**


MOTIVI	%
Strada non sicura	13,8
Distanza eccessiva	48,9
Il bambino si muove già abbastanza durante la giornata	2,5
Manca di tempo	42,2

- Nella nostra Asl, la maggior parte dei genitori (48,9%) indica come motivo principale la distanza eccessiva.

## Come viene percepita la qualità dell'aria dai genitori?

Nel questionario rivolto al genitore adottato nel 2019, su richiesta del Comitato Tecnico di OKkio alla SALUTE e di un gruppo di ricerca dell'ISS che da anni si occupa di temi di salute connessi all'ambiente, sono state inserite due domande sulla percezione della qualità dell'aria nei pressi dell'abitazione e della scuola frequentata dai propri figli.

**Percezione della qualità dell'aria (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**



- All'interno del campione da noi analizzato, l'87,6% dei genitori ritiene la qualità dell'aria da discreta ad ottima nella propria zona abitativa.
- L'84,6% dei genitori ritiene la qualità dell'aria da discreta ad ottima nei pressi della scuola.

## Per un confronto - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019

	Valori aziendali (%)						VALORE REGIONALE	VALORE NAZIONALE
	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2019 (%)	2019 (%)
<sup>§</sup> Bambini definiti fisicamente non attivi** (indicatore del PNP)	8,0	11,0	10,5	9,3	19,0	12,4	14,0	20,3
Bambini che hanno giocato all'aperto il pomeriggio prima dell'indagine	53,0	76,5	77,5	80,4	69,6	77,8	71,0	61,4
Bambini che hanno svolto attività sportiva strutturata il pomeriggio prima dell'indagine	36,0	45,0	42,0	53,1	40,3	42,9	46,0	43,7
Bambini che si recano a scuola a piedi e/o bicicletta	25,0	33,0	31,0	24,0	24,5	25,9	31,0	26,4

<sup>§</sup> Variabile per la quale è stato effettuato un confronto tra le rilevazioni svolte a livello regionale. La variazione statisticamente significativa ( $p < 0,05$ ) è indicata con \*\*

## Conclusioni

I dati raccolti hanno evidenziato che i bambini della nostra Asl fanno poca attività fisica. Si stima che 1 bambino su 10 risulta fisicamente inattivo, maggiormente le femmine rispetto ai maschi.

Rispetto alle precedenti rilevazioni, in particolare al dato del 2016, l'incidenza di bambini fisicamente inattivi è sensibilmente migliorata, passando dal 19,0% al 12,4%; tale dato si pone al di sotto sia della media regionale (14,0%) sia di quella nazionale (20,3%).

Si mantiene invece bassa l'incidenza dei bambini che si recano a scuola a piedi, in bicicletta o con altri mezzi non motorizzati (25,9%) rispetto al dato massimo registrato nel 2010 del 33,0% e alla media regionale del 31,0%; dato comunque in linea con la media nazionale del 26,4%.

Le scuole e le famiglie devono collaborare nella realizzazione di condizioni e di iniziative che incrementino la naturale predisposizione dei bambini all'attività fisica.

## Le attività sedentarie

La crescente disponibilità di televisori, videogiochi e dispositivi elettronici, insieme ai profondi cambiamenti nella composizione e nella cultura della famiglia, ha contribuito ad aumentare il numero di ore trascorse in attività sedentarie. Pur costituendo un'opportunità di divertimento e talvolta di sviluppo del bambino, il tempo trascorso davanti alla televisione e/o altri dispositivi elettronici si associa all'assunzione di cibi fuori pasto che può contribuire al sovrappeso/obesità. Inoltre, il tempo trascorso in queste attività statiche sottrae spazio al movimento e al gioco libero e può essere uno dei fattori che contribuisce all'aumento del peso.


*Quante ore al giorno i bambini guardano la televisione o usano i videogiochi/tablet/cellulare?*

Si raccomanda un limite di esposizione complessivo alla televisione/videogiochi/tablet/cellulare per i bambini di età maggiore ai 2 anni di non oltre le 2 ore quotidiane; mentre è decisamente sconsigliata la televisione nella camera da letto dei bambini.

Nei questionari 2019 rivolti ai genitori è stata modificata la modalità con cui viene rilevato il tempo speso guardando la TV o davanti ad un dispositivo elettronico; al genitore è stato infatti richiesto di indicare il numero preciso di ore e minuti che il proprio figlio trascorre in attività davanti a uno schermo durante un normale giorno di scuola e nel fine settimana.

I seguenti dati mostrano la somma del numero di ore che i bambini trascorrono a guardare la TV e/o a giocare con i videogiochi/tablet/cellulare in un normale giorno di scuola e nel fine settimana, secondo quanto dichiarato dai genitori.

**Ore trascorse a guardare la TV e/o a giocare con i videogiochi/tablet/cellulare (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**





- Nella nostra Asl, in particolare nei giorni di scuola i genitori riferiscono che il 68,7% dei bambini guarda la TV o usa videogiochi/tablet/cellulare da 0 a due 2 ore al giorno, mentre il 27,7% è esposto quotidianamente alla TV o ai videogiochi/tablet/cellulare per 3 a 4 ore e il 3,6% per almeno 5 ore. Valori decisamente più alti si riscontrano nel fine settimana, in cui il 46% è esposto per più di 5 ore.
- L'esposizione a più di 2 ore di TV o videogiochi/tablet/cellulare è più frequente tra i maschi (32,5% versus 30,4%) e diminuisce con l'aumento del livello di istruzione della madre.
- Complessivamente il 49% dei bambini ha un televisore nella propria camera.
- L'esposizione a più di 2 ore di TV al giorno è più alta tra i bambini che hanno una TV in camera (11,8% versus 7,8%).
- Considerando separatamente il tempo dedicato alle due attività, si rileva che la percentuale di bambini che trascorre più di 2 ore davanti alla TV è pari al 9,6%, mentre quella relativa l'utilizzo di videogiochi/tablet/cellulare è 3,6%.

### Complessivamente, quanto spesso i bambini guardano la televisione o giocano con i videogiochi/tablet/cellulare durante il giorno? \_\_\_\_\_

Nella nostra Asl il 41,9% dei bambini ha guardato la TV o ha utilizzato videogiochi/tablet/cellulare la mattina prima di andare a scuola, il 61,6% il pomeriggio del giorno precedente e il 72,9% la sera.

Solo il 14% dei bambini non ha guardato la TV o utilizzato i videogiochi/tablet/cellulare nelle 24 ore antecedenti l'indagine, mentre il 24,5% lo ha fatto in un periodo della giornata, il 33,3% in due periodi e il 28,2% ne ha fatto uso durante la mattina, il pomeriggio e la sera.

L'utilizzo di TV e/o videogiochi/tablet/cellulare è più frequente tra i maschi (30,5% versus 25,6%) e diminuisce con l'aumento del livello di istruzione della madre.

#### Per un confronto - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019

	Valori aziendali (%)						VALORE REGIONALE 2019 (%)	VALORE NAZIONALE 2019 (%)
	2008	2010	2012	2014	2016	2019		
Bambini che trascorrono al televisore o ai videogiochi/tablet/ cellulare più di 2 ore al giorno (durante un normale giorno di scuola)	32,0	22,0	27,0	23,0	34,0	31,0	36,0	44,5
Bambini con televisore in camera	45,0	39,0	42,0	37,0	35,0	42,0	38,0	43,5

## Conclusioni

---

Nella nostra Asl i bambini trascorrono molto tempo in attività sedentarie, principalmente davanti agli schermi e soprattutto nei fine settimana.

Queste attività sedentarie sono sicuramente favorite dal fatto che quasi la metà (il 42% - 4 su 10) dei bambini dispone di un televisore in camera propria. Rispetto alle raccomandazioni sulle attività sedentarie (meno di 2 ore al giorno da dedicare alla televisione o ai videogiochi/tablet/cellulare), 3 bambini su 10 (nei giorni di scuola) eccedono nel tempo trascorso davanti a schermi.

Rispetto alle precedenti rilevazioni, la percentuale di bambini che eccede nell'utilizzo di TV e dei videogiochi/tablet/cellulare (31%) è in diminuzione rispetto al dato del 2016, e si mantiene al di sotto sia del dato medio regionale (36%) che di quello nazionale (44,5%).

Aumenta invece, rispetto alla precedente rilevazione, la percentuale di bambini con televisore in camera (42% versus 35%), benché nel corso delle rilevazioni tale dato abbia mostrato un andamento altalenante che non consente di rilevare un trend in negativo o in positivo.


## La percezione delle madri sulla situazione nutrizionale e sull'attività fisica dei bambini

La cognizione che comportamenti alimentari inadeguati e stili di vita sedentari siano causa del sovrappeso/obesità tarda a diffondersi nella collettività. A questo fenomeno si aggiunge la mancanza di consapevolezza da parte dei genitori dello stato di sovrappeso/obesità del proprio figlio e del fatto che il bambino mangi troppo o si muova poco.

Qual è la percezione della madre rispetto allo stato ponderale del proprio figlio? \_\_\_\_\_

Alcuni studi hanno dimostrato che i genitori possono non avere un quadro corretto dello stato ponderale del proprio figlio. Questo fenomeno è particolarmente importante nei bambini sovrappeso/obesi che vengono al contrario percepiti come normopeso.

La percezione materna dello stato ponderale dei figli (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019




- Nella nostra Asl ben il 50% delle madri di bambini sovrappeso e il 7,7% delle madri di bambini obesi ritiene che il proprio bambino sia normopeso o sottopeso.
- Nelle famiglie con bambini in sovrappeso, la percezione non cambia in rapporto al sesso del bambino. Diversa la situazione si presenta nelle famiglie di bambini obesi (36,4% maschi, 20% femmine).
- Sia per i bambini in sovrappeso che per i bambini obesi, la percezione è tanto più accurata quanto maggiore è la scolarità della madre.
- Per i bambini obesi, la percezione è tanto più accurata quanto maggiore è la scolarità della madre.

## Qual è la percezione della madre rispetto alla quantità di cibo assunta dal proprio figlio?

La percezione della quantità di cibo assunto dai propri figli può influenzare la probabilità di operare cambiamenti positivi. Anche se vi sono molti altri fattori determinanti di sovrappeso e obesità, l'eccessiva assunzione di cibo può contribuire al problema.

La percezione materna della quantità di cibo assunta dai figli (%) ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019




- Il 30,6% delle madri di bambini sovrappeso e il 76,9% di bambini obesi ritiene che il proprio bambino mangi troppo.
- Considerando il numero complessivo dei bambini in sovrappeso e obesi, la percezione risulta maggiore nei maschi rispetto alle femmine (47,9% versus 38,0%); mentre non si rileva una differenza significativa in base al livello scolastico della madre.

## Qual è la percezione della madre rispetto all'attività fisica svolta dal figlio?

Anche se l'attività fisica è difficile da misurare, un genitore che ritenga che il proprio bambino sia attivo, mentre in realtà non si impegna in nessuno sport o gioco all'aperto e non ha partecipato a un'attività motoria scolastica nel giorno precedente, ha quasi certamente una percezione sbagliata del livello di attività fisica del proprio figlio. A livello nazionale e internazionale viene raccomandato che i bambini facciano attività fisica moderata o intensa ogni giorno per almeno 1 ora.

La percezione materna dell'attività fisica praticata dai figli (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019



- All'interno del gruppo di bambini non attivi, il 52,5% delle madri ritiene che il proprio figlio svolga sufficiente attività fisica e il 12,5% molta attività fisica.
- Limitatamente ai non attivi le madri riferiscono "tanta attività fisica" nel 25 % dei casi per i maschi, nel 4,2% per le femmine, sufficiente nel 43,7% per i maschi contro il 58,2% per le femmine), non si evidenzia invece correlazione alla scolarizzazione della madre.

Per un confronto - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019

MADRI CHE PERCEPISCONO	Valori aziendali (%)						VALORE REGIONALE 2019 (%)	VALORE NAZIONALE 2019 (%)
	2008	2010	2012	2014	2016	2019		
§ in modo adeguato* lo stato ponderale del proprio figlio, quando questo è sovrappeso	50,0	76,0	47,0	65,0	49,2	50,0	52,0	46,9
in modo adeguato* lo stato ponderale del proprio figlio, quando questo è obeso	98,0	95,0	82,0	83,0	100,0	92,3	92,0	86,0
l'assunzione di cibo del proprio figlio come "poco o giusto", quando questo è sovrappeso o obeso**	69,0	57,0	71,0	66,0	72,0	57,1	66,0	69,9
l'attività fisica del proprio figlio come scarsa, quando questo risulta inattivo	41,0	23,0	40,0	38,0	31,0	35,0	36,0	46,9

\* Adeguato = un po' in sovrappeso/molto in sovrappeso

§ Variabile per la quale è stato effettuato un confronto tra le rilevazioni svolte a livello regionale. La variazione statisticamente significativa (p<0,05) è indicata con \*\*

## Gli incidenti domestici

---

OKkio alla SALUTE permette di indagare anche il fenomeno degli incidenti domestici e l'attenzione che viene data da parte degli operatori sanitari.

- È stato chiesto ai genitori se avessero mai ricevuto informazioni da parte delle istituzioni sanitarie sulla prevenzione degli incidenti domestici. A livello nazionale, il 14,9% dei rispondenti ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcuna informazione; nella nostra Asl tale valore è risultato pari a 81,1%.
- Alla domanda se si fossero mai rivolti al personale sanitario a causa di incidenti domestici di cui è stato vittima il bambino, a livello nazionale si sono registrate le seguenti risposte: 9% sì, al pediatra/altro medico; 20% sì, al pronto soccorso; 8% sì, ad entrambi. Nella nostra Asl le percentuali di risposta sono state rispettivamente: 5%, 23,5%, 4,8%.

## Conclusioni

---

Nella nostra Asl, il 50% delle madri di bambini sovrappeso e il 92,3% delle madri di bambini obesi valutano adeguatamente lo stato ponderale del proprio figlio: si tratta di un dato in linea con le medie regionali, che nel tempo non fanno rilevare un trend significativo. E' comunque da evidenziare che la corretta percezione della madre aumenta in relazione al livello di scolarizzazione.

Permane invece un'alta incidenza relativamente alla scorretta valutazione della quantità di cibo assunta da bambini in condizione di sovrappeso/obesità: il 57,2% delle madri è infatti convinta che il proprio figlio assuma una quantità di cibo insufficiente o giusta. Rispetto alla rilevazione del 2016 (72%), il dato segnala un significativo miglioramento, benché analizzando la serie storica tali oscillazioni di valore si ripetono nel tempo rendendo impossibile la definizione di una tendenza. Tale dato è poi più alto relativamente alle figlie femmine (62%) rispetto ai maschi (52%); non si rileva invece, in questo caso, una correlazione diretta tra la percezione della madre e il titolo di studio della stessa.

Solo il 35% delle madri, infine, ha una corretta percezione in merito al livello di attività fisica del proprio figlio quando questi risulta inattivo. La maggioranza delle madri ritiene infatti che il proprio figlio svolga un livello di movimento giusto (52,5%) o addirittura eccessivo (12,5%), senza una grande distinzione tra maschi (68,7%) e femmine (62,5%). Anche in questo caso, il livello di scolarizzazione della madre non risulta discriminante. Il dato è comunque in linea con la media regionale (36%), e ben al di sotto di quella nazionale (47%). In linea generale, l'incidenza di madri che presentano una corretta percezione del livello di attività fisica del proprio figlio quando questi è inattivo si conferma nel corso delle rilevazioni in un range tra il 30% e il 40% del campione.

## L'ambiente scolastico e il suo ruolo nella promozione di una sana alimentazione e dell'attività fisica

La scuola gioca un ruolo fondamentale nel migliorare lo stato ponderale dei bambini, sia creando condizioni favorevoli per una corretta alimentazione e per lo svolgimento dell'attività motoria strutturata, che promuovendo abitudini alimentari adeguate.


La scuola rappresenta, inoltre, l'ambiente ideale per creare occasioni di comunicazione con le famiglie con un loro maggior coinvolgimento nelle iniziative di promozione di una sana alimentazione e dell'attività fisica dei bambini.

### La partecipazione della scuola all'alimentazione dei bambini

*Quante scuole sono dotate di mensa e quali sono le loro modalità di funzionamento?*

Le mense possono avere una ricaduta diretta nell'offrire ai bambini dei pasti qualitativamente e quantitativamente equilibrati che favoriscono un'alimentazione adeguata e contribuiscono alla prevenzione del sovrappeso/obesità.

**Predisposizione del menù scolastico (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**




- Nella nostra Asl il 100% delle scuole campionate ha una mensa scolastica funzionante.
- Nelle scuole dotate di una mensa, l'86,4% di esse sono aperte almeno 5 giorni la settimana.
- La definizione del menù scolastico è più frequentemente stabilita dall'azienda appaltatrice, seguita dalla commissione mensa e dal dietista esterno.
- Secondo il giudizio dei dirigenti scolastici il 90,5% delle mense risulta essere adeguato per i bisogni dei bambini.

## È prevista la distribuzione di alimenti all'interno della scuola? \_\_\_\_\_

Negli ultimi anni sempre più scuole hanno avviato distribuzioni di alimenti allo scopo di integrare e migliorare l'alimentazione degli alunni.

**Promozione del consumo di alimenti sani con Enti e associazioni (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**




- Nella nostra Asl, le scuole che distribuiscono ai bambini frutta o latte o yogurt, nel corso della giornata, sono il 63,6%.
- In tali scuole, la distribuzione si effettua prevalentemente a metà mattina (100%), mentre solo il 7,1% distribuisce tali alimenti anche al pomeriggio.
- Durante l'anno scolastico il 30,4% delle classi ha partecipato ad attività di promozione del consumo di alimenti sani all'interno della scuola con Enti e/o associazioni.
- In questo anno scolastico il 26% delle classi ha partecipato alla distribuzione di frutta, verdura o yogurt come spuntino.
- Il 4% delle classi ha ricevuto materiale informativo.
- il 4% delle classi ha organizzato incontri con esperti esterni alla scuola.



## Sono segnalati dei distributori automatici? \_\_\_\_\_

Lo sviluppo di comportamenti non salutari nei bambini può essere favorito dalla presenza nelle scuole di distributori automatici di merendine o bevande zuccherate di libero accesso agli alunni.

**Alimenti presenti nei distributori automatici (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**



- I distributori automatici di alimenti sono presenti nell'86,4% delle scuole; il 4,6% è accessibile sia agli adulti che ai bambini.
- All'interno del gruppo di scuole con distributori automatici, il 47,4% mette a disposizione succhi di frutta 100% frutta, nettari/bevande alla frutta, frutta fresca, yogurt o latte.
- Nella nostra Asl gli alimenti maggiormente frequenti nei distributori automatici sono bevande calde (94,7%), acqua (78,9%), bevande zuccherate o gassate (57,9%), snack dolci (57,9%), e snack salati (52,6%).


## La partecipazione della scuola all'educazione fisica dei bambini

Quante classi riescono a far fare ai propri alunni 2 ore di educazione fisica a settimana? \_\_\_\_\_

Nelle "Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" del MIUR, pubblicate nel Settembre 2012, si sottolinea l'importanza dell'attività motoria e sportiva per il benessere fisico e psichico del bambino.

Nel questionario destinato alla scuola viene chiesto quante classi, e con quale frequenza, svolgono educazione fisica all'interno dell'orario scolastico.

**Distribuzione percentuale delle classi per numero di ore a settimana di attività motoria (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**




- Complessivamente, nel 56,2% delle classi delle nostre scuole si svolgono normalmente almeno 2 ore di educazione fisica a settimana mentre non esistono classi in cui si faccia meno di un'ora a settimana.

## Le scuole offrono l'opportunità di praticare attività fisica oltre quella curricolare all'interno della struttura scolastica? \_\_\_\_\_

L'opportunità offerta dalla scuola di fare attività fisica extra-curricolare potrebbe avere un effetto benefico, oltre che sulla salute dei bambini, anche sulla loro abitudine a privilegiare l'attività motoria.

**Momento dell'offerta di attività motoria extracurricolare (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**




- Le scuole che offrono agli alunni la possibilità di effettuare all'interno dell'edificio scolastico occasioni di attività fisica sono il 77,3%.
- Laddove offerta, l'attività fisica viene svolta più frequentemente nel pomeriggio (58,8%), in ricreazione (52,9%) e durante l'orario scolastico (41,2%).
- Queste attività si svolgono più frequentemente in palestra (52,9%), nel giardino (76,5%), in piscina (41,2%), in altra struttura sportiva (29,4%).

## Il miglioramento delle attività curricolari a favore dell'alimentazione e dell'attività motoria dei bambini

Quante scuole prevedono nel loro curriculum l'educazione alimentare? \_\_\_

In molte scuole del Paese sono in atto iniziative di miglioramento del curriculum formativo scolastico a favore della sana alimentazione dei bambini

**Figure professionali coinvolte nell'attività curriculare nutrizionale (%) - ASL T05, OKkio alla SALUTE 2019**




- L'educazione alimentare è prevista nell'attività curriculare dell'81,8% delle scuole campionate nella nostra Asl.
- In tali scuole, la figura più frequentemente coinvolta è l'insegnante di classe. Molto meno comune è il coinvolgimento di altri insegnanti o della ASL.

## Quante scuole prevedono il rafforzamento del curriculum formativo sull'attività motoria?

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha avviato iniziative per il miglioramento della qualità dell'attività motoria svolta nelle scuole primarie; è interessante capire in che misura la scuola è riuscita a recepire tale iniziativa.

### Iniziative delle scuole a favore dell'attività fisica (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019



- Nel nostro campione, il 95,5% delle scuole ha cominciato a realizzare almeno un'attività.
- In tali attività, viene frequentemente coinvolto un esperto esterno; nel 38,1% dei casi è stata effettuata la valutazione delle abilità motorie dei bambini, nel 28,6% lo sviluppo di un curriculum strutturato e nel 9,5% la formazione degli insegnanti.

## Quante scuole hanno aderito o realizzato iniziative sul consumo di sale?

A livello nazionale, il 5,3% delle scuole ha aderito ad iniziative di comunicazione per la riduzione del consumo di sale e/o per la promozione del sale iodato.


- Nella nostra Asl tale valore è pari a 15%.

## Le attività di promozione dell'alimentazione e dell'attività fisica dei bambini

*Nella scuola sono attive iniziative finalizzate alla promozione di stili di vita salutari realizzate in collaborazione con Enti o Associazioni? \_\_\_\_\_*

Nella scuola sono in atto numerose iniziative finalizzate a promuovere sane abitudini alimentari e attività motoria in collaborazione con enti, istituzioni e ASL.

**Iniziative con le ASL (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**



- I Servizi Sanitari della ASL costituiscono un partner privilegiato e sono coinvolti nella realizzazione di programmi di educazione alimentare nel 18,2% delle scuole, mentre in nessuna delle scuole facenti parte del campione la ASL risulta coinvolta in programmi di promozione dell'attività fisica.
- Sul fronte dei programmi di educazione alimentare, la collaborazione con l'ASL si realizza più frequentemente attraverso degli incontri con i genitori (75%), l'appoggio tecnico agli insegnanti (25%) o la loro formazione (25%) e con l'insegnamento diretto agli alunni (50%).

**Iniziative promozione alimentare (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**




- Oltre la ASL, gli enti e le associazioni che hanno prevalentemente organizzato iniziative di promozione alimentare nelle scuole sono la direzione scolastica/insegnanti, volontariato e altri enti pubblici

## Risorse a disposizione della scuola

*Nella scuola o nelle sue vicinanze sono presenti strutture utilizzabili dagli alunni?* \_\_\_\_\_


Per poter svolgere un ruolo nella promozione della salute dei bambini, la scuola necessita di risorse adeguate nel proprio plesso e nel territorio.

**Risorse adeguate presenti nel plesso (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**



- Secondo i dirigenti scolastici, l'87,5% delle scuole possiede una palestra adeguata.
- Risultano inoltre adeguati per il 90,5% la mensa, per il 95,5% il cortile, per l'80% la biblioteca, per il 54,5% i computer.

**Risorse presenti nel plesso o nelle vicinanze (%) - ASL TO5, OKkio alla SALUTE 2019**



- Il 71,4% delle scuole ha la palestra nelle vicinanze o all'interno della propria struttura.
- Sono presenti nelle vicinanze dell'edificio scolastico spazi aperti/parchi da gioco/aree verdi (95,5%) e campi da calcio (77,3%).
- Risultano invece meno presenti le piste ciclabili (59,1%) e le piscine (50%).

### La scuola e il divieto di fumo negli spazi aperti

La legge n°128 del Dicembre 2013, che disciplina la "Tutela della salute nelle scuole", estende il divieto di fumo nelle scuole anche nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni.

- Nella nostra Asl, il 90% dei dirigenti scolastici dichiara di non aver avuto "mai" difficoltà nell'applicare la legge sul divieto di fumo negli spazi aperti della scuola (rispetto al 76,1% a livello nazionale).




## Coinvolgimento delle famiglie

In quante scuole si constata un coinvolgimento attivo dei genitori nelle iniziative di promozione di stili di vita sani? \_\_\_\_\_

- Le iniziative di promozione di sane abitudini alimentari e di attività motoria nei bambini coinvolgono attivamente la famiglia rispettivamente nel 45,5% e nel 27,3% delle scuole campionate.

### Per un confronto

Nel grafico di seguito sono riportati i confronti con i dati regionali e nazionali del 2019. Dato il numero esiguo delle scuole campionate a livello aziendale, e di conseguenza intervalli di confidenza generalmente più ampi, è necessaria la massima cautela nell'interpretare e commentare i confronti.



## Conclusioni

---

Gli interventi di prevenzione, per essere efficaci, devono prevedere il coinvolgimento della scuola e della famiglia attraverso programmi integrati, che coinvolgano diversi settori e ambiti sociali, e multi-componenti, che mirino ad aspetti diversi della salute del bambino, quali alimentazione, attività fisica, prevenzione di fattori di rischio legati all'età, con l'obiettivo generale di promuovere l'adozione di stili di vita più sani. I dati raccolti con OKkio alla SALUTE hanno permesso di conoscere meglio l'ambiente scolastico e di gettare le basi per un monitoraggio nel tempo del miglioramento di quelle condizioni che devono permettere alla scuola di svolgere il ruolo di promozione della salute dei bambini e delle loro famiglie.

Dal grafico emerge come i dati del nostro campione, raffrontato con i dati medi regionali e nazionali, risulti particolarmente virtuoso in riferimento ad alcuni indicatori.

A livello generale emerge la necessità di un maggiore impegno nell'intraprendere iniziative su sane abitudini alimentari e un coinvolgimento dei genitori in iniziative di attività motoria.

## Conclusioni generali

---

OKkio alla SALUTE ha permesso di raccogliere informazioni creando un'efficiente rete di collaborazione fra gli operatori del mondo della scuola e della salute.

La letteratura scientifica, infatti, mostra sempre più chiaramente che gli interventi coronati da successo sono quelli integrati (con la partecipazione di famiglie, scuole, operatori della salute e comunità) e multicomponenti (che promuovono per esempio non solo la sana alimentazione ma anche l'attività fisica e la diminuzione della sedentarietà, la formazione dei genitori, il *counselling* comportamentale e l'educazione nutrizionale) e che hanno durata pluriennale.

A questo proposito, la scuola potrebbe contribuire in modo determinante distribuendo una merenda bilanciata a metà mattina e facendo svolgere almeno due ore di attività motoria settimanale a tutti gli alunni. Ugualmente importante è rendere l'ambiente urbano "a misura di bambino" aumentando i parchi pubblici, le aree pedonali e le piste ciclabili così da incentivare il movimento all'aria aperta.

Un primo passo per la promozione di sani stili di vita è stato avviato a partire dal 2009- 2010. Il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Istituto Superiore di Sanità e le Regioni hanno infatti elaborato e distribuito in ogni Regione alcuni materiali di comunicazione e informazione rivolti a specifici target: bambini, genitori, insegnanti e scuole che hanno partecipato a OKkio alla SALUTE.

Sono stati elaborati e distribuiti anche dei poster per gli ambulatori pediatrici realizzati in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria e con la Federazione Italiana dei Medici Pediatri. Tutti i materiali sono stati elaborati nell'ambito di OKkio alla SALUTE in collaborazione con il progetto "PinC - Programma nazionale di informazione e comunicazione a sostegno degli obiettivi di Guadagnare Salute", coordinato sempre dal CNESPS dell'Istituto Superiore di Sanità ([http://www.epicentro.iss.it/focus/guadagnare\\_salute/PinC.asp](http://www.epicentro.iss.it/focus/guadagnare_salute/PinC.asp)).

I risultati della sesta raccolta dati di OKkio alla SALUTE, presentati in questo rapporto, mostrano nella nostra Asl un lieve incremento percentuale di sovrappeso/obesità, tuttavia, rispetto ai dati delle raccolte precedenti non si osservano particolari tendenze in atto.

Per cercare di migliorare la situazione si suggeriscono alcune raccomandazioni dirette ai diversi gruppi di interesse:

### Operatori sanitari

---

Le dimensioni dell'eccesso ponderale nei bambini giustificano da parte degli operatori sanitari un'attenzione costante e regolare che dovrà esprimersi nella raccolta dei dati, nell'interpretazione delle tendenze, nella comunicazione ampia ed efficace dei risultati a tutti i gruppi di interesse e nella proposta/attivazione di interventi integrati tra le figure professionali appartenenti a istituzioni diverse allo scopo di stimolare o rafforzare la propria azione di prevenzione e di promozione della salute.

Inoltre, considerata la scarsa percezione dei genitori dello stato ponderale dei propri figli, gli interventi sanitari proposti dovranno includere anche interventi che prevedano una componente diretta al *counselling* e all'*empowerment* (promozione della riflessione sui vissuti e sviluppo di consapevolezza e competenze per scelte autonome) dei genitori stessi.

## Operatori scolastici

---

La scuola ha un ruolo chiave nel promuovere la salute nelle nuove generazioni.

Seguendo la sua missione, la scuola dovrebbe estendere e migliorare le attività di educazione nutrizionale dei bambini.

Per essere efficace tale educazione deve focalizzarsi da una parte sulla valorizzazione del ruolo attivo del bambino, della sua responsabilità personale e sul potenziamento delle *life skills*, dall'altra, sull'acquisizione di conoscenze e del rapporto fra nutrizione e salute individuale, sulla preparazione, conservazione e stoccaggio degli alimenti.

In maniera più diretta gli insegnanti possono incoraggiare i bambini ad assumere abitudini alimentari più adeguate, promuovendo la colazione del mattino che migliora la performance e diminuisce il rischio di fare merende eccessive a metà mattina. A tal proposito i materiali di comunicazione, realizzati attraverso la collaborazione tra mondo della scuola e della salute, possono offrire agli insegnanti spunti e indicazioni per coinvolgere attivamente i bambini.

Sul fronte dell'attività fisica, è necessario che le scuole assicurino almeno 2 ore di attività motoria a settimana e che cerchino di favorire le raccomandazioni internazionali di un'ora al giorno di attività fisica per i bambini.

## Genitori

---

I genitori dovrebbero essere coinvolti attivamente nelle attività di promozione di sani stili di vita.

L'obiettivo è sia favorire l'acquisizione di conoscenze sui fattori di rischio che possono ostacolare la crescita armonica del proprio figlio, come un'eccessiva sedentarietà, la troppa televisione, la poca attività fisica o alcune abitudini alimentari scorrette (non fare la colazione, mangiare poca frutta e verdura, eccedere con le calorie durante la merenda di metà mattina), sia favorire lo sviluppo di processi motivazionali e di consapevolezza che, modificando la percezione, possano facilitare l'identificazione del reale stato ponderale del proprio figlio.

I genitori dovrebbero, inoltre, riconoscere e sostenere la scuola, in quanto "luogo" privilegiato e vitale per la crescita e lo sviluppo del bambino e collaborare, per tutte le iniziative miranti a promuovere la migliore alimentazione dei propri figli, quale la distribuzione di alimenti sani e l'educazione alimentare. La condivisione, tra insegnanti e genitori, delle attività realizzate in classe può contribuire a sostenere "in famiglia" le iniziative avviate a scuola, aiutando i bambini a mantenere uno stile di vita equilibrato nell'arco dell'intera giornata.

Infine, laddove possibile, i genitori dovrebbero incoraggiare il proprio bambino a raggiungere la scuola a piedi o in bicicletta, per tutto o una parte del tragitto.

## Leaders, decisori locali e collettività

---

Le iniziative promosse dagli operatori sanitari, dalla scuola e dalle famiglie possono essere realizzate con successo solo se la comunità supporta e promuove migliori condizioni di alimentazione e di attività fisica nella popolazione. Per questo la partecipazione e la collaborazione dei diversi Ministeri, di Istituzioni e organizzazioni pubbliche e private, nonché dell'intera società, rappresenta una condizione fondamentale affinché la possibilità di scelte di vita salutari non sia confinata alla responsabilità della singola persona o della singola famiglia, ma piuttosto sia sostenuta da una responsabilità collettiva.

## Bibliografia essenziale

---

### Politica e strategia di salute

- Ministero della Salute. Linee di indirizzo sull'attività fisica per le differenti fasce d'età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione. 2019; disponibile all'indirizzo: [http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pubblicazioni\\_2828\\_allegato.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2828_allegato.pdf)
- World Health Organization. Report of the Commission on Ending Childhood Obesity. 2016; disponibile all'indirizzo: <http://www.who.int/end-childhood-obesity/en/>
- Knai C, Petticrew M, Mays N. The childhood obesity strategy. *BMJ*. 2016;354:i4613.
- Brennan LK, Brownson RC, Orleans CT. Childhood obesity policy research and practice: evidence for policy and environmental strategies. *Am J Prev Med*. 2014;46(1):e1-16.
- EU Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020; disponibile all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/health/nutrition\\_physical\\_activity/docs/childhoodobesity\\_action\\_plan\\_2014\\_2020\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_action_plan_2014_2020_en.pdf) (ultima consultazione maggio 2017). Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Linee guida per l'educazione alimentare, 2015; disponibile all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/allegati/2015/MIUR\\_Linee\\_Guida\\_per\\_l%27Educazione\\_Alimentare\\_2015.pdf](http://www.istruzione.it/allegati/2015/MIUR_Linee_Guida_per_l%27Educazione_Alimentare_2015.pdf)
- Branca F, Nikogosian H, Lobstein T. La sfida dell'obesità nella Regione europea dell'OMS e le strategie di risposta. Compendio. Geneva: WHO; 2007. Traduzione italiana curata dal Ministero della Salute e dalla Società Italiana di Nutrizione Umana, stampata nel 2008. <http://www.sinu.it/documenti/OMS%20La%20Sfida%20dell%27Obesit%C3%A0%20e%20le%20Strategie%20di%20Risposta%20CCM%20SINU.pdf>.
- Ministero della Salute, 2007 "Guadagnare salute": Italia. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 maggio 2007. Guadagnare salute. Rendere facili le scelte salutari. Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2007. [http://www.ministerosalute.it/imgs/C\\_17\\_pubblicazioni\\_605\\_allegato.pdf](http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_605_allegato.pdf).

### Epidemiologia della situazione nutrizionale e progressione sovrappeso/obesità

- WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative: overweight and obesity among 6–9-year-old children - Report of the third round of data collection 2012–2013. WHO 2018. Disponibile al seguente indirizzo: [https://www.euro.who.int/\\_\\_data/assets/pdf\\_file/0010/378865/COSI-3.pdf](https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/378865/COSI-3.pdf).
- Childhood Obesity Surveillance Initiative HIGHLIGHTS 2015-17. Disponibile al seguente indirizzo: [https://www.euro.who.int/\\_\\_data/assets/pdf\\_file/0006/372426/WH14\\_COSI\\_factsheets\\_v2.pdf](https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/372426/WH14_COSI_factsheets_v2.pdf).
- NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9 million children, adolescents, and adults. *Lancet*. 2017;390(10113):2627-2642.

- Lauria L, Spinelli A, Buoncristiano M, Nardone P. Decline of childhood overweight and obesity in Italy from 2008 to 2016: results from 5 rounds of the population-based surveillance system. *BMC Public Health*. 2019 May 21;19(1):618
- Spinelli A, Buoncristiano M, Kovacs VA, et al.; Prevalence of Severe Obesity among Primary School Children in 21 European Countries. *Obes Facts*. 2019;12(2):244-258
- Nardone P, Spinelli A, Buoncristiano M, Lauria L, Pierannunzio D, e Galeone D. Il sistema di sorveglianza OKkio alla SALUTE: risultati 2016. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2018. (Supplemento 1, al vol. 31 n. 7-8 del Notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità).

### IMC: curve di riferimento e studi pregressi

- Cacciari E, Milani S, Balsamo A, et al. Italian cross-sectional growth charts for height, weight and BMI (2 to 20 yr). *J. Endocrinol. Invest*. 2014;29(7):581-593.
- Gonzalez-Casanova I, Sarmiento OL, Gazmararian JA, Cunningham SA, Martorell R, Pratt M, Stein AD. Comparing three body mass index classification systems to assess overweight and obesity in children and adolescents. *Rev Panam Salud Publica*. 2013;33(5):349-55.
- de Onis M, Martínez-Costa C, Núñez F, Nguefack-Tsague G, Montal A, Brines J. Association between WHO cut-offs for childhood overweight and obesity and cardiometabolic risk. *Public Health Nutr*. 2013;16(4):625-30.
- Cole TJ, Lobstein T. Extended international (IOTF) body mass index cut-offs for thinness, overweight and obesity. *Pediatric Obesity* 2012; 7:284–294.
- Rolland-Cachera MF. Towards a simplified definition of childhood obesity? A focus on the extended IOTF references. *Pediatr. Obes*. 2012;7(4):259-60.
- de Onis M, Onyango A, Borghi E, Siyam A, Blössner M, Lutter C. Worldwide implementation of the WHO Child Growth Standards. *Public Health Nutr*. 2012;15(9):1603-10.
- Katzmarzyk PT, Shen W, Baxter-Jones A, Bell JD, Butte NF, Demerath EW, Gilsanz V, Goran MI, Hirschler V, Hu HH, Maffei C, Malina RM, Müller MJ, Pietrobelli A, Wells JC. Adiposity in children and adolescents: correlates and clinical consequences of fat stored in specific body depots. *Pediatric obesity* 2012;7(5):e42-61.
- Monasta L, Lobstein T, Cole TJ, Vignierová J, Cattaneo A. Defining overweight and obesity in pre-school children: IOTF reference or WHO standard? *Obes Rev*. 2011;12(4):295-300.
- Rolland-Cachera MF and The European Childhood Obesity Group. Childhood obesity: current definitions and recommendations for their use. *International Journal of Pediatric Obesity*, 2011; 6: 325–331.
- de Onis M, Lobstein T. Defining obesity risk status in the general childhood population: which cut-offs should we use? *Int. J. Pediatr. Obes*. 2010;5(6):458-60.
- WHO AnthroPlus for personal computers Manual: Software for assessing growth of the world's children and adolescents. Geneva: WHO, 2009.
- Cole TJ, Flegal KM, Nicholls D, Jackson AA. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. *BMJ* 2007; 28 (335):194.

- de Onis M, Onyango AW, Borghi E, Siyam A, Nishida C, Siekmann J. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. *Bulletin of the World Health Organization* 2007;85:660–667.
- Kuczmarski RJ, Ogden CL, Guo SS, et al. 2000 CDC growth charts for the United States: methods and development. *Vital Health Stat* 11 2002;246:1–190.
- Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: International survey. *BMJ* 2000; 320:1240-1243.

