


Consumo di alcol

Dati HBSC, anno 2010


Dati PASSI, triennio 2007-09

Dati PASSI d'Argento, indagine 2009


Rapporto non corretto con l'alcol dai ragazzi agli ultra 64enni




Rapporto non corretto con l'alcol dai ragazzi agli ultra 64enni per sesso e classi d'età



Consumo *binge* dagli 11 ai 69 anni



Consumo *binge* dagli 11 ai 69 anni per sesso e classe d'età



Attività fisica


Dati OKkio, anno 2010

Dati HBSC, anno 2010

Dati PASSI, triennio 2007-09


Dati PASSI d'Argento, indagine 2009

Non attivi



Diapo alternativa alla precedente; vedi nota

Non attivi



Abitudine al fumo di sigaretta

Dati HBSC, anno 2010

Dati PASSI, triennio 2007-09


Dati PASSI d'Argento, indagine 2009

Abitudine al fumo per età

HBSC (11-15 anni): 9%


PASSI (18-69 anni): 30%

PASSI d'Argento (65 anni e oltre): 10%



Emilia-Romagna – HBSC 2010, PASSI triennio 2007-09 e PASSI e d'Argento 2009

Abitudine al fumo per sesso e classi d'età



Stato nutrizionale


Dati OKkio, anno 2010

Dati HBSC, anno 2010


Dati PASSI, triennio 2007-09

Dati PASSI d'Argento, indagine 2009


Eccesso ponderale dagli 8 anni agli ultra 64enni




Eccesso ponderale dagli 8 anni agli ultra 64enni



Sovrappeso e obesità dagli 8 anni agli ultra 64enni



Sovrappeso dagli 8 anni agli ultra 64enni



Obesità

dagli 8 anni agli ultra 64enni

