

Le disuguaglianze sociali nei comportamenti a rischio di PASSI a confronto con altre fonti informative

Teresa Spadea, Raffaella Rusciani
S. C. a D. U. Servizio Sovrazonale di Epidemiologia
ASL TO3 Regione Piemonte



Coordinamento nazionale Passi – 29 marzo 2012

Le disuguaglianze sociali nei comportamenti a rischio di PASSI a confronto con la Multiscopo Istat

Teresa Spadea, Raffaella Rusciani
S. C. a D. U. Servizio Sovrazonale di Epidemiologia
ASL TO3 Regione Piemonte



Coordinamento nazionale Passi – 29 marzo 2012

Confronto Multiscopo-Passi

Multiscopo Salute

- Indagine quinquennale
- Campione di famiglie estratto da Anagrafe residenti
- Rappresentativo a livello di Area Vasta
- Intervista di persona con operatori Istat e autocompilazione

Passi

- Sorveglianza continua
- Campione di individui 18-64 anni estratti da Anagrafe assistiti
- Rappresentativo a livello di ASL
- Intervista telefonica con operatori SSN




Metodi dell'analisi di confronto


- Multiscopo Istat Salute – anni 2004-05
- Stessa classe di età (18-69), stessi indicatori di esito (tranne alcol, screening colon-retto e depressione)
- Indicatori di SES presi singolarmente (istruzione e difficoltà economiche)
- Prevalenze grezze per sesso e fascia di età (dati Passi da appendice online)















Abitudine al fumo per livello d'istruzione




Abitudine al fumo per livello d'istruzione








Pap-test negli ultimi 3 anni per livello d'istruzione



Salute percepita per livello d'istruzione



Risultati in sintesi

- Stime di prevalenza spesso più alte in Passi che in Multiscopo
- Discordanze generalmente maggiori nelle classi di età più giovani
- Stime del gradiente sociale relativamente simili
- Discordanze maggiori con l'istruzione che con le difficoltà economiche

Possibili artefatti "statistici"

- Maggiori differenze in gruppi meno numerosi (giovani meno istruiti) → intervalli di confidenza
- Confondimento o interazione con ripartizione geografica → da verificare
- Domande diverse → poco plausibile

Possibili spiegazioni

- Maggiore fiducia e/o attenzione alla domanda se posta da operatori SSN piuttosto che da operatori Istat o letta da sé
- Selezione del campione Passi verso popolazione
 - ✓ più malata
 - ✓ SES più basso (es. disoccupati, casalinghe)
 - ✓ più al Nord
- ???