

I numeri della sorveglianza PASSI Asl 3 Genovese 2008-2011

Autori

Rosamaria Cecconi, Claudio Culotta, Patrizia Crisci, Alessandra Battistella, Alice Caielli, Raffaella Castiglia
Asl 3 Genovese - Dipartimento di Prevenzione, Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica, Epidemiologia

Sistema di Sorveglianza PASSI ASL 3 Genovese:

Coordinatore aziendale	Rosamaria Cecconi	ASL 3 Genovese, Dipartimento di Prevenzione, Epidemiologia
Intervistatrici	Alice Caielli Raffaella Castiglia Patrizia Crisci	Dipartimento di Prevenzione, Epidemiologia
	Maria Concetta Curti Luciana Frigerio Gabriella Maggiali Caterina Manca Claudia Marchese Luciana Musti	Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali, S.C. Attività Consultoriali

Referente regionale	Roberto Carloni	ARS Liguria, Area Epidemiologia e Prevenzione
Coordinatore regionale	Claudio Culotta	ASL 3 Genovese, Dipartimento di Prevenzione, Epidemiologia

Si ringraziano:

- ***il Direttore Generale e il Direttore Sanitario della ASL 3 Genovese***
- ***i Medici di Medicina Generale per la preziosa collaborazione fornita***
- ***il Gruppo Tecnico Nazionale del Sistema di sorveglianza PASSI per il continuo supporto***
- ***il Gruppo Tecnico Regionale del Sistema di sorveglianza PASSI***

Un ringraziamento particolare a tutte le persone intervistate, che ci hanno generosamente dedicato tempo e attenzione

PASSI (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia) è un sistema di sorveglianza della popolazione adulta. L'obiettivo è stimare la frequenza e l'evoluzione dei fattori di rischio per la salute, legati ai comportamenti individuali, oltre alla diffusione delle misure di prevenzione. Tutte le 21 Regioni o Province Autonome hanno aderito al progetto. Un campione di residenti di età compresa tra 18 e 69 anni viene estratto con metodo casuale semplice, stratificato per sesso e classi di età, dagli elenchi delle anagrafi sanitarie. Personale delle Asl, specificamente formato, effettua interviste telefoniche (circa 30 al mese nella nostra Asl) con un questionario standardizzato. I dati vengono poi trasmessi in forma anonima via internet e registrati in un archivio unico nazionale. A dicembre 2012, sono state caricate complessivamente oltre 210 mila interviste. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epicentro.iss.it/passi

Premessa

Scopo di questa pubblicazione è quello di fornire agli operatori del “Sistema Salute” le informazioni potenzialmente utili per pianificare, implementare, monitorare e valutare programmi e interventi di salute. Insomma, vengono qui fornite le informazioni per l’azione.

Il Sistema di sorveglianza PASSI, che già nel suo nome stimola alla riflessione sui “Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia”, è infatti al tempo stesso profilo di salute e strumento di monitoraggio e verifica dei programmi di prevenzione delle patologie croniche messi in atto dalle Aziende e dalla Società intera.

Questo è reso possibile dalla rilevazione sistematica e continua del bisogno di salute espresso dal cittadino: le informazioni sui comportamenti e stili di vita della popolazione, ottenute telefonicamente con colloquio sanitario, costituiscono infatti l’espressione più diretta di un “bisogno di salute” ascoltato direttamente dagli operatori del Sistema Sanitario Nazionale. L’estensione capillare del Sistema (tutte le Regioni partecipano, con 148 Asl italiane) consente di effettuare confronti tra le singole Asl e tra le Regioni e di seguire i trend temporali degli indicatori di salute in studio.

Per ogni capitolo sono elencati i valori dei parametri più rappresentativi dell’analisi Passi, accompagnati da mappe in cui è possibile recuperare, a colpo d’occhio, la lettura del dato ligure nel contesto nazionale.

Il campione esaminato, 1304 persone, è rappresentativo della popolazione 18-69enne residente in Asl 3 Genovese, perché estratto in maniera casuale e proporzionale alla numerosità della popolazione presente in ogni fascia di popolazione considerata: gli approfondimenti condotti verificando la corrispondenza tra la popolazione campionata e quella censita dall’ISTAT consentono di ritenere corretta l’ “inferenza statistica”, che permette di trarre conclusioni sulla popolazione in base alle informazioni ricavate dal campione.

Ulteriori dettagli sulla metodologia seguita sono illustrati nelle note in ultima pagina.



Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Asl 3 Genovese
Dott. Lorenzo Marensi

Caratteristiche socio demografiche

Popolazione ISTAT Asl 3 Genovese al 31/12/2010 n. 736.235

○ Popolazione 18-69enne	n. 475.808
Uomini	n. 234.170
Donne	n. 241.638

%

Sesso

uomini	49,2
donne	50,8

Classi di età

18-34	24,6
35-49	35,0
50-69	40,4

○ negli uomini

18-34	25,3
35-49	35,1
50-69	39,6

○ nelle donne

18-34	24,0
35-49	34,8
50-69	41,2

Titolo di studio

Nessuno/elementare	7,1
Licenza media inferiore	25,2
Licenza media superiore	48,1
Laurea/ diploma universitario	19,7

○ negli uomini

Nessuno/elementare	7,3
Licenza media inferiore	26,1
Licenza media superiore	47,6
Laurea/ diploma universitario	19,0

○ nelle donne

Nessuno/elementare	6,8
Licenza media inferiore	24,3
Licenza media superiore	48,6
Laurea/ diploma universitario	20,4

○ nei 18-34enni

Nessuno/elementare	0,0
Licenza media inferiore	23,7
Licenza media superiore	54,8
Laurea/ diploma universitario	21,5


○ nei 35-49enni

Nessuno/elementare	1,3
Licenza media inferiore	24,1
Licenza media superiore	50,7
Laurea/ diploma universitario	23,9

○ nei 50-69enni

Nessuno/elementare	16,3
Licenza media inferiore	26,9
Licenza media superiore	41,7
Laurea/ diploma universitario	15,0

Prevalenza di scolarità medio-bassa
Pool PASSI 2008-11



Stato civile

Celibe/nubile	30,0
Coniugato/convivente	59,6
Separato/divorziato	7,6
Vedovo/a	2,8

Cittadinanza

Italiana	95,4
Straniera	4,2
Doppia	0,4

Cittadini stranieri stabilizzati:

○ per sesso

uomini	2,7
donne	5,8

○ per classi di età

18-34	6,2
35-49	5,5
50-69	1,9

○ per sesso e classi di età

Uomini

18-34	2,5
35-49	4,1
50-69	1,6

Donne

18-34	10,1
35-49	7,0
50-69	2,2

Lavoro (nelle persone fino a 65 anni)

Si	70,3
No	29,7

○ per sesso

uomini	76,4
donne	64,4

○ per classi di età

18-34	67,3
35-49	86,4
50-65	54,7

○ per sesso e classi di età

Uomini

18-34	72,2
35-49	92,9
50-65	60,6

Donne

18-34	62,3
35-49	80,1
50-65	49,5

Difficoltà economiche

Molte difficoltà	10,2
Qualche difficoltà	31,1
Nessuna	58,7


Persone che riferiscono

molte/qualche difficoltà economiche:

○ per sesso


uomini	38,0
donne	44,5

% di stranieri*
Pool PASSI 2008-11




* Sono stati esclusi dall'analisi i cittadini con doppia nazionalità

% di lavoratori regolari
Pool PASSI 2008-11



○ per classi di età		
18-34		39,9
35-49		44,1
50-65		39,8
○ per sesso e classi di età		
Uomini		
18-34		35,2
35-49		43,1
50-65		35,5
Donne		
18-34		44,7
35-49		45,1
50-65		44,0



Benessere

%

Salute percepita

Molto bene o bene	67,9
Discretamente	28,5
Male o molto male	3,6

Salute percepita come "molto bene o bene"

o per classi di età

18-34	86,0
35-49	73,9
50-69	51,8

o per sesso

Uomini	73,3
Donne	62,7

o per istruzione

Nessuno/elementare	34,8
Licenza media inferiore	61,3
Licenza media superiore	72,7
Laurea/ diploma universitario	76,7

o per cittadinanza

Italiana	68,1
Straniera	61,8
Doppia	60,0

o per difficoltà economiche

Molte difficoltà	48,9
Qualche difficoltà	64,8
Nessuna difficoltà	72,9

o per presenza di patologia cronica

Almeno una patologia	43,2
Nessuna patologia	73,0

Distribuzione del numero di giorni in cattiva salute:

o dovuti alle condizioni fisiche negli ultimi 30 giorni

0 giorni	54,7
1-13 giorni	35,7
14+ giorni	9,6

o dovuti alle condizioni psicologiche negli ultimi 30 giorni

0 giorni	59,4
1-13 giorni	27,2
14+ giorni	13,4

Distribuzione del numero di giorni in cattiva salute per cui non ha svolto le attività abituali negli ultimi 30 giorni:

0 giorni	82,5
1-13 giorni	12,8
14+ giorni	4,7

Media di giorni in cattiva salute dovuti alle condizioni fisiche negli ultimi 30 giorni

o per classi di età

18-34	2,5 giorni
35-49	3,6 giorni
50-69	4,4 giorni


o per sesso

Stato di salute percepito positivamente

Prevalenze per regione di residenza

Pool di ASL 2008-11

Totale: 67,4% (IC95%: 67,1%-67,7)



Uomini	2,9 giorni
Donne	4,4 giorni
○ per istruzione	
Nessuno/elementare	7,6 giorni
Licenza media inferiore	4,3 giorni
Licenza media superiore	3,1 giorni
Laurea/ diploma universitario	2,7 giorni
○ per difficoltà economiche	
Molte difficoltà	6,0 giorni
Qualche difficoltà	4,1 giorni
Nessuna difficoltà	3,0 giorni
○ per presenza di patologia cronica	
Almeno una patologia	6,1 giorni
Nessuna patologia	3,2 giorni
Media di giorni in cattiva salute dovuti alle condizioni psicologiche negli ultimi 30 giorni	4,6 giorni
○ per classi di età	
18-34	4,0 giorni
35-49	4,4 giorni
50-69	5,2 giorni
○ per sesso	
Uomini	3,5 giorni
Donne	5,7 giorni
○ per istruzione	
Nessuno/elementare	7,5 giorni
Licenza media inferiore	5,6 giorni
Licenza media superiore	4,1 giorni
Laurea/ diploma universitario	3,8 giorni
○ per difficoltà economiche	
Molte difficoltà	10,2 giorni
Qualche difficoltà	5,1 giorni
Nessuna difficoltà	3,4 giorni
○ per presenza di patologia cronica	
Almeno una patologia	7,0 giorni
Nessuna patologia	4,1 giorni
Media di giorni in cattiva salute per cui non ha svolto le attività abituali negli ultimi 30 giorni	1,6 giorni
○ per classi di età	
18-34	1,2 giorni
35-49	1,8 giorni
50-69	1,7 giorni
○ per sesso	
Uomini	1,6 giorni
Donne	1,6 giorni
○ per istruzione	
Nessuno/elementare	3,1 giorni
Licenza media inferiore	2,0 giorni
Licenza media superiore	1,3 giorni
Laurea/ diploma universitario	1,1 giorni
○ per difficoltà economiche	
Molte difficoltà	3,5 giorni
Qualche difficoltà	1,9 giorni
Nessuna difficoltà	1,1 giorni
○ per presenza di patologia cronica	
Almeno una patologia	2,5 giorni
Nessuna patologia	1,4 giorni

Sintomi di depressione	%
Persone con sintomi di depressione	9,8
○ per classi di età	
18-34	7,8
35-49	10,3
50-69	10,6
○ per sesso	
Uomini	7,2
Donne	12,4
○ per istruzione	
Nessuno/elementare	18,5
Licenza media inferiore	13,8
Licenza media superiore	7,3
Laurea/ diploma universitario	7,8
○ per difficoltà economiche	
Molte difficoltà	24,2
Qualche difficoltà	13,3
Nessuna difficoltà	5,5
○ per stato lavorativo	
Lavora	7,2
Non lavora	14,6
○ per presenza di patologia cronica	
Almeno una patologia	14,4
Nessuna patologia	8,9
○ per la variabile "vive solo"	
Vive solo	17,8
Non vive solo	9,1

Percezione dello stato di salute tra le persone con sintomi di depressione

Buono/molto buono	32,8
Discreto/male/molto male	67,2

Media di giorni in cattiva salute fisica negli ultimi 30 giorni

Tra le persone con sintomi di depressione	8,0 giorni
Tra le persone senza sintomi di depressione	3,2 giorni

Media di giorni in cattiva salute psichica negli ultimi 30 giorni

Tra le persone con sintomi di depressione	18,6 giorni
Tra le persone senza sintomi di depressione	3,1 giorni

Media di giorni in cattiva salute per cui non ha svolto le attività abituali negli ultimi 30 giorni


Tra le persone con sintomi di depressione	6,0 giorni
Tra le persone senza sintomi di depressione	1,1 giorni

Ricerca di aiuto tra le persone con sintomi di depressione

Ha cercato aiuto	62,4
Non ha cercato aiuto	37,6

A chi si sono rivolte le persone con sintomi di depressione


Medico/operatore sanitario	47,2
Familiari	12,0
Entrambi	3,2
Nessuno	37,6




Guadagnare salute




	%
Attività fisica	
Attivo	39,2
Parzialmente attivo	41,9
Sedentario	18,8
Sedentari	
○ per classi di età	
18-34	11,2
35-49	19,1
50-69	23,2
○ per sesso	
Uomini	18,4
Donne	19,2
○ per istruzione	
Nessuno/elementare	20,7
Licenza media inferiore	21,8
Licenza media superiore	17,5
Laurea/ diploma universitario	17,5
○ per cittadinanza	
Italiana	18,4
Straniera	23,6
○ per difficoltà economiche	
Molte difficoltà	21,1
Qualche difficoltà	20,7
Nessuna difficoltà	17,4



Domande rivolte dai sanitari alla popolazione generale sull'attività fisica svolta	
Chiesto se fa attività fisica	35,2
Suggerito di fare attività fisica	32,6
Tra i sotto/normopeso	26,0
Tra i sovrappeso	40,7
Tra gli obesi	61,4
Come viene percepito il proprio livello di attività fisica	
○ percezione sufficiente	
Tra gli attivi	63,7
Tra i parzialmente attivi	42,2
Tra i sedentari	14,3
○ percezione non sufficiente	
Tra gli attivi	36,3
Tra i parzialmente attivi	57,8
Tra i sedentari	85,7
Stile di vita sedentario e presenza di altri fattori di rischio	
Depressione	26,6
Ipertensione	21,5
Sovrappeso/obesità	20,8
Fumo	20,7



	%
Situazione Nutrizionale	
Sottopeso	3,8
Normopeso	62,7
Sovrappeso	26,4
Obeso	7,2
Sovrappeso	
○ per classi di età	
18-34	15,6
35-49	23,7
50-69	35,3
○ per sesso	
Uomini	34,6
Donne	18,4
○ per istruzione	
Nessuno/elementare	42,4
Licenza media inferiore	32,0
Licenza media superiore	22,8
Laurea/ diploma universitario	22,2
○ per cittadinanza	
Italiana	26,8
Straniera	20,0
○ per difficoltà economiche	
Molte difficoltà	29,3
Qualche difficoltà	26,1
Nessuna difficoltà	26,0
Obesi	
○ per classi di età	
18-34	3,4
35-49	7,5
50-69	9,3
○ per sesso	
Uomini	8,0
Donne	6,5
○ per istruzione	
Nessuno/elementare	19,6
Licenza media inferiore	7,3
Licenza media superiore	6,4
Laurea/ diploma universitario	4,7
○ per cittadinanza	
Italiana	7,1
Straniera	7,3
○ per difficoltà economiche	
Molte difficoltà	15,0
Qualche difficoltà	6,2
Nessuna difficoltà	6,4
Autopercezione del peso	
○ Troppo basso	
Tra i sotto/normopeso	5,7
uomini	8,2
donne	3,8
Tra i sovrappeso	1,5
uomini	1,4
donne	1,6
Tra gli obesi	1,1
uomini	0,0
donne	2,3



○ Più o meno giusto	
Tra i sotto/normopeso	82,3
uomini	86,4
donne	79,3
Tra i sovrappeso	39,2
uomini	46,4
donne	26,2
Tra gli obesi	9,6
uomini	13,7
donne	4,7
○ Troppo alto	
Tra i sotto/normopeso	12,0
uomini	5,4
donne	16,9
Tra i sovrappeso	59,3
uomini	52,3
donne	72,1
Tra gli obesi	89,4
uomini	86,3
donne	93,0

Domande rivolte dai sanitari alle persone in eccesso ponderale

○ Consiglio di perdere peso	58,7
Tra i sovrappeso	52,7
Tra gli obesi	79,8

Tra chi ha ricevuto il consiglio di perdere peso, quanti stanno facendo una dieta

Tra chi non ha ricevuto il consiglio di perdere peso, quanti stanno facendo una dieta 13,9

○ Consiglio di fare attività fisica	45,3
Tra i sovrappeso	40,7
Tra gli obesi	61,4

Tra chi ha ricevuto il consiglio di fare attività fisica, quanti svolgono almeno attività fisica moderata

Tra chi non ha ricevuto il consiglio di fare attività fisica, quanti svolgono almeno attività fisica moderata 74,5


Tra le persone in eccesso ponderale, quanti stanno seguendo una dieta	30,4
○ per stato nutrizionale	
Sovrappeso	27,3
Obeso	41,5

○ per sesso	
Uomini	27,8
Donne	34,5

○ per auto percezione del proprio peso (solo tra i sovrappeso)	
Più o meno giusto	18,5
Troppo alto	33,3

○ per cittadinanza	
Italiana	7,1
Straniera	7,3

○ per difficoltà economiche	
Molte difficoltà	15,0
Qualche difficoltà	6,2
Nessuna difficoltà	6,4



Attività fisica per stato nutrizionale

o **Almeno attività moderata**

Sovrappeso 81,9

Obeso 69,1

o **Sedentario**

Sovrappeso 18,1

Obeso 30,9

Cambiamenti ponderali

o **Perso 1 o + Kg**

o **per stato nutrizionale**

Sotto/normopeso 17,2

Sovrappeso 20,2

Obesi 30,4

o **per classe di età**

18-34 21,8

35-49 16,6

50-69 19,2

o **per sesso**

Uomini 16,9

Donne 20,9

o **Stabile**

o **per stato nutrizionale**

Sotto/normopeso 67,1

Sovrappeso 50,9

Obesi 42,4

o **per classe di età**

18-34 53,2

35-49 65,5

50-69 62,0

o **per sesso**

Uomini 65,8

Donne 56,5

o **Aumentato 2 o + Kg**

o **per stato nutrizionale**

Sotto/normopeso 15,7

Sovrappeso 28,9

Obesi 27,2

o **per classe di età**

18-34 25,0

35-49 17,9

50-69 18,8

o **per sesso**

Uomini 17,3

Donne 22,6

Numero di porzioni di frutta e verdura al giorno


0 2,1

1-2 36,3

3-4 41,4

5 o più 20,2

Adesione al *five-a-day* Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11 Totale: 9,8% (IC95%: 9,6-10,0%)



Quante persone mangiano almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno:

○ per classi di età	
18-34	13,7
35-49	17,5
50-69	26,4
○ per sesso	
Uomini	15,8
Donne	24,4
○ per istruzione	
Nessuno/elementare	25,0
Licenza media inferiore	20,1
Licenza media superiore	19,9
Laurea/ diploma universitario	19,1
○ per cittadinanza	
Italiana	20,2
Straniera	18,2
○ per difficoltà economiche	
Molte difficoltà	16,5
Qualche difficoltà	18,0
Nessuna difficoltà	22,0
○ per stato nutrizionale	
Sotto/normopeso	20,0
Sovrappeso	21,2
Obeso	18,1

Consumo di alcol

Consumata almeno una unità alcolica negli ultimi 30 gg	64,9
Consumo fuori pasto	9,9
Consumo abituale elevato	6,1
Consumo "binge" (2010-2011)	9,4
Consumo a "maggior rischio" § (2010-2011)	21,6

§ Viene considerato bevitore a maggior rischio:

- *Il binge drinker*: definizione 2010-11: chi ha bevuto nell'ultimo mese almeno una volta 5 o più (per uomini) e 4 o più (per donne) unità di bevanda alcolica in un'unica occasione
- e/o chi beve prevalentemente o solo *fuori pasto*
- e/ o il *forte bevitore*: chi eccede nel bere superando le soglie del consumo moderato, anche una sola volta nell'ultimo mese: due unità al giorno se maschi e una unità al giorno, se femmina.

Una unità di bevanda alcolica equivale a una lattina di birra o un bicchiere di vino o un bicchierino di liquore.

Consumo a maggior rischio (2010-11)

○ per classi di età

18-24	33,3
25-34	34,2
35-49	21,5
50-69	14,1

○ per sesso

Uomini	24,5
Donne	18,7

○ per istruzione

Bassa	21,8
Alta	21,5

○ per difficoltà economiche

Molte difficoltà	32,1
Qualche difficoltà	20,7
Nessuna difficoltà	20,6

○ per cittadinanza

Italiana	22,2
Straniera	10,7

Consumo "binge" (2010-11)

○ per classi di età

18-24	11,1
25-34	17,1
35-49	11,4
50-69	4,1

○ per sesso

Uomini	10,6
Donne	8,2

○ per istruzione

Bassa	7,4
Alta	10,3

○ per difficoltà economiche

Molte difficoltà	14,3
Qualche difficoltà	9,1
Nessuna difficoltà	8,8


○ per cittadinanza

Italiana	9,5
Straniera	7,1

Consumo a maggior rischio

Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2010-11

Totale: 17,0% (IC95%: 16,7%-17,3%)




In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione

Consumo binge

Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2010-11

Totale: 8,6% (IC95%: 8,4%-8,9%)



In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione

Domande rivolte dai sanitari sul consumo

Chiesto quanto beve 17,0

Suggerito di bere meno 2,5

○ Tra chi beve a maggior rischio 5,5

○ Tra chi beve fuori pasto 4,7

○ Tra chi beve "binge" 1,6


○ Tra chi ha un consumo 7,5

abituale elevato

Consumo di alcol chiesto dal medico

Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11

Totale: 15,2% (IC95%: 14,9%-15,4%)




In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria

Guida sotto l'effetto dell'alcol	10,9
Trasportato da un conducente sotto l'effetto dell'alcol	7,3

Guida sotto l'effetto dell'alcol	
○ per classi di età	
18-24	9,3
25-34	12,1
35-49	9,9
50-69	11,8
○ per sesso	
Uomini	15,7
Donne	3,3
○ per istruzione	
Bassa	10,7
Alta	11,0
○ per difficoltà economiche	
Molte difficoltà	2,8
Qualche difficoltà	13,2
Nessuna difficoltà	11,0
○ per cittadinanza	
Italiana	11,0
Straniera	5,6

Fermato dalle forze dell'ordine per un controllo	33,7
Se è stato fermato, quante volte è stato fermato negli ultimi 12 mesi	2,3 volte
Effettuato etilotest	14,5

Guida sotto l'effetto dell'alcol
Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11
Totale: 10,3% (IC95%: 10,1%-10,6%)




In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione

Fermato dalle forze dell'ordine per un controllo
Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2010-11
Totale: 35,0% (IC95%: 34,7%-35,5%)





In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione

Etilotest effettuato al guidatore
Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2010-11
Totale: 11,1% (IC95%: 10,7%-11,5%)



In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione

	%
Abitudine al fumo	
Fumatore	27,9
Occasionale	0,6
Quotidiano	25,8
In astensione	1,5
Ex fumatore	23,2
Non fumatore	48,8
Fumatore:	
○ per classi di età	
18-24	31,3
25-34	40,2
35-49	28,7
50-69	21,6
○ per sesso	
Uomini	32,3
Donne	23,7
○ per istruzione	
Nessuno/elementare	23,9
Licenza media inferiore	35,7
Licenza media superiore	25,8
Laurea/ diploma universitario	24,5
○ per difficoltà economiche	
Molte difficoltà	44,4
Qualche difficoltà	28,3
Nessuna difficoltà	24,8
○ per cittadinanza	
Italiana	28,4
Straniera	16,4
Media del numero di sigarette fumate al dì	12,7 sigarette al dì
Forti fumatori (oltre 20 sigarette al dì)	7,8
Chiesto da un operatore sanitario se fuma	41,5
Tra i fumatori	64,0
Tra gli ex fumatori	44,7
Tra i non fumatori	27,3
Consigliato si smettere di fumare, ai fumatori	50,3
A scopo preventivo	16,0
Per motivi di salute	19,6
Per entrambe le ragioni	14,7
Tentativo di smettere di fumare	40,9
Fallito	78,1
In corso	12,3
Riuscito	9,7
Modalità con cui ha tentato di smettere chi ha provato	
Da solo	89,7
Corsi ASL	1,3
Farmaci	3,9
Altri corsi	1,9
Altro	3,2



Fumo Passivo

Rispetto del divieto di fumo nei locali pubblici

Rispettato sempre 70,8

Rispettato quasi sempre 19,5

Rispettato a volte 7,4

Rispettato mai 2,2

Rispetto del divieto di fumo sul luogo di lavoro

Rispettato sempre 70,5

Rispettato quasi sempre 16,5

Rispettato a volte 7,9

Rispettato mai 5,1

Fumo in casa

Non si fuma 69,8

Si fuma in certe stanze, orari o situazioni 23,6

Si fuma sempre 6,6

Fumo in casa in presenza di minori di 14 anni

Non si fuma 79,7


Si fuma in certe stanze, orari o situazioni 19,7

Si fuma sempre 0,7

Fumatori che hanno ricevuto il consiglio di smettere di fumare

Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11

Pool di Asl: 56,8% (IC95%: 56,1-57,5%)




In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione

Divieto di fumo in casa

Prevalenze per Regione di residenza - Passi 2008-11

Pool di Asl: 74,5% (IC95%: 74,2%-74,8%)




In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione

Percezione del rispetto del divieto di fumo nei luoghi di lavoro

Prevalenze per Regione di residenza - Passi 2008-11


Pool di Asl: 88,7% (IC95%: 88,4%-89,0%)



In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione


Rischio Cardiovascolare

	%
Ipertensione Arteriosa	
Ultima rilevazione della pressione arteriosa	
Meno di due anni fa	89,7
Più di due anni fa	7,5
Mai	2,8
○ per classi di età	
18-34	
Meno di due anni fa	88,8
Più di due anni fa	7,8
Mai	3,4
35-49	
Meno di due anni fa	86,4
Più di due anni fa	10,1
Mai	3,5
50-69	
Meno di due anni fa	93,2
Più di due anni fa	5,1
Mai	1,7
○ per sesso	
Uomini	
Meno di due anni fa	90,2
Più di due anni fa	7,2
Mai	2,7
Donne	
Meno di due anni fa	89,3
Più di due anni fa	7,8
Mai	2,9
○ per istruzione	
Nessuno/elementare	
Meno di due anni fa	90,2
Più di due anni fa	8,7
Mai	1,1
Licenza media inferiore	
Meno di due anni fa	89,3
Più di due anni fa	6,7
Mai	4,0
Licenza media superiore	
Meno di due anni fa	89,2
Più di due anni fa	8,3
Mai	2,6
Laurea/ diploma universitario	
Meno di due anni fa	91,4
Più di due anni fa	6,2
Mai	2,3
○ per difficoltà economiche	
Molte difficoltà	
Meno di due anni fa	89,5
Più di due anni fa	9,0



Mai	1,5
Qualche difficoltà	
Meno di due anni fa	87,9
Più di due anni fa	7,4
Mai	4,7
Nessuna difficoltà	
Meno di due anni fa	90,7
Più di due anni fa	7,3
Mai	2,0
○ per cittadinanza	
Italiana	
Meno di due anni fa	89,9
Più di due anni fa	7,7
Mai	2,4
Straniera	
Meno di due anni fa	85,5
Più di due anni fa	5,5
Mai	9,1
Persone con diagnosi riferita di ipertensione	
Ipertesi	21,7
○ per classi di età	
18-34	5,2
35-49	14,8
50-69	37,5
○ per sesso	
Uomini	23,1
Donne	20,3
○ per istruzione	
Nessuno/elementare	49,5
Licenza media inferiore	25,4
Licenza media superiore	16,9
Laurea/ diploma universitario	18,7
○ per difficoltà economiche	
Molte difficoltà	28,2
Qualche difficoltà	18,9
Nessuna difficoltà	22,0
○ per stato nutrizionale	
Sottopeso/normopeso	11,6
Sovrappeso/obeso	41,0
○ per cittadinanza	
Italiana	21,9
Straniera	16,0
Trattamenti dell'ipertensione consigliati dal medico	
Trattamento farmacologico	69,1
Ridurre il consumo di sale	82,5
Attività fisica regolare	80,0
Perdita/controllo del peso	74,9

	%
Colesterolo	
Persone a cui è stato misurato almeno una volta il colesterolo	
Si	85,3
Ultima rilevazione del colesterolo	
Negli ultimi 12 mesi	61,7
Tra uno e due anni fa	15,3
Più di due anni fa	8,4
Mai	14,7
Persone a cui è stato misurato almeno una volta il colesterolo	
○ per classi di età	
18-34	66,7
35-49	87,3
50-69	94,9
○ per sesso	
Uomini	83,0
Donne	87,5
○ per istruzione	
Nessuno/elementare	94,6
Licenza media inferiore	82,3
Licenza media superiore	85,3
Laurea/diploma universitario	85,6
○ per difficoltà economiche	
Molte difficoltà	82,0
Qualche difficoltà	86,2
Nessuna difficoltà	85,4
○ per cittadinanza	
Italiana	85,7
Straniera	74,5
Ipercolesterolemia riferita	
29,9	
○ per classi di età	
18-34	11,7
35-49	28,1
50-69	39,0
○ per sesso	
Uomini	29,1
Donne	30,5
○ per istruzione	
Nessuno/elementare	35,6
Licenza media inferiore	34,8
Licenza media superiore	26,4
Laurea/diploma universitario	30,0
○ per difficoltà economiche	
Molte difficoltà	33,0
Qualche difficoltà	25,7




Nessuna difficoltà	31,5
○ per stato nutrizionale	
Sottopeso/normopeso	25,9
Sovrappeso/obeso	36,8
○ per cittadinanza	
Italiana	29,8
Straniera	26,8

Trattamenti dell'ipercolesterolemia consigliati dal medico

Trattamento farmacologico	23,8
Ridurre il consumo di carne/formaggi	85,8
Attività fisica regolare	76,8
Aumentare il consumo di frutta e verdura	73,8
Perdita/controllo del peso	72,9

Calcolo del rischio cardiovascolare

Persone a cui è stato calcolato il punteggio del rischio cardiovascolare	3,6
○ per classi di età	
35-39	1,5
40-49	3,2
50-59	3,2
60-69	5,8
○ per sesso	
Uomini	3,6
Donne	3,6
○ per istruzione	
Bassa (nessuno/elementare o licenza media inferiore)	5,0
Alta (licenza media superiore o laurea/diploma universitario)	2,9
○ per difficoltà economiche	
Si (molte/qualche difficoltà)	3,1
No (nessuna difficoltà)	4,0
○ per presenza di fattori di rischio cardiovascolare (fumo, ipercolesterolemia, ipertensione, eccesso ponderale e diabete)	
Si	4,7
No	1,1
○ per cittadinanza	
Italiana	3,6
Straniera	6,1



Sicurezza

%

Sicurezza stradale

Persone intervistate che riferiscono di usare sempre la cintura anteriore di sicurezza 96,1

Persone intervistate che riferiscono di usare sempre la cintura posteriore di sicurezza 39,8

Persone intervistate che riferiscono di indossare sempre il casco (tra coloro che vanno in moto) 99,8

Caratteristiche di chi usa le cinture posteriori

○ **per classi di età**

18-24	29,2
25-34	25,1
35-49	43,4
50-69	46,0

○ **per sesso**

Uomini	40,0
Donne	39,6

○ **per istruzione**

Nessuno/elementare	43,3
Licenza media inferiore	39,9
Licenza media superiore	42,4
Laurea/ diploma universitario	34,3

○ **per difficoltà economiche**

Molte difficoltà	39,4
Qualche difficoltà	42,6
Nessuna difficoltà	38,4


○ **per cittadinanza**

Italiana	39,5
Straniera	42,6

Uso della cintura anteriore sempre

Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11


Totale: 83,1% (IC95%: 82,9%-83,4)



Uso della cintura posteriore sempre

Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11


Totale: 19,1% (IC95%: 18,9%-19,4)



Uso del casco sempre

Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11

Totale: 94,3% (IC95%: 93,9%-94,6)



Sicurezza domestica

Qual è la possibilità di subire un infortunio in ambiente domestico

Alta/Molto Alta	8,7
Assente/Bassa	91,3

Distribuzione della possibilità "alta/molto alta" di subire infortuni domestici

○ per classi di età

18-34	8,4
35-49	10,7
50-69	7,2

○ per sesso

Uomini	7,8
Donne	9,7

○ per istruzione

Nessuno/elementare	6,5
Licenza media inferiore	8,8
Licenza media superiore	9,4
Laurea/ diploma universitario	7,8

○ per difficoltà economiche

Molte difficoltà	11,3
Qualche difficoltà	10,3
Nessuna difficoltà	7,5

○ per cittadinanza

Italiana	8,7
Straniera	10,9

Distribuzione della possibilità "alta/molto alta" di subire infortuni domestici per presenza di persone potenzialmente a rischio

Anziani/Bambini	13,6
-----------------	------

Non presenza di anziani/bambini	6,7
---------------------------------	-----


Persone che hanno subito un	2,8
------------------------------------	------------

infortunio domestico per il quale sono dovuti ricorrere alle cure del medico di famiglia, del pronto soccorso o dell'ospedale

Bassa percezione del rischio di infortunio domestico

Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11


Totale: 93,1% (IC95%: 93,0%-93,3)



In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione

Programmi di prevenzione

	%
Diagnosi precoce del tumore del collo dell'utero	
Quante donne hanno eseguito un pap test/hpv in accordo con le linee guida	82,2
Distribuzione delle donne 25-64enni che hanno eseguito un pap test negli ultimi tre anni:	
○ per classi di età	
25-34	79,0
35-49	87,4
50-64	78,1
○ per stato civile	
Coniugata	85,0
Non coniugata	77,4
○ per stato di convivenza	
Convivente	85,3
Non convivente	75,4
○ per istruzione	
Nessuno/elementare	48,1
Licenza media inferiore	78,7
Licenza media superiore	86,2
Laurea/ diploma universitario	84,4
○ per difficoltà economiche	
Molte difficoltà	81,4
Qualche difficoltà	79,3
Nessuna difficoltà	84,4
○ per cittadinanza	
Italiana	82,0
Straniera	82,4
Percentuale di donne 25-64enni che hanno eseguito un pap test/hpv negli ultimi tre anni all'interno dei programmi di screening organizzati	10,5
Percentuale di donne 25-64enni che hanno eseguito un pap test/hpv negli ultimi tre anni al di fuori dei programmi di screening organizzati	71,6
Periodicità di esecuzione del pap test/hpv	
Ultimo anno	54,8
Da uno a tre anni	27,5
Più di tre anni	10,3
Mai eseguito	7,5
Percentuale di donne che riferiscono di aver ricevuto la lettera dalla ASL	4,6
Percentuale di donne che riferiscono di aver ricevuto il consiglio dal medico	66,3
Percentuale di donne che hanno visto/sentito la campagna informativa	58,1
Distribuzione del numero di interventi informativi recepiti dalle donne del campione	
0 interventi	13,3
1 intervento	46,3
2 interventi	38,3
3 interventi	2,0



Interventi di promozione e effettuazione del pap test/hpv negli ultimi tre anni

0 interventi	70,8
1 intervento	80,7
2 interventi	90,3
3 interventi	90,9

Costi del pap test/hpv in tre categorie

Pagamento ticket	24,0
Pagamento intero	63,1
Nessun pagamento	12,8


Costi del pap test/hpv in due categorie

Ha pagato	87,2
Non ha pagato	12,8

Distribuzione dei motivi di non effettuazione dell'esame

Penso di non averne bisogno	20,6
Pigrizia	19,6
Già operata/altri motivi sanitari	12,4
Non ho avuto tempo	9,3
Nessuno me l'ha consigliato	8,2
E' difficile prendere contatti con la ASL	4,1
Mi sento imbarazzata	2,1
Ho paura dei risultati dell'esame	2,1
E' fastidioso/doloroso	1,0
No in età target	1,0
Altro	19,6
Non so/non ricordo	1,0

	%
Diagnosi precoce del tumore della mammella	
Percentuale di donne 50-69enni che hanno effettuato la mammografia negli ultimi due anni	70,6
Distribuzione delle donne 50-69enni che hanno effettuato la mammografia negli ultimi due anni	
○ per classi di età	
50-59	71,9
60-69	69,0
○ per stato civile	
Coniugata	73,2
Non coniugata	62,7
○ per stato di convivenza	
Convivente	75,0
Non convivente	59,2
○ per istruzione	
Nessuno/elementare	50,0
Licenza media inferiore	68,4
Licenza media superiore	76,7
Laurea/ diploma universitario	78,9
○ per difficoltà economiche	
Molte difficoltà	45,5
Qualche difficoltà	68,6
Nessuna difficoltà	77,1
○ per cittadinanza	
Italiana	70,9
Straniera	60,0
Percentuale di donne 40-49enni (fascia <i>pre-screening</i>) che hanno effettuato la mammografia almeno una volta nella vita	76,5
Età media alla prima mammografia preventiva in donne 40-49enni	39,6
Percentuale di donne 50-69enni che hanno aderito allo screening organizzato	29,6
Percentuale di donne 50-69enni che hanno aderito allo screening spontaneamente	40,7
Periodicità di esecuzione della mammografia	
Negli ultimi 12 mesi	43,8
Tra uno e due anni fa	26,8
Più di due anni fa	19,5
Mai eseguito	9,9
Percentuale di donne 50-69enni che hanno ricevuto la lettera di invito dalla ASL	32,2
Percentuale di donne 50-69enni che hanno ricevuto il consiglio dal medico	72,1
Percentuale di donne 50-69enni che hanno visto/sentito la campagna informativa	74,4



Distribuzione del numero totale di interventi informativi che le donne hanno ricevuto

0 interventi	8,1
1 intervento	26,1
2 interventi	44,9
3 interventi	21,0

Interventi di promozione e di effettuazione della mammografia negli ultimi due anni

0 interventi	31,8
1 intervento	57,7
2 interventi	81,8
3 interventi	77,2

Costi della mammografia in tre categorie

Pagamento ticket	41,1
Pagamento intero	16,8
Nessun pagamento	42,1

Costi della mammografia in due categorie

Ha pagato	57,9
Non ha pagato	42,1

Distribuzione dei motivi di non effettuazione dell'esame

Pigrizia	13,9
Penso di non averne bisogno	12,7
Ho paura dei risultati dell'esame	11,4
Già operata/altri motivi sanitari	8,9
Non ho avuto tempo	7,6
Nessuno me l'ha consigliato	6,3
E' difficile prenotare l'esame	6,3
E' fastidioso/doloroso	2,5
Mi sento imbarazzata	1,3
Altro	25,3
Non so/non ricordo	0,0

	%
Diagnosi precoce del tumore del colon-retto	
Prevalenza di persone 50-69enni che riferiscono di aver effettuato la ricerca di sangue occulto negli ultimi 2 anni oppure la colonscopia negli ultimi 5 anni	13,3
Prevalenza di persone 50-69enni che riferiscono di aver effettuato la ricerca di sangue occulto negli ultimi 2 anni	7,3


Distribuzione delle persone 50-69enni che riferiscono di aver effettuato la ricerca di sangue occulto negli ultimi 2 anni

○ per classi di età	
50-59	5,1
60-69	10,0
○ per sesso	
Uomini	8,8
Donne	6,4
○ per istruzione	
Nessuno/elementare	5,8
Licenza media inferiore	8,7
Licenza media superiore	6,5
Laurea/ diploma universitario	10,5
○ per difficoltà economiche	
Molte difficoltà	3,6
Qualche difficoltà	5,3
Nessuna difficoltà	9,4
○ per cittadinanza	
Italiana	7,7
Straniera	0,0

Prevalenza di persone 50-69enni che riferiscono di aver effettuato la colonscopia negli ultimi 5 anni

Distribuzione delle persone 50-69enni che riferiscono di aver effettuato la colonscopia negli ultimi 5 anni

○ per classi di età	
50-59	5,1
60-69	9,9
○ per sesso	
Uomini	9,2
Donne	6,0
○ per istruzione	
Nessuno/elementare	5,8
Licenza media inferiore	10,8
Licenza media superiore	6,0
Laurea/ diploma universitario	7,9
○ per difficoltà economiche	
Molte difficoltà	5,6
Qualche difficoltà	6,6
Nessuna difficoltà	8,3
○ per cittadinanza	
Italiana	7,5
Straniera	11,1



Periodicità di esecuzione della ricerca di sangue occulto	
Negli ultimi 12 mesi	4,5
Tra uno e due anni fa	3,1
Più di due anni fa	6,8
Mai eseguito	85,7
Periodicità di esecuzione della colonscopia	
Negli ultimi 12 mesi	3,5
Tra 1 e 5 anni fa	4,1
Tra 5 e 10 anni fa	1,7
Più di 10 anni fa	1,0
Mai eseguito	89,7
Prevalenza di persone 50-69enni che riferiscono di aver ricevuto una lettera di invito dalla ASL per l'effettuazione della ricerca del sangue occulto nelle feci 2010-2011	3,4
Prevalenza di persone 50-69enni che riferiscono di aver ricevuto il consiglio da parte di un operatore sanitario per l'effettuazione della ricerca del sangue occulto nelle feci 2010-2011	17,2
Prevalenza di persone 50-69enni che riferiscono di aver ricevuto visto o sentito campagne informative sullo screening del colon-retto 2010-2011	26,2
Distribuzione del numero di interventi informativi ricevuti dai 50-69enni	
0 interventi	62,6
1 intervento	29,3
2 interventi	7,4
3 interventi	0,7
Interventi di promozione e effettuazione della ricerca del sangue occulto nelle feci 2010-2011	
0 interventi	1,8
1 intervento	14,1
2 interventi	45,0
3 interventi	50,0
Costi per fare la ricerca di sangue occulto, sul totale delle persone che l'hanno fatta, negli ultimi 2 anni, in tre categorie	
Pagamento ticket	60,5
Pagamento intero	5,3
Nessun pagamento	34,2
Costi per fare la ricerca di sangue occulto, sul totale delle persone che l'hanno fatta, negli ultimi 2 anni, in due categorie	
Ha pagato	65,8
Non ha pagato	34,2
Costi per fare la colonscopia, sul totale delle persone, che l'hanno fatta negli ultimi 5 anni, in tre categorie	
Pagamento ticket	37,8
Pagamento intero	5,4
Nessun pagamento	56,8

Costi per fare la colonscopia, sul totale delle persone che l'hanno fatta, negli ultimi 5 anni, in due categorie


Ha pagato	43,2
Non ha pagato	56,8

Percentuale di persone 50-69enni che non hanno mai fatto una ricerca di sangue occulto (solo 2010) 83,5

Distribuzione dei motivi di non effettuazione dell'esame (solo 2010)

Nessuno me l'ha consigliato	53,6
Penso di non averne bisogno	26,4
Già fatta/consigliata colonscopia	5,0
Pigrizia	4,1
Già operata/o/altri motivi sanitari	1,8
Non ho avuto tempo	1,8
Ho paura dei risultati dell'esame	0,9
Non ho ricevuto una convocazione	0,5
E' difficile prenotare l'esame	0,5
E' fastidioso/doloroso	0,5
Mi sento imbarazzato/a	0,5
Altro	4,5
Non so/non ricordo	1,3

	%
Vaccinazione antinfluenzale	
Prevalenza di persone 18-64enni vaccinate durante le ultime 4 campagne antinfluenzali (2007-08/2008-09/2009-10/2010-11)	14,0
Distribuzione di persone 18-64enni vaccinate durante le ultime 4 campagne antinfluenzali (2007-08/2008-09/2009-10/2010-11)	
○ per classi di età	
18-34	7,2
35-49	12,4
50-64	21,2
○ per sesso	
Uomini	12,9
Donne	15,0
○ per istruzione	
Bassa	10,2
Alta	15,6
○ per difficoltà economiche	
Con difficoltà	13,0
Senza difficoltà	14,7
○ per presenza di patologia cronica	
Almeno una patologia	19,4
Nessuna patologia	13,1
○ per cittadinanza	
Italiana	13,8
Straniera	13,0
Prevalenza di persone 18-64enni affette da almeno una patologia cronica vaccinate durante le ultime 4 campagne antinfluenzali (2007-08/2008-09/2009-10/2010-11)	19,4
Distribuzione delle persone 18-64enni vaccinate durante le ultime 4 campagne antinfluenzali (2007-08/2008-09/2009-10/2010-11), per mese di vaccinazione	
Gennaio	2,9
Febbraio	1,4
Ottobre	33,3
Novembre	58,0
Dicembre	4,3



	%
<u>Vaccinazione antirosolia</u>	
Donne che riferiscono di essere state vaccinate per la rosolia	43,6
Distribuzione delle donne che riferiscono di essere state vaccinate per la rosolia	
○ per classi di età	
18-24	68,5
25-34	44,8
35-49	37,2
○ per istruzione	
Bassa	48,3
Alta	42,2
○ per difficoltà economiche	
Molte difficoltà	41,0
Qualche difficoltà	41,9
Nessuna difficoltà	45,1
○ per cittadinanza	
Italiana	43,7
Straniera	43,8
Vaccinazione antirosolia e immunità	
Immuni	71,3
Suscettibili	2,1
Immunità non nota	26,7
Donne che risultano immuni o suscettibili	
Suscettibili: non vaccinate, rubeotest negativo	2,1
Suscettibili: non vaccinate, rubeotest fatto ma risultati sconosciuti	1,5
Suscettibili: non vaccinate, rubeotest non effettuato/non so se effettuato	25,1
Immuni, vaccinate	43,6
Immuni, rubeotest positivo	27,7

Note metodologiche

Operatori sanitari delle Asl, specificamente formati, intervistano al telefono persone di 18-69 anni, residenti nel territorio aziendale. Le persone da intervistare vengono selezionate in maniera casuale, estraendo dalle liste dell'anagrafe sanitaria regionale un campione mensile stratificato proporzionale per sesso e classi d'età.

I criteri di esclusione dal campione sono:

- Assenza di telefono
- Residenza o domicilio stabile altrove
- Istituzionalizzazione (ospedale, ospizio, caserma, convento, carcere)
- Decesso
- Non conoscenza lingua italiana
- Grave disabilità psico/fisica

La rilevazione (30 interviste al mese in Asl 3 Genovese) avviene continuamente durante tutto l'anno.

I dati raccolti sono trasmessi in forma anonima via internet e registrati in un archivio unico nazionale. Il trattamento dei dati avviene secondo la normativa vigente per la tutela della privacy.

Il questionario è costituito da un nucleo fisso di domande, che esplora i principali fattori di rischio comportamentali ed interventi preventivi, da moduli opzionali, la cui somministrazione viene effettuata solo in alcune regioni e da moduli aggiuntivi, validi per tutte le regioni, che vengono somministrati in caso di eventi da esplorare in maniera tempestiva a livello nazionale.

Tra le caratteristiche del sistema di sorveglianza sono da evidenziare:

- l'essere rappresentativo della popolazione
- fornire tempestive informazioni sulle dinamiche dei fenomeni di interesse per la salute pubblica
- consentire la messa a punto di azioni correttive nei programmi di salute
- fornire un dettaglio di informazione fino al livello di Azienda Sanitaria Locale.

Il periodo di rilevazione su cui ci siamo basati va da Gennaio 2008 a Dicembre 2011. La dimensione del campione relativa al quadriennio 2008-2011 è pari a 1304 individui.

Questi numeri consentono di ottenere la stima delle principali variabili con un buon grado di approssimazione.

L'analisi delle informazioni raccolte è stata effettuata utilizzando il software EpiInfo 3.5, con metodi statistico-epidemiologici tali da fornire, oltre al dato di prevalenza della variabile analizzata, anche i limiti fiduciarî entro i quali quel valore cadrà, con un livello di probabilità prefissato al 95% (Intervallo di Confidenza al 95%).

Redazione e impaginazione a cura di:

Rosamaria Cecconi, Raffaella Castiglia
(Asl 3 Genovese, Dipartimento di Prevenzione - Epidemiologia)

Marzo 2013

Copia del volume può essere scaricata dai siti internet:

www.asl3.liguria.it
www.epicentro.iss.it

Maggiori informazioni sul Sistema di sorveglianza PASSI e i suoi prodotti possono essere reperite al link:

<http://www.epicentro.iss.it/passi/>



Dipartimento di Prevenzione
Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica
Struttura Semplice Epidemiologia