

# Sistema di sorveglianza Passi

## Vaccinazione antinfluenzale

periodo 2010-2013

### Valle d'Aosta



# Vaccinazione antinfluenzale

L'influenza costituisce un rilevante problema di sanità pubblica in particolare per le possibili gravi complicanze nei soggetti a rischio (anziani e portatori di alcune patologie croniche). L'influenza è inoltre frequente motivo di consultazione medica e di ricovero ospedaliero ed è la principale causa di assenza dalla scuola e dal lavoro, con forti ripercussioni sanitarie ed economiche sia sul singolo individuo sia sulla collettività.

Nei paesi industrializzati si stima che la mortalità da influenza rappresenti la 3° causa di morte per malattie infettive, dopo AIDS e tubercolosi.

La vaccinazione antinfluenzale nei gruppi a rischio è un'attività di prevenzione di provata efficacia: mirata a rallentare la diffusione del virus nella comunità (prevenzione collettiva) e a prevenire le complicanze (protezione individuale) così da ridurre diffusione, gravità e letalità delle epidemie stagionali.


La vaccinazione contro l'influenza è stata inserita nel Piano nazionale della Prevenzione. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali raccomanda di vaccinare almeno il 75% delle persone appartenenti alle categorie a rischio tra le quali principalmente rientrano le persone sopra ai 65 anni e le persone con almeno una patologia cronica.

## Quante persone si sono vaccinate per l'influenza durante le ultime quattro campagne antinfluenzali (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13)?

- In VdA il 7% delle persone intervistate di età 18-64 anni ha riferito di essersi vaccinato durante le ultime quattro campagne antinfluenzali (media dei 4 anni).
- Nelle persone di 18-64 anni portatrici di almeno una patologia cronica, la percentuale sale al 18%, valore di molto inferiore a quello raccomandato (75%).
- La percentuale di persone di 18-64 anni vaccinate per l'influenza è più elevata:
  - nella fascia 50-64 anni
  - nelle persone con almeno una patologia cronica
- Tra le ASL partecipanti al sistema PASSI a livello nazionale, la percentuale di persone di 18-64 anni vaccinate durante le ultime quattro campagne contro l'influenza è risultata del 12%.

### Vaccinazione antinfluenzale nelle ultime quattro campagne antinfluenzali (18-64 anni)

Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche  
ASL VdA 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13



<sup>1</sup> istruzione bassa: nessuna/elementare/media inferiore; istruzione alta: media superiore/laurea

<sup>2</sup> almeno una delle seguenti patologie: ictus, infarto e altre malattie cardiovascolari, tumori, diabete, malattie respiratorie, malattie croniche del fegato.

## Conclusioni e raccomandazioni

Per ridurre significativamente la morbosità per l'influenza e le sue complicanze è necessario raggiungere coperture vaccinali del 75% nelle fasce di popolazione a rischio. Le strategie vaccinali adottate in questi anni in Valle d'Aosta hanno permesso di raggiungere la maggior parte delle persone sopra i 65 anni senza tuttavia ottenere la copertura vaccinale auspicata.

I dati PASSI mostrano come anche nelle persone sotto i 65 anni affette da patologie croniche la copertura stimata risulta essere ancora largamente insufficiente rispetto all'obiettivo prefissato: si stima infatti che meno di una persona su cinque si sia vaccinata in questo sottogruppo a rischio.