

La valutazione del Piano di Prevenzione attraverso gli indicatori del Sistema di Sorveglianza PASSI Confronto dei dati locali rispetto all'atteso regionale 2018

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 delinea un sistema di azioni di promozione della salute e di prevenzione che accompagnano il cittadino in tutte le fasi della vita, nei luoghi di vita e di lavoro. Per misurare il progresso della prevenzione negli obiettivi di salute ritenuti prioritari, a livello nazionale sono stati individuati 10 macro obiettivi e 139 indicatori (59 qualitativi, 7 semi qualitativi, 73 quantitativi).

Tra gli indicatori quantitativi 15 sono forniti dai risultati del Sistema di Sorveglianza PASSI, suddivisi nei seguenti quattro Macro Obiettivi Centrali:

- ✓ **M.O. 1** Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili
- ✓ **M.O. 5** Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti
- ✓ **M.O. 6** Prevenire gli incidenti domestici
- ✓ **M.O. 9** Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie.

Questi indicatori non sono esaustivi dei risultati del Sistema di Sorveglianza, ma assumono il significato di indicatori "centrali" che vengono identificati con specifici codici riferiti al numero degli obiettivi centrali e dei relativi programmi.

In linea con le indicazioni dei Piani Nazionale e Regionale della Prevenzione, gli indicatori provenienti dalla Sorveglianza PASSI vengono utilizzati a livello aziendale per il monitoraggio delle azioni di prevenzione inserite nel Piano Locale.

A livello aziendale da gennaio 2012 a dicembre 2015 sono state intervistate 1.100 persone (in Regione Piemonte 12.535, nel Pool PASSI nazionale 149.920).

Nella tabella di seguito riportata, i dati aziendali sono suddivisi per quadrienni, dal 2010-2013 (valore baseline) al 2012-2015; per la Regione i valori sono riferiti al quadriennio 2012-2015 e all'atteso per il 2018 del Piano Regionale della Prevenzione.

I valori in verde segnalano una condizione di "vantaggio" e quelli in rosso una di "svantaggio" nel confronto tra i dati PASSI ASL CN1 2012-2015 e il dato regionale dello stesso periodo.



| | | ATTESO 2018 PRP | PASSI ASL CN1 | | | PASSI REGIONE PIEMONTE 2012-2015 |
|---|---|-----------------------|---------------|-----------|-----------|---|
| | | | 2010-2013 | 2011-2014 | 2012-2015 | |
| M.O.1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili | | | | | | |
| Codice | Nome indicatore | | | | | |
| 1.4.1 | Fumatori | 24.5% | 26.8% | 24.9% | 24.5% | 24.9% |
| 1.5.1 | Persone che riferiscono il rispetto del divieto di fumo (sempre/quasi sempre) nei luoghi di lavoro | 95.0% | 94.2% | 94.5% | 93.1% | 94.1% |
| 1.6.1 | Consumatori di alcol a maggior rischio | 16.2% | 16.4% | 16.1% | 16.1% | 18.3% |
| 1.7.1 | Persone che consumano almeno 3 dosi giornaliere di frutta e verdura | 55.0% | 65.7% | 69.5% | 69.6% | 53.2% |
| 1.8.1 | Ipertesi che ricevono il consiglio di ridurre il sale nel cibo | 89.2% | 86.9% | 83.5% | 83.9% | 82.4% |
| 1.9.1 | Persone fisicamente attive | 42.4% | 29.1% | 28.0% | 27.0% | 32.0% |
| 1.10.3 | Fumatori che hanno ricevuto consiglio di smettere | 66.1% | 55.5% | 59.0% | 50.7% | 50.1% |
| 1.10.4 | Persone in eccesso ponderale che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di perdere peso | 71.7% | 46.1% | 43.9% | 41.4% | 49.2% |
| 1.10.5 | Consumatori di alcol a maggior rischio che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di ridurre il consumo | 13.0% | 2.6% | 2.1% | 2.2% | 6.7% |
| 1.10.6 | Persone con patologia cronica che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di praticare regolare attività fisica | 53.8% | / | 29.5% | 31.4% | 40.1% |
| M.O.5 Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti | | | | | | |
| Codice | Nome indicatore | | | | | |
| 5.3.1 | Persone che usano sempre la cintura posteriore di sicurezza | 40.0% | 50.1% | 49.7% | 48.2% | 29.9% |
| | Persone che usano sempre il casco | 95.0% | 96.8% | 95.6% | 98.1% | 96.8% |
| 5.3.2 | Guida sotto l'effetto dell'alcol (guidato dopo aver bevuto almeno 2 unità alcoliche nell'ora precedente) | 6.2% | 8.1% | 7.4% | 7.2% | 8.8% |
| M.O.6 Prevenire gli incidenti domestici | | | | | | |
| Codice | Nome indicatore | | | | | |
| 6.3.2 | Percezione alta/molto alta della possibilità di subire infortuni domestici | 5.5% | 2.9% | 3.0% | 3.3% | 4.6% |
| 6.4.1 | Persone che hanno ricevuto informazioni su incidenti domestici | 18.9% | / | 6.1% | 6.4% | 13.0% |
| M.O.9 Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie | | | | | | |
| Codice | Nome indicatore | | | | | |
| 9.7.1 | Copertura vaccinale in specifici gruppi a rischio per patologia/status in vaccinati durante le ultime 4 campagne antiinfluenzali (da 2010-2011 a 2014-2015) | 41.5% | 21.8% | 18.7% | 17.4% | 24.5% |

Commento alla tabella

- **1.4.1** - Fumatori: il dato è inferiore a quello regionale in modo non statisticamente significativo e con un trend in diminuzione nel corso dei quadrienni. L'andamento dei valori è in linea con l'atteso 2018
- **1.5.1** - Persone che riferiscono il rispetto del divieto di fumo (sempre/quasi sempre) nei luoghi di lavoro: il dato è inferiore a quello regionale in maniera non statisticamente significativa e la percentuale è diminuita rispetto ai quadrienni precedenti. L'andamento del dato denota una distanza di quasi due punti percentuali dall'atteso 2018
- **1.6.1** - Consumatori di alcol a maggior rischio: il dato è inferiore a quello regionale, anche se la differenza non è statisticamente significativa. L'andamento dei valori è in linea con l'atteso 2018
- **1.7.1** - Persone che consumano almeno 3 dosi giornaliere di frutta e verdura: il dato è superiore in maniera statisticamente significativa a quello regionale e l'andamento è positivo rispetto all'atteso 2018
- **1.8.1** - Ipertesi che ricevono il consiglio di ridurre il sale nel cibo: il valore è superiore a quello regionale in maniera non statisticamente significativa, anche se la percentuale è diminuita rispetto al quadriennio baseline. L'andamento del dato denota una distanza di oltre cinque punti percentuali dall'atteso 2018
- **1.9.1** - Persone fisicamente attive: il dato è inferiore a quello regionale in modo statisticamente significativo e la percentuale ha continuato a diminuire nei quadrienni presi in esame. L'andamento dei valori evidenzia una notevole distanza dall'atteso 2018
- **1.10.3** - Fumatori che hanno ricevuto consiglio di smettere: il dato è superiore a quello regionale in maniera non statisticamente significativa ma la percentuale è diminuita soprattutto rispetto al quadriennio precedente e l'andamento del valore è molto distante dall'atteso 2018
- **1.10.4** - Persone in eccesso ponderale che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di perdere peso: il dato è inferiore a quello regionale in modo statisticamente significativo e la percentuale ha continuato a diminuire nei quadrienni presi in esame. L'andamento dei valori evidenzia una notevole distanza dall'atteso 2018
- **1.10.5** - Consumatori di alcol a maggior rischio che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di ridurre il consumo: il dato è statisticamente inferiore a quello regionale e l'andamento dei valori evidenzia una notevole situazione di svantaggio rispetto all'atteso 2018
- **1.10.6** - Persone con patologia cronica che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di praticare regolare attività fisica: il dato è inferiore a quello regionale in maniera non statisticamente significativa e l'andamento del valore è molto distante dall'atteso 2018
- **5.3.1** - Persone che usano sempre la cintura posteriore di sicurezza: il dato è superiore a quello regionale in maniera statisticamente significativa anche se la percentuale è diminuita nel corso dei quadrienni; l'andamento è positivo rispetto all'atteso 2018
- **5.3.1** - Persone che usano sempre il casco: il dato è superiore a quello regionale in maniera statisticamente non significativa, la percentuale è aumentata rispetto ai quadrienni precedenti e l'andamento è positivo verso l'atteso 2018
- **5.3.2** - Guida sotto l'effetto dell'alcol (guidato dopo aver bevuto almeno 2 unità alcoliche nell'ora precedente): il dato è inferiore a quello regionale ma in maniera non statisticamente significativa anche se la percentuale ha continuato a diminuire nel corso dei quadrienni. L'andamento del dato denota un valore ancora superiore rispetto all'atteso 2018
- **6.3.2** - Percezione alta/molto alta della possibilità di subire infortuni domestici: il dato è inferiore a quello regionale in maniera non statisticamente significativa anche se appare in costante lieve miglioramento. L'andamento del valore è ancora al di sotto dell'atteso 2018
- **6.4.1** - Persone che hanno ricevuto informazioni su incidenti domestici: il dato è inferiore a quello regionale in maniera statisticamente significativa e l'andamento dei valori evidenzia una notevole distanza dall'atteso 2018
- **9.7.1** - Copertura vaccinale antiinfluenzale in specifici gruppi a rischio per patologia/status: il dato è inferiore a quello regionale in maniera non statisticamente significativa, la percentuale ha continuato a diminuire nel corso dei quadrienni e l'andamento dei valori evidenzia una notevole distanza dall'atteso 2018.

Scheda tecnica a cura di **Maria Teresa Puglisi e Anna Maria Fossati**

Gruppo PASSI ASL CN1:

Maria Teresa Puglisi, Anna Maria Fossati, Antonella Balestra, Mariangela Barale, Marina Cerrato, Riccardo Chiappello, Ferdinando Palagi

Coordinamento PASSI Regione Piemonte:

Maria Chiara Antoniotti, Donatella Tiberti, Paolo Ferrari

