

Come lavora Passi per stimare la copertura dello screening cervicale

a cura dello staff Passi - 18 novembre 2010

La stima della copertura

Il Pap test andrebbe effettuato da tutte le donne che hanno avuto rapporti sessuali nella loro vita, a partire dai 25 fino ai 69 anni di età, ogni tre anni. Questo è, infatti, l'intervallo per cui il rapporto tra costi e benefici risulta ottimale.

La copertura dello screening cervicale è la frequenza percentuale di donne tra 25 e 64 anni che hanno praticato il pap test nei tre anni precedenti.

Pertanto, Passi effettua due domande alle donne tra 25 e 69 anni.

Proseguo ora con qualche domanda sul Pap-Test, un esame che serve a ricercare tumori del collo dell'utero, attraverso un prelievo fatto con un tampone vaginale.

8.1 Nel corso della sua vita ha eseguito un Pap-Test a scopo preventivo, cioè in assenza di sintomi o altri disturbi?

- Sì
- No (*saltare alla domanda 8.10*)
- Non so / non ricordo (*saltare alla domanda 8.10*)

8.2 Quando è stata l'ultima volta che ha fatto il Pap-Test a scopo preventivo?

Leggere le risposte

- Negli ultimi 12 mesi
- Tra 1 e 3 anni fa
- Più di 3 anni fa

Non leggere saltare alla domanda 8.10

- Non so / non ricordo

Nel 2010 questa domanda è stata modificata per valutare la periodicità con cui le donne effettuano il Pap test.

La valutazione della attività di promozione dello screening

Passi, inoltre, valuta l'attività di promozione dello screening cervicale e l'impatto di questa attività, attraverso alcune domande riportate qui sotto.

8.3 Ha mai ricevuto una lettera dalla ASL che la invitava a fare un Pap-Test?

- Sì
- No
- Non so / non ricordo

8.5 Le è mai stato consigliato da un medico o da un operatore sanitario di fare regolarmente l'esame del Pap-Test a scopo preventivo, cioè in assenza di sintomi o altri disturbi?

- Sì
- No
- No, perché ho già avuto un intervento di isterectomia

(segnare che ha avuto un'isterectomia se l'intervistata lo dichiara spontaneamente)

- Non so / non ricordo

8.7 Ha visto o sentito campagne informative o pubblicitarie di promozione del Pap-Test?

- Sì
- No
- Non so / non ricordo

8.10 Ha mai ricevuto una lettera dalla ASL che la invitava a fare un Pap-Test?

- Sì
- No
- Non so / non ricordo

8.11 Le è mai stato consigliato da un medico o da un operatore sanitario di fare regolarmente l'esame del Pap-Test a scopo preventivo, cioè in assenza di sintomi o altri disturbi?

- Sì
- No
- No, perché ho già avuto un intervento di isterectomia

(segnare che ha avuto un'isterectomia se l'intervistata lo dichiara spontaneamente)

- Non so / non ricordo

8.12 Ha visto o sentito campagne informative o pubblicitarie di promozione del Pap-Test?

- Sì
- No
- Non so / non ricordo

In base alle risposte, è possibile stimare la percentuale di donne, in età di screening cervicale, che dichiarano di essere state esposte ai vari messaggi di promozione e, attraverso la differenza nel ricorso allo screening tra donne esposte ai messaggi e donne non esposte, ricavare una misura dell'impatto di questa attività.

Come si distingue fra test effettuato nell'ambito e al di fuori del programma organizzato della Asl

Il Pap test può essere offerto alla donna nell'ambito di un programma organizzato di screening gestito dalla Asl oppure al di fuori di questo programma, per esempio su proposta del ginecologo, di altro operatore sanitario o per iniziativa personale.

Non potendo fare la domanda diretta che potrebbe essere difficilmente comprensibile, Passi utilizza l'informazione sul pagamento della prestazione, perché il programma della Asl deve essere completamente gratuito.

8.9 Ha dovuto pagare per quest'ultimo Pap-test?

Leggere le risposte

- Sì, il ticket
- Sì, il costo era completamente a mio carico
- No, nessuna spesa

Non leggere

- Non so / non ricordo

Il motivo della non effettuazione del Pap test

Passi indaga anche le motivazioni che le donne adducono per spiegare la mancata effettuazione della prevenzione, con la domanda:

Se la donna non ha MAI fatto un Pap-Test, (non leggere la parola "recentemente")

8.13 Quale è stato il motivo principale per cui **non** ha fatto (recentemente) il Pap-Test?

Non leggere le risposte (è possibile una sola risposta)

- Penso di non averne bisogno
- Nessuno me l'ha consigliato
- Mi sento imbarazzata/mi vergogno
- Ho trovato difficile contattare l'ASL per informazioni/appuntamento
- E' fastidioso/doloroso
- La sede/data/orario assegnati per l'esame non mi andava bene
- Ho paura dei risultati dell'esame
- Non ho ricevuto una convocazione
- Per pigrizia
- Non ho avuto tempo
- Sono già stata operata / per altri motivi sanitari
- Altro (specificare)
- Non so / non ricordo