



CONVEGNO

I risultati del Sistema di Sorveglianza Bambine e Bambini 0-2 anni:
raccolta dati 2025. Equità, politiche e programmi

Roma, 20 maggio 2026

Le disuguaglianze nei primi 1000 giorni di vita nei dati della Sorveglianza


Margherita Tommasella per il Gruppo di Coordinamento ISS

Istituto Superiore di Sanità

Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute



FOCUS DETERMINANTI



FOCUS INDICATORI



▲ PREVALENZE

**Aderenza alle buone pratiche per
caratteristiche della madre:**

- livello di istruzione
- difficoltà economiche familiari
- cittadinanza
- ripartizione geografica


FOCUS DETERMINANTI





LIVELLO DI ISTRUZIONE



● basso ● medio ● alto




DIFFICOLTA' ECONOMICHE FAMILIARI




CITTADINANZA




● straniera ● italiana



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



● Sud ● Centro ● Nord



PREVALENZE

- Titolo di studio
- Difficoltà economiche familiari
- Cittadinanza
- Ripartizione geografica

PrR ANALISI MULTIVARIATE



Modelli di regressione di Poisson aggiustati per:

- Età
- Parità
- *Titolo di studio*
- *Cittadinanza*
- *Ripartizione geografica*
- *Difficoltà economiche familiari*
- Partecipazione IAN



FOCUS INDICATORI



ASSUNZIONE APPROPRIATA DI A. FOLICO (gravidanze programmate/non escluse)




ASSUNZIONE DI ACIDO FOLICO




Prevalenze significativamente più alte fra:


- over 30
- primipare
- con liv. di istruzione medio e alto



ASTENSIONE DAL FUMO (al momento dell'intervista)



ASTENSIONE DAL FUMO (al momento dell'intervista)



Le caratteristiche che più si associano all'astensione dal fumo sono le stesse (sia che si considerino le donne in gravidanza, dopo il parto* o solo quelle che allattano*):

- over 30
- straniera
- con liv. di istruzione medio e alto
- *che hanno partecipato agli IAN


Sono stati valutati (in altri modelli) le associazione con l'uso di sigarette tradizionali e quelle con altri prodotti: maggiore consumo di **altri prodotti** tra

- under 30
- cittadine italiane





ASTENSIONE DALL'ALCOL (in allattamento)

L'astensione dall'alcol in gravidanza non presenta differenze sostanziali per le caratteristiche indagate



ASTENSIONE DALL'ALCOL (in allattamento)




Prevalenze significativamente più alte fra madri:



- straniera
- primipare
- del Centro e Sud Italia



ALLATTAMENTO (4-5 mesi)




ALLATTAMENTO (4-5 mesi)




Prevalenze significativamente più alte fra madri:



- straniere
- con liv. di istruzione medio/alto
- che hanno partecipato a IAN



POSIZIONE SUPINA IN CULLA (< 6 mesi)



POSIZIONE SUPINA IN CULLA (< 6 mesi)




Prevalenze significativamente più alte fra madri:



- over 30
- con liv. di istruzione medio/alto
- che hanno partecipato a IAN



LETTURA IN FAMIGLIA (almeno 1 g/sett.)



LETTURA IN FAMIGLIA (almeno 1 g/sett.)



Prevalenze significativamente più alte fra madri:


- over 30
- con liv. di istruzione medio e alto
- che hanno partecipato a IAN
- Lettrici

Testate associazioni con variabili del padre/partner :



- *Letttore (ass. forte)*
- *livello di istruzione (ass. debole)*
- *Cittadinanza (no associazione)*



NON ESPOSIZIONE A SCHERMI



NON ESPOSIZIONE A SCHERMI



Prevalenze significativamente più alta per le madri:

- con titolo di studio medio e alto
- che hanno partecipato agli IAN

Significativamente più bassa per le madri:

- straniere
- che riferiscono di economiche familiari
- del Centro e del Sud

Testate associazioni con variabili del padre/partner :

- *citt. straniera: associazione negativa (come per le madri).*
- *livello di studio alto: debole associazione positiva*




PARTECIPAZIONE AGLI I.A.N. (primipare)




▲ Dalle analisi multivariate si evidenziano associazioni positive con:

- allattamento esclusivo a 4-5 mesi
- posizione supina in culla
- lettura in famiglia (almeno 1 g./settimana)
- non esposizione a schermi
- uso del seggiolino
- intenzione a far somministrare tutte le vaccinazioni previste


PARTECIPAZIONE AGLI I.A.N. (primipare)




PARTECIPAZIONE AGLI I.A.N. (primipare)




PARTECIPAZIONE AGLI I.A.N. (primipare)





PARTECIPAZIONE AGLI I.A.N. (primipare)



PARTECIPAZIONE AGLI I.A.N. (primipare)



PARTECIPAZIONE AGLI I.A.N. (primipare)



Prevalenze significativamente più alte fra madri:

- over 30
- titolo di studio medio e alto

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Il monitoraggio garantito dalla Sorveglianza  permette di descrivere le differenze nell'aderenza alle buone pratiche fra gruppi di popolazione.

Questo può orientare:

- **i/le professionisti/e** nel riconoscere i genitori che necessitano di maggior sostegno nell'adozione di comportamenti protettivi
- **i decisori** nello strutturare programmi *equity-oriented*



RIFLESSIONI CONCLUSIVE

- ▲ I dati 2025 mostrano una profonda relazione tra fattori demografici e socio-economici delle madri e l'aderenza alle raccomandazioni: questo comporta **opportunità disuguali**
- ▲ Sarebbe interessante approfondire anche le associazioni con le **caratteristiche socio-economiche e demografiche paterne** e del **nucleo familiare**
- ▲ Gli **Incontri di Accompagnamento alla Nascita** offrono un'occasione di incontro fra pari e di confronto sui temi della genitorialità responsiva e delle buone pratiche ma la fruizione resta disuguale






CONVEGNO

I risultati del Sistema di Sorveglianza Bambine e Bambini 0-2 anni:
raccolta dati 2025. Equità, politiche e programmi

Roma, 20 maggio 2026



Grazie

