

## Scheda calendario vaccinale della Regione Liguria da Piano Regionale Vaccini 2005/2007 e s.m.i.

Vaccino	Nascita	3° Mese	5-6° Mese	11-12° Mese	13-15° mese	15-17° mese	5-6 anni	11-17 anni	17-45 anni	65 - 69 anni	≥ 70 anni	Ogni 10 anni
DTPa		DTPa	DTPa	DTPa			DTPa <sup>1</sup>	dTpa				dT <sup>2</sup>
IPV		IPV	IPV	IPV			IPV					
HBV	HBV <sup>3</sup>	HBV	HBV	HBV								
Hib		Hib	Hib	Hib								
MPR					MPR		MPR	MPR <sup>4</sup>				
PCV/PPV23		PCV	PCV	PCV						PPV23	PCV + PPV23 <sup>5</sup>	
MenC					MenC <sup>6</sup>			MenC <sup>6</sup> (14/15 anni)				
HPV								HPV <sup>7</sup> (12/17 anni)	HPV <sup>8</sup> (17/26-45 anni)			
Influenza										Influenza	Influenza	
Varicella								Varicella <sup>9</sup> (11/12 anni)				
HAV			HAV <sup>10</sup>									

### Legenda:

DTPa: vaccino antidiftto-tetanico-pertossico acellulare  
 dTpa: vaccino antidiftto-tetanico-pertossico acellulare per adolescenti e adulti  
 dT: vaccino antidiftto-tetanico per adolescenti e adulti  
 IPV: vaccino antipolio inattivato  
 HBV: vaccino antiepatite B  
 Hib: vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae b

MPR: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia  
 PCV: vaccino antipneumococcico coniugato  
 PPV23: vaccino antipneumococcico polisaccaridico  
 MenC: vaccino antimeningococco C coniugato  
 HPV: vaccino antipapilloma virus  
 HAV: vaccino antiepatite A

- Offerta attiva e gratuita
- Offerta gratuita ma non attiva
- Offerta in regime di co-payment

## Note

- 1) Dopo il compimento dei 7 anni è necessario utilizzare la formulazione con vaccino antidiftetico-tetanico-pertossico acellulare di tipo adolescenziale-adulto (dTpa).
- 2) Gli adulti con anamnesi incerta per il ciclo primario di vaccinazione con dT devono iniziare o completare la vaccinazione primaria. Un ciclo primario per adulti è composto da 2 dosi di vaccino contenente tetano e difterite (dT) e una terza dose con vaccino dTpa. Le prime 2 dosi devono essere somministrate a distanza di almeno 4 settimane l'una dall'altra e la terza dose 6-12 mesi dopo la seconda. I successivi richiami devono essere effettuati ogni 10 anni (a partire dal completamento della serie primaria) e almeno una delle dosi booster di vaccino dT dovrebbe essere rimpiazzata da 1 dose di vaccino dTpa.
- 3) Per i bambini nati da madri positive per HBsAg: somministrare entro le prime 12-24 ore di vita, contemporaneamente alle immunoglobuline specifiche anti-epatite B, la prima dose di vaccino anti-HBV; il ciclo andrà completato con una seconda dose a distanza di 4 settimane dalla prima, con una terza dose dopo il compimento della ottava settimana e con la quarta dose in un periodo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese di vita, anche in concomitanza con le altre vaccinazioni.
- 4) In riferimento ai focolai epidemici in corso, si ritiene opportuno, oltre al recupero dei soggetti suscettibili in questa fascia d'età (catch up) anche una ricerca attiva ed immunizzazione dei soggetti conviventi/contatto, non vaccinati (mop up). Nei soggetti anamnesticamente negativi e non precedentemente vaccinati è prevista la somministrazione di due dosi a distanza di un mese l'una dall'altra.
- 5) Soggetti che non abbiano ricevuto in precedenza la vaccinazione antipneumococcica: una dose di PCV13 seguita da una dose di PPV23 a distanza di 2-12 mesi. Soggetti che abbiano ricevuto in precedenza la vaccinazione antipneumococcica con PPV23: una dose di PCV13 con un intervallo di tempo superiore ad 1 anno dall'ultima dose di PPV23
- 6) Dose singola. La vaccinazione contro il meningococco C viene eseguita contemporaneamente in due coorti: la prima coorte al 13°-15° mese di vita e la seconda coorte a 12-14 anni. I bambini della prima coorte riceveranno tra il 12° ed il 15° anno una nuova dose di vaccino. Nei soggetti a rischio la vaccinazione contro il meningococco C può iniziare dal terzo mese di vita con tre dosi complessive, di cui l'ultima, comunque, dopo il compimento dell'anno di vita
- 7) Per il sesso femminile, dal 12° al 17° anno di vita, offerta attiva e gratuita del vaccino bivalente (scheda a tre dosi 0,1,6 mesi) e offerta in regime di co-payment del vaccino quadrivalente (scheda a tre dosi 0,2,6 mesi).
- 8) Per il sesso femminile, dal 18° al 26° anno di vita, offerta in regime di co-payment del vaccino bivalente (scheda a tre dosi 0,1,6 mesi), e dal 17° al 45° anno di vita, offerta in regime di co-payment del vaccino quadrivalente (scheda a tre dosi 0,2,6 mesi).
- 9) Nei soggetti anamnesticamente negativi e non precedentemente vaccinati è prevista la somministrazione di due dosi a distanza di un mese l'una dall'altra.
- 10) Offerta gratuita a tutti bambini e adolescenti che per vari motivi si rechino in Paesi ad alta endemia di epatite A ed a tutti i bambini originari di Paesi ad alta endemia di epatite A, dalla cui anamnesi emerge un rientro probabile o preventivato nel Paese di origine per brevi o lunghi periodi di vacanza o soggiorno. Allo scopo di mantenere una protezione continuativa viene raccomandata tra i 6 e i 12 mesi una dose di richiamo dopo la prima vaccinazione.