



La vaccinazione delle adolescenti e delle donne in età fertile: esperienze regionali Regione Friuli Venezia Giulia

Linda Gallo

Settimana Europea delle Vaccinazioni 2013.
Il punto sull'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita, la
vaccinazione HPV e l'accesso alle vaccinazioni nelle popolazioni migranti

Roma 16 - 17 aprile 2013

Piano Regionale di eliminazione del morbillo 2002/2004 - Friuli Venezia Giulia

- Nel 2002 nella Regione Friuli Venezia Giulia (FVG) si è dato avvio ad un Piano regionale triennale per il controllo e l'eliminazione del morbillo (Linee per la Gestione del SSR 2002)
- Il programma prevedeva l'invito alla vaccinazione MMR a tutte le persone che non risultavano vaccinate e di cui non si avesse notifica di morbillo interessando 6 coorti/anno
 - 2002 : coorti 1984-1987-1990-1993-1996-1999
 - 2003 : coorti 1985-1988-1991-1994-1997-2000
 - 2004 : coorti 1986-1989-1992-1995-1998-2001

Piano Nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2003-2007 Friuli Venezia Giulia


- Dal 2004 offerta attiva della 2^a dose di MMR in occasione della 4^a dose DTpa (nati 1998) e l'offerta attiva ad altre due coorti di nascita
 - *2004 offerta attiva seconda dose nati 1992-1995-1998*
 - *2005: offerta attiva seconda dose nati 1993-1996-1999*
 - 2006 offerta attiva seconda dose nati 1994-1997-2000

Copertura vaccinale(MMR-M)al 31.12.2007 per almeno una dose prima e dopo la campagna di *catch-up* corti 1984-2001, per ASS

Friuli Venezia Giulia

PRIMA

DOPO



Il calendario vaccinale in Friuli Venezia Giulia

- Da un decennio l'offerta attiva di due dosi di vaccino MMR
- Chiamata attiva degli adolescenti (16enni) per richiamo dT/dTPa: occasione opportuna anche per MMR

Attività mirate alla prevenzione della rosolia congenita in FVG

Formazione

- Formazione regionale del personale sanitario (servizi vaccinali, ginecologi, ostetriche, laboratoristi, farmacisti) sugli obiettivi e sulle strategie del Piano Nazionale: settembre 2005
- Formazione ASS: dicembre 2005 - primo semestre 2007
- Sensibilizzazione e formazione MMG e PLS sugli obiettivi e strategie del Piano
- Identificato laboratorio regionale

Attività mirate alla prevenzione della rosolia congenita in FVG

Azioni per il recupero delle suscettibili

- vaccinazioni nel post partum (protocolli aziendali)
 - *difficoltà nell'offerta e nell'accettazione*
- vaccinazioni personale femminile della scuola
 - Sensibilizzazione delle Direzioni Didattiche al fine di proporre attivamente la vaccinazione al personale femminile (protocolli aziendali)
 - Sensibilizzazione dei Comuni cui fanno capo gli Asili Nido per proporre attivamente la vaccinazione al personale femminile (protocolli aziendali)
 - *Protocolli disattesi*

Attività mirate alla prevenzione della rosolia congenita in FVG

Azioni per il recupero delle suscettibili

- vaccinazione operatrici sanitarie
 - protocolli aziendali per la vaccinazione degli operatori di sesso femminile rubeo-test negativi
 - *Protocolli disattesi, la vaccinazione è proposta solo a personale femminile che opera in alcuni reparti e non a tutte*
- sperimentato invito con lo screening per il pap-test
 - *non sostenibile*
- vaccinazioni delle madri in occasione delle vaccinazioni dei figli
 - *Attività sostenibile con buoni risultati di adesione*
- Sfruttare tutte le occasioni opportune per vaccinare le donne suscettibili

Attività mirate alla prevenzione della rosolia congenita in FVG

Azioni per il recupero a livello locale

- ASS 4 “Medio Friuli” nel 2012 sfruttando le Risorse Aggiuntive Regionali (RAR)
 - Invito attivo delle donne in età fertile che non risultano essere state vaccinate/assenza rubeotest positivo
 - 1206 inviti nate 1989/1994
 - 14 inadempienti totali, 83 rifiuti
 - 48 già vaccinate per rosolia
 - 122 rubeotest positive
 - 174 vaccinate per MMR e 27 per varicella

**Coperture vaccinali (%) per rosolia
donne nate 1984-1991 al 31.12.2012
Friuli Venezia Giulia**


	1 dose	2 dosi
1984	44,8	20,4
1985	54,7	22,6
1986	58,2	24,5
1987	63,4	38,1
1988	70,8	41,3
1989	78,0	57,2
1990	81,7	62,0
1991	83,8	70,1

Coperture vaccinali (%) per rosolia donne nate 1992- 2006 al 31.12.2012 Friuli Venezia Giulia

	1 dose	2 dosi
1992	87,1	72,2
1993	88,7	76,2
1994	90,5	78,8
1995	92,4	81,3
1996	93,1	85,5
1997	93,9	86,6
1998	94,5	86,9
1999	94,1	88,9
2000	93,9	89,0
2001	94,3	89,7
2002	94,3	89,8
2003	92,9	89,0
2004	93,9	89,3
2005	94,0	89,6
2006	93,3	88,1

Conclusioni

- Coperture vaccinali per rosolia nelle donne in età fertile ancora insufficienti
- attività sicuramente efficaci nell'aumentare l'adesione
 - vaccinazioni delle madri in occasione delle vaccinazioni dei figli
 - Invito attivo alla vaccinazione



Eliminiamo i RISCHI



della **ROSOLIA**
e della **VARICELLA**
in **GRAVIDANZA**

 SALUTE FVG



Settimana
Europea
della Vaccinazione

Previene Protegge Immunizza

grazie per l'attenzione